

БОЛЬШОЙ СЛОВАРЬ

**МЕДИЦИНСКИХ
ТЕРМИНОВ**

АЯ



Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ

Охраняется Законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

Оформление художника
И.А. Озерова

Б79 Большой словарь медицинских терминов / Сост. Федотов В.Д. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. — 959 с.

ISBN 978-5-521-73333-0

Это научно-справочное издание содержит более 50 000 терминов, используемых в клинической практике, медицинской литературе, биологии и смежных науках и сможет ответить практически на все вопросы, связанные с медициной.

ББК 92я2

Правила пользования словарем

Словарь предназначен для медицинских работников, преподавателей и студентов медицинских вузов, учащихся медицинских колледжей и училищ, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами медицины и медицинской науки.

Особенности словаря.

В словаре представлена основная анатомическая номенклатура.

Описание болезней в словаре представлено следующим образом: приводится характеристика отдельных групп болезней, основанная на этиопатогенетическом принципе без указания конкретных нозологических единиц. Это связано с тем, что в рамках формата данного издания не представляется возможным дать наиболее полное, емкое и доступное описание отдельных болезней, а простое перечисление заболеваний представляется нецелесообразным.

Структура и правила пользования словарем

В структуре словаря использован алфавитно-гнездовой конструктивный принцип, термины-слова соединяются по смыслу, а термины-словосочетания группируются вокруг ведущего слова.

Словарная статья состоит из 4 зон:

1. Заголовочное слово-термин или словосочетание на русском языке и затем его латинский эквивалент.
2. Этимология термина.
3. Синонимы: возможные прототипы и аналоги.
4. Семантика термина.

Первый и четвертый пункты обязательны, второй и третий пункты могут отсутствовать.

1. Заголовочное (ведущее) слово-термин пишется в начале гнезда полужирным шрифтом. Оно выражается существительным в именительном падеже единственного числа за исключением случаев, где слово-термин применяется во множественном числе. Если термин имеет варианты написания, то в качестве первого приводится наиболее употребляемый. Слова, написанные через дефис, рассматриваются как слитные и располагаются в общем списке.

В терминах-словосочетаниях соблюдается порядок, принятый в научной терминологии, при этом ведущее слово в них полностью не приводится, а заменяется первой прописной буквой с точкой, но само словосочетание необходимо искать в гнезде ведущего слова. Например, чтобы найти словосочетания **«симптом дислокационный»** и **«симптом зрачка»**, необходимо найти термин **симптом**, а ниже этого термина — искомые словосочетания, причем **«с. дислокационный»** будет находиться выше, чем **«с. зрачка»**.

Термин, объяснение которого приводится в другой словарной статье, сопровождается ссылкой «см.» например, **дистрофия липидная** — см. **дистрофия жировая**.

Термины-аббревиатуры даются в общем списке со ссылкой на полный термин. Например, **АД** — см. **артериальное давление**. Встречающиеся сокращенные обозначения единиц физических величин раскрываются в списке сокращений.

2. Гнездо этимологии заключается в скобки (...) и содержит указание на язык, из которого пришло слово, слово-прототип и его буквальное (первоначальное) значение. Например, **лабильность** (лат. labilis подвижный, нестойкий;...)

3. Зона синонимов: прототипов и аналогов (там, где она существует) содержит перечень терминов той же группы, к которым термин относится. Например, **лабильность** (лат. labilis подвижный, нестойкий; синоним: лабильность функциональная, функциональная подвижность) .

4. Семантика термина раскрывается в определении. Например, **лабильность** (лат. labilis подвижный, нестойкий; синоним: лабильность функциональная, функциональная подвижность) в физиологии — скорость протекания элементарных физиологических процессов в возбудимой ткани, определяемая, например, как максимальная частота раздражения, которую она способна воспроизводить без трансформации ритма.

Термины представлены в соответствии с русским алфавитом, при этом если первая буква термина написана не на русском языке, то такие термины располагаются в соответствии с порядком букв в английском алфавите и термин следует искать в гнезде основного термина, написанного по-русски. Например, **«К-антиген»** находится в гнезде слова **«антиген»** и располагается после **«HLA-антиген»**.

Термин-словосочетание следует искать в гнезде ведущего слова.

Смысл и содержательная сторона термина раскрываются в зонах этимологии и семантики.

Список применяемых сокращений

a. — arteria (ед. число)	гг. — rami (мн. число)	канар. — канарский
aa. — arteriae (мн. число)	sin. — sinister	кл. — класс
ant. — anterior	sup. — superior	КФ — международная классификация ферментов
b. — bursa (ед. число)	v. — vena (ед. число)	лимф. — лимфатический
Bac. — Bacillus	vag. — vagina (ед. число)	млн. — миллион
Bact. — Bacterium	vagg. — vaginae (мн. число)	МСГО — медицинская служба гражданской обороны
bb. — bursae (мн. число)	vv. — venae (мн. число)	н. э. — наша эра (73 г. до н. э.)
Ber — определитель бактерий Берджи (Bergey's manual of determinative bacteriology, 8 ed., 1974)		напр. — например
BNA — Базельская анатомическая номенклатура	австр. — австрийский	нем. — немецкий
dext. — dexter	австрал. — австралийский	норв. — норвежский
ext. — externus	арг. — аргентинский	нрк — нереккомендуемый
f. — fascia	амер. — американский	отр. — отряд (в зоологии)
ff. — fasciae (мн. число)	англ. — английский	перуан. — перуанский
inf. — inferior	бельг. — бельгийский	РНК — рибонуклеиновая кислота
int. — internus	браз. — бразильский	рос. — российский
JNA — Йенская анатомическая номенклатура	в. — век	рум. — румынский
lat. — lateralis	вв. — века	сем. — семейство
lig. — ligamentum (ед. число)	венг. — венгерский	син. — синоним
ligg. — ligamenta (мн. число)	г. — год	тыс. — тысяча
LNE — Ленинградская эмбриологическая номенклатура	гг. — годы	уругв. — уругвайский
LNH — Ленинградская гистологическая номенклатура	голл. — голландский	устар. — устаревший
m. — musculus (ед. число)	гист. — гистологический	филипп. — филиппинский
med. — medialis	гл. обр. — главным образом	фин. — финский
mm. — musculi (мн. число)	ГОСТ — Государственный общесоюзный стандарт	франц. — французский
n. — nervus (ед. число)	греч. — греческий	ЦНС — центральная нервная система
nn. — nervi (мн. число)	дат. — датский	чил. — чилийский
PNA — Парижская анатомическая номенклатура	ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота	чехосл. — чехословацкий
post. — posterior	зоол. — зоологический	чеш. — чешский
r. — ramus (ед. число)	инд. — индийский	швед. — шведский
	ирланд. — ирландский	швейц. — швейцарский
	исп. — испанский	шотл. — шотландский
	истор. — исторический	югосл. — югославский
	итал. — итальянский	юж. - афр. — южно-африканский
		яп. — японский

Сокращение единиц измерения

а — ампер	г·эkv — грамм-эквивалент	мл — миллилитр
ат — атмосфера техническая (единица давления)	дб — децибел	мол. вес (масса) — молекулярный вес (масса)
ат. вес (масса) — атомный вес (масса)	дж — джоуль	мм — миллиметр
ата — атмосфера абсолютная	дин — дина	мм вод. ст. — миллиметр водяного столба
ати — атмосфера избыточная	дптр — диоптрия	мм рт. ст. — миллиметр ртутного столба
атм — атмосфера нормальная, или физическая	к — кулон	мсек — миллисекунда
бар — единица атмосферного давления, единица звукового давления	кал — калория	н — ньютон
бэр — биологический эквивалент рентгена	кв — киловольт	нм — нанометр
в — вольт	квт — киловатт	об/мин — оборот в минуту
в·а — вольт-ампер	квт·ч — киловатт-час	об.% — объемный процент
вб — вебер	кг — килограмм	об/сек — оборот в секунду
вт — ватт	кд — кандела	ом — ом
вт·ч — ватт-час	ккал — килокалория	пз — пуаз
г — грамм	л — литр	рН — водородный показатель — промилле
г — гравитация (единица перегрузок)	лк — люкс	пф — пикофарада
г-атом — грамм-атом	лм — люмен	р — рентген
га — гектар	м — метр	рад — рад
гб — гильберт	ма — миллиампер	сб — стильб
г·ион — грамм-ион	мв — милливольт	св — свеча
г·моль — грамм-моль	мг — миллиграмм	сг — сантиграмм
гн — генри	мг% — миллиграмм-процент	сек. — секунда
г% — грамм-процент	мг·эkv — миллиграмм-эквивалент	спз — сантипуаз
°K — градус Кельвина	мин. — минута	ф — фарада
°C — градус Цельсия	мкг — микрограмм	фэр — физический эквивалент рада
гс — гаусс	мкл — микролитр	час. — часов
гц — герц	мкм — микрометр	э — эрстед
	мкс — максвелл	эв — электрон-вольт
	мксек — микросекунда	
	мккюри — микрокюри	
	мкюри — милликюри	

а (перед гласными an-; греч. a-, an-) — приставка, означающая отсутствие признака или качества, выраженного во второй части слова; соответствует русским приставкам «без-», «не-».

Аарона симптом (Ch. D. Aaron, амер. врач) — боль в надчревной области или левом подреберье при надавливании в точке Мак-Бернея; симптом аппендицита.

аб- (абс-; лат. ab-, abs-) — приставка, означающая «удаление», «отклонение»; соответствует русской приставке «от-».

Абади симптом (J. A. Abadie, франц. невропатолог) — отсутствие болезненности при сдавливании сухожилия икроножной мышцы (ахиллова); имеет место при *tabes dorsalis*.

абазия (abasia; a- + греч. basis шаг) — неспособность к ходьбе, связанная с расстройствами равновесия тела или с двигательными нарушениями нижних конечностей (параличами, гиперкинезами, мышечными спазмами).

абазия-астазия — см. **астазия-абазия**.

Абалихина—Пивоварова метод (А. А. Абалихин, сов. рентгенолог; В. П. Пивоваров, сов. офтальмолог) — метод рентгенографии орбиты в полуаксиальной (кассета расположена горизонтально под подбородком, лицо слегка наклонено вперед, взор фиксирован в горизонтальном направлении) и профильной проекциях; используется для определения локализации внутриглазных инородных тел.

Абби — см. **Ферстера—Абби**.

Абби пластика губы (R. Abbe, амер. хирург) — пластика дефекта губы клиновидным лоскутом на ножке, сформированным из тканей другой губы.

Абботта редрессирующий корсет (нрк; E. G. Abbott, амер. ортопед) — см. **Эбботта редрессирующий корсет**.

Abbreviata caucasica — вид гельминтов сем. *Physalopteridae*, кл. нематод; окончательные хозяева — низшие приматы, реже человек, у которых *A. c.* паразитирует в верхних и средних отделах ЖКТ; промежуточные хозяева — различные виды позвоночных.

аббревиация (лат. abbreviatio сокращение) — в биологии — сокращение цикла индивидуального развития органов или их частей за счет выпадения отдельных стадий онтогенеза, приводящее к недоразвитию или редукции органов у потомков.

абдоминальный (abdominalis; лат. abdomen, живот) — брюшной.

абдомино- (лат. abdomen, abdominis живот) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к животу, к брюшной полости».

абдоминоскопия (абдомино- + греч. skopeo рассматривать) — см. **перитонеоскопия**.

абдуктор (musculus abductor; лат. abduco, abductum отводить) — мышца, осуществляющая отведение конечности или ее части.

абдукционный феномен — сужение зрачка при интенсивном отведении глаза; наблюдается при различных поражениях ЦНС.

абдукция (лат. abductio, от abduco, abductum отводить) — см. **отведение**.

Абелева—Татаринова реакция (Г. И. Абелев, сов. иммунолог; Ю. С. Татарин, сов. биохимик) — см. **альфа-фетопротеиновый тест**.

Абелля метод (L. L. Abell, амер. биохимик) — колориметрический метод количественного определения общего холестерина в сыворотке крови, основанный на использовании реакции Либорманна—Бурхарда.

Аберкромби синдром (J. Abercrombie, шотл. врач) — см. **амилоидоз системный**.

аберрантный (лат. aberrans, aberrantis отклоняющийся) — отклоняющийся от нормального строения, расположения или состояния (напр., аберрантный кровеносный сосуд, аберрантный участок хромосомы и т. д.).

аберрантный комплекс QRS — см. **желудочковый комплекс ЭКГ аберрантный**.

абerrация (лат. aberratio отклонение) — индивидуальное отклонение в структуре или функции от нормы.

а. глаза — искажение изображений на сетчатке вследствие несовершенства оптической системы глаза.

а. глаза дифракционная — А. г., обусловленная дифракцией, возникающей при прохождении света через суженный зрачок.

а. глаза сферическая — А. г., обусловленная различием в преломляющей способности центральных и периферических отделов роговицы и хрусталика.

а. глаза хроматическая — А. г., обусловленная неодинаковым преломлением оптической системой глаза световых лучей различной частоты.

а. половая — см. **половое извращение**.

а. полухроматидная — хромосомная aberrация, затронувшая продольную половину одной хроматиды.

а. хроматидная — хромосомная aberrация, затронувшая только одну хроматиду, т. е. возникшая после ближайшей предшествующей редупликации хромосом.

а. хромосомная — изменение структуры хромосомы, вызванное ее разрывом с последующим перераспределением, утратой или частичным удвоением генетического материала.

абеталипопротеинемия (abetaliipoproteinaemia; a- + beta-липопротеины + греч. haima кровь; син.: акантоцитоз, Бессена—Корнцвейга синдром) — нарушение всасывания и транспорта жиров, недостаточность или отсутствие бета-липопротеинов, недостаточность высших полиненасыщенных жирных кислот и низкий уровень холестерина и фосфатидов в крови; проявляется акантозом, пигментной дегенерацией сетчатки, атаксией, наличием в крови акантоцитов; наследуется по ауто-сомно-рецессивному типу.

абиотические факторы (a- + греч. biotikos — жизненный, живой) — факторы неживой природы (температура, влажность и др.).

абластика (ablastica; a- + греч. blastikos пускающий ростки, прорастающий) — комплекс хирургических мероприятий, направленный на предотвращение диссеминации опухоли во время операции.

аблефария (ablepharia; a- + греч. blepharon веко) — аномалия развития: отсутствие век и глазной щели; обычно сочетается с недоразвитием глазного яблока.

аблутомания (ablutomania; лат. abluo, ablutum мыть + мания) — навязчивое стремление к мытью рук.

абляция (лат. ablatio отнятие) в медицине — хирургическая операция удаления части органа или какой-либо части тела.

аборальный (aboralis; ab- + лат. os, oris рот) — дальний относительно ротового отверстия; применяется гл. обр. по отношению к элементам желудочно-кишечного тракта.

аборт (лат. abortus; син. выкидыш) — прерывание беременности в первые 28 недель.

а. внебольничный — см. **а. криминальный**.

а. искусственный (a. artificialis) — А., вызванный преднамеренно воздействием непосредственно на плод, или организм беременной.

а. криминальный (a. criminalis; син.: А. внебольничный, А. незаконный, А. преступный) — искусственный А., произведенный вне лечебного учреждения.

а. лейкоэмический (a. leukaemicus) — см. **лейкемическое зияние**.

а. медицинский (a. medicinalis) — искусственный А., производимый врачом-гинекологом в специализированном отделении больницы или в родильном доме.

а. начавшийся (a. incipiens) — стадия самопроизвольного А., характеризующаяся сильными болями внизу живота и кровавыми выделениями при неполном раскрытии наружного зева шейки матки.

а. незаконный — см. **а. криминальный**.

а. неполный (a. incompietus) — стадия самопроизвольного А., характеризующаяся наличием в матке остатков плодного яйца.

а. поздний (a. tardus) — А. при сроке беременности от 16 до 28 недель.

а. полный (a. completus) — последняя стадия самопроизвольного А., характеризующаяся выходением из матки всех частей плодного яйца.

а. преступный — см. **а. криминальный**.

а. привычный — см. **выкидыш привычный**.

а. ранний (a. praecox) — самопроизвольный А. при сроке беременности до 16 недель.

а. самопроизвольный (a. spontaneus) — А., начавшийся или произошедший без преднамеренных действий, имевших цель прерывать беременность.

а. трубный (a. tubarius) — самопроизвольный А. при трубной беременности, характеризующийся изгнанием плодного яйца из маточной трубы в брюшную полость.

а. угрожающий (a. imminens) — начальная стадия самопроизвольного А., характеризующаяся несильными болями внизу живота при закрытой шейке матки.

а. в ходу (a. progrediens) — стадия самопроизвольного А., при которой плодное яйцо полностью (или почти полностью) отделилось от стенки матки, но находится еще в ее полости или в канале шейки матки.

а. шеечный (a. cervicalis) — стадия самопроизвольного А., при которой плодное яйцо, полностью отделившееся от стенки матки и изгнанное из ее полости, задерживается в канале шейки матки.

абортивный (лат. abortivus недоношенный, преждевременный) — 1) не достигший полного развития (напр., А. форма болезни); 2) обрывающий развитие болезни (напр., А. метод лечения).

абортанг (нем. Abortzange) — зажим для захвата и удаления из матки частей плодного яйца при аборте.

Абражанова пластика (А. А. Абражанов, сов. хирург) — пластическая операция закрытия множественных бронхиальных свищей лоскутом на ножке, сформированным из широчайшей мышцы спины.

абразивные материалы (лат. abrasio соскабливание) — мелкозернистые или порошкообразные вещества высокой твердости; в медицине применяются для шлифования и полировки зубных протезов.

Абрами синдром (Р. Abrami, франц. врач; син.: Видаля—Абрами болезнь, синдром энтерогепатический) — восходящая коли-инфекция печени с явлениями хронического холангита.

абрахия (abrachia: a- + греч. brachion рука) — аномалия развития: отсутствие верхних конечностей.

Абрикосова метод (А. И. Абрикосов, сов. патологоанатом) — 1) метод сохранения трупа, заключающийся в заполнении сосудов формалино-глицериновой смесью с последующим выдерживанием трупа в жидкости того же состава; 2) метод вскрытия трупа, при котором органы извлекают комплексами, составляющими анатомо-физиологические системы (комплекс органов шеи и грудной клетки; печень, желудок и двенадцатиперстная кишка; почки, мочевые пути и половые органы; головной и спинной мозг).

Абрикосова опухоль (А. И. Абрикосов, сов. патологоанатом) — см. **миобластома зернисто-клеточная**.

абс- — см. **аб-**.

абсанс (франц. absence отсутствие) — кратковременная потеря (или угнетение) сознания с последующей амнезией; симптом эпилепсии (малый эпилептический припадок).

а. автоматизма — сложный А., характеризующийся стереотипно повторяющимися двигательными актами: движениями губ или языка, жестами, привычными автоматизированными действиями (поправление одежды, прически и т. п.).

а. атонический — сложный А. с утерей мышечного тонуса, сопровождающийся падением.

а. гипертонический — сложный А. с повышением мышечного тонуса; проявляется обычно сочетанным разгибанием головы и отведением глазных яблок вверх, иногда выгибанием туловища назад.

а. миоклонический — сложный А. с двусторонней ритмической миоклонией, преимущественно мышц лица и верхних конечностей.

а. пролонгированный — А. с длительным (до нескольких часов) помрачением сознания.

а. простой (син. А. чистый) — А., не сопровождающийся двигательными актами.

а. ретрокурсивный — гипертонический А. с выгибанием туловища кзади и с шагом назад для сохранения равновесия.

а. ретропульсивный — гипертонический А. с выгибанием туловища кзади.

а. сложный — А., сопровождающийся непроизвольными движениями или действиями.

а. субклинический — А. с неполной утерей сознания.

а. чистый — см. **абсанс простой**.

а. энуретический — сложный А. с непроизвольным мочеиспусканием.

абсентизм (absinthismus; франц. absinthe полынная водка, абсент) — форма хронического алкоголизма, обусловленная употреблением абсента.

абсолютно экстремальная зона — см. **суперэкстремальная зона**.

абсорбция (лат. absorptio поглощение) — процесс поглощения вещества, находящегося в газообразной или жидкой фазе, всей массой сорбента.

абстиненция (лат. abstinencia воздержание; син. синдром абстинентный) — состояние, возникающее в результате внезапного прекращения приема (введения) веществ, вызвавших токсикоманическую зависимость, или после введения их антагонистов; характеризуется психическими, вегетативно-соматическими и неврологическими расстройствами; клиническая картина и течение А. зависят от типа вещества, дозы и продолжительности его употребления.

а. половая (abstinencia sexualis; син.: депривация половая, половое воздержание) — вынужденное или сознательное снижение половой активности ниже индивидуальной (конституционально-возрастной) потребности.

а. половая парциальная — А. п. при наличии суррогатных или непроизвольных форм полового удовлетворения, сопровождаемых оргазмом.

а. половая тотальная — А. п., при которой оргазм не наступает ни при каких обстоятельствах.

абстракция (лат. abstractio отвлечение) — психический процесс: мысленное отвлечение от некоторых сторон, свойств, связей предметов и явлений действительности с целью выделения из их числа наиболее важных (в науке — существенных).

абсцесс (лат. abscessus; от abscedo, abscessum отделяться, нарывать; син.: апостема, гнойник, нарыв) — полость, заполненная гноем (см. **экссудат гнойный**) и отграниченная от окружающих тканей капсулой.

а. аноректальный (a. anorectalis) — А., расположенный в тканях, окружающих анальную часть прямой кишки и задний проход; развивается при подкожном или подслизистом парапроктите.

а. апикальный (a. apicalis) — А., локализующийся в области верхушки корня зуба; возникает при остром или обострившемся верхушечном периодонтите.

а. аппендикулярный (a. appendicularis) — А., сформировавшийся на месте аппендикса; осложнение острого аппендицита.

а. асептический (a. asepticus) — А., развивающийся в результате попадания в ткань веществ, способных вызвать нагноение без участия пиогенных возбудителей.

а. Броди — см. **Броди абсцесс**.

а. гангренозный (a. gangraenosus gaseus) — А., наполненный гнилостным экссудатом.

а. гангренозный газовый (a. gangraenosus gaseus) — А. г., содержащий газ и гнилостный экссудат, образовавшиеся вследствие жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов.

а. геморрагический (a. haemorrhagicus) — А., в содержимом которого имеется кровь; развивается при инфицировании и нагноении гематомы или вследствие кровоизлияния в полость А.

- а. головного мозга** (а. cerebri) — А. формируется в тканях головного мозга при попадании в них возбудителей гнойной инфекции из других очагов или при черепно-мозговой травме.
- а. головного мозга кардиопатический** (а. cerebri cardiopathicus) — метастатический А. г. м., при котором источником инфекции является воспалительно измененный эндокард; возникает у детей с врожденными пороками сердца синего типа, гл. обр. при тетраде Фалло.
- а. головного мозга контактный** (а. cerebri contactus) — А. г. м., развивается вследствие распространения инфекционного процесса из близко расположенного очага гнойного воспаления (из среднего уха, околоносовых пазух, глазницы, костей черепа).
- а. головного мозга метастатический** (а. cerebri metastaticus) — А. г. м., развивающийся в результате гематогенного или лимфогенного распространения возбудителей гнойной инфекции из отдаленного гнойного очага.
- а. головного мозга отогенный** (а. cerebri otogenus) — А. г. м., развивающийся в результате распространения возбудителей инфекции из среднего уха при гнойном отите.
- а. головного мозга риногенный** (а. cerebri rhinogenus) — А. г. м., развивающийся в результате распространения возбудителей инфекции при гнойном воспалении околоносовых пазух (чаще лобных).
- а. головного мозга травматический** (а. cerebri traumaticus) — А. г. м., развивающийся в результате инфицирования и нагноения тканей мозга, поврежденных при черепно-мозговой травме.
- а. головного мозга эзофагогенный** (а. cerebri oesophagenus) — метастатический А. г. м., развивающийся в результате распространения возбудителей инфекции из пищевода при гнойном эзофагите; возникает чаще у детей с ожоговым сужением пищевода после длительного бужирования.
- а. десневой** (а. gingivalis; син. А. субгингивальный) — А., локализующийся в тканях десны; возникает при наличии патологического зубодесневого кармана или в результате механической травмы десны.
- а. Дюбуа** — см. **Дюбуа абсцесс**.
- а. Дюпоитрена** — см. **Дюпоитрена абсцесс**.
- а. забрюшинный** (а. retroperitonealis) — А., локализующийся в забрюшинном пространстве.
- а. заглоточный** (а. retropharyngeus; син.: А. позадиглоточный, А. ретрофарингеальный) — А., располагающийся в заглоточном пространстве.
- а. заглоточный острый** (а. retropharyngeus acutus) — А. з., развивающийся вследствие распространения возбудителей инфекции при острых воспалительных процессах в носоглотке и задних отделах носа (гл. обр. у детей), а также при травмах задней стенки глотки.
- а. заглоточный хронический** (а. retropharyngeus chronicus) — А. з., формирующийся в результате туберкулезного поражения верхних шейных позвонков или заглоточных лимфатических узлов.
- а. запоночный** — см. **Knopfen-abscess**.
- а. заушный** (а. retroauricularis) — А., локализующийся в мягких тканях позади ушной раковины или субнадкостнично в сосцевидном отростке; развивается при мастоидите вследствие прорыва гноя через наружный кортикальный слой сосцевидного отростка или при гнойном лимфадените.
- а. инкапсулированный** (а. incapsulatus) — А., имеющий толсто-стенную фиброзную капсулу.
- а. интрамаммарный** (а. intramammarius) — А., локализующийся в толще молочной железы; возникает при глубокой форме гнойного мастита.
- а. ишиоректальный** (а. ischiorectalis) — А. локализуется в клетчатке седалищно-прямокишечного пространства; возникает при глубоком парапроктите.
- а. кости** (а. ossis) — А. в компактном веществе кости; возникает при хроническом остеомиелите.
- а. легкого** (а. pulmonis) — А., развивающийся в легочной ткани как осложнение пневмонии, реже при заносе возбудите-
- лей гнойной инфекции гематогенным, лимфогенным путем или с инородным телом.
- а. межкишечный** (а. interintestinalis) — А., локализующийся в брюшной полости между петлями кишечника; возникает при ограниченном гнойном перитоните, осложнение острого аппендицита.
- а. метастатический** (а. metastaticus; син. метастаз гнойный) — А., развивающийся вследствие гематогенного или лимфогенного распространения возбудителей гнойной инфекции из отдаленного очага или при септикопиемии.
- а. метастатический пиемический** (а. metastaticus pyaemicus) — А. м., чаще множественный, образующийся при септикопиемии; является основным проявлением общей гнойной инфекции.
- а. миндалин** (а. tonsillaris; син. А. тонзиллярный) — А., развивающийся в паренхиме миндалин; осложнение тонзиллита.
- а. мозольный** (а. callosus) — подкожный или субэпидермальный А., формирующийся в результате проникновения возбудителей гнойной инфекции через трещины кожной мозоли (чаще на ладони).
- а. натеchnый** — см. **натечник**.
- а. окологлоточный** (а. parapharyngeus; син. А. парафарингеальный) — А., локализующийся в окологлоточном пространстве; является осложнением воспалительных процессов в глотке, ротовой полости или среднем ухе.
- а. околоминдаликовый** (а. paratonsillaris; син.: А. паратонзиллярный, А. перитонзиллярный) — А., формирующийся в параминдаликовой клетчатке вследствие предшествующего воспаления; в зависимости от локализации различают верхний (передневерхний), задний и наружный А. о.
- а. острый** (а. acutus; син. А. горячий — устар.) — быстро формирующийся А., сопровождающийся резко выраженными местными воспалительными изменениями с нарушением общего состояния.
- а. парадентальный** (а. paradentalis) — А., располагается в пародонте; возникает при наличии глубокого патологического зубодесневого или костного кармана.
- а. паратонзиллярный** (а. paratonsillaris) — см. **а. околоминдаликовый**.
- а. парауретральный** (а. paraurethralis) — А. располагается в тканях, окружающих мочеиспускательный канал; возникает, напр., при воспалении желез мочеиспускательного канала у мужчин, при закупорке и инфицировании парауретрального протока у женщин.
- а. парафарингеальный** (а. parapharyngeus) — см. **а. окологлоточный**.
- а. пельвиоректальный** (а. pelvirectalis) — А., располагающийся в забрюшинной клетчатке малого таза вокруг прямой кишки; возникает при глубоком парапроктите.
- а. перисинуозный** (а. perisinuosus) — А., располагающийся между внутренней костной стенкой сосцевидного отростка и сигмовидным синусом твердой мозговой оболочки; осложнение мастоидита.
- а. перитонзиллярный** (а. peritonsillaris) — см. **а. околоминдаликовый**.
- а. печени** (а. hepatis) — А. формируется в ткани печени вследствие гнойного воспаления; является чаще всего результатом холангита.
- а. печени перихолецистический** (а. hepatis pericholecysticus) — А. п., формирующийся вследствие распространения воспаления на ткань печени при гнойном холецистите.
- а. печени пилефлебический** (а. hepatis pyelephibicus) — А. п., формирующийся при пилефлебите в результате распространения процесса на конечные внутрипеченочные ветви воротной вены.
- а. печени холангиогенный** (а. hepatis cholangiogenus) — см. **а. печени холангитический**.
- а. печени холангитический** (а. hepatis cholangiticus; син. А. печени холангиогенный) — А. п. расположен по ходу внутрипеченочных желчных протоков и возникает как осложнение гнойного холангита.

- а. поддиафрагмальный** (a. subdiaphragmaticus) — А. п. располагается в поддиафрагмальном пространстве брюшной полости; является, как правило, осложнением гнойных воспалительных процессов органов брюшной полости.
- а. поднадкостничный** (a. subperiostalis; син. А. субпериостальный) — А., располагающийся под надкостницей; возникает обычно при остром остеомиелите.
- а. подпеченочный** (a. subhepaticus) — А. располагается в полости брюшины между нижней поверхностью печени и петлями кишечника; возникает в результате отграниченного гнойного перитонита.
- а. позадиглоточный** (a. retropharyngeus) — см. **а. заглоточный**.
- а. позадииматочный** (a. retrouterinus) — А., локализующийся в прямокишечно-маточном углублении брюшной полости; возникает как осложнение салпингоофарита (аднексита) или, реже, гнойного аппендицита.
- а. потовых желез множественный** (a. sudoriparus multiplex) — см. **псевдофурункулез**.
- а. почечный** (a. renalis) — А., располагающийся в почечной паренхиме; одна из форм острого гнойного пиелонефрита.
- а. предпузырный** (a. praevesicalis) — А. располагается в клетчатке, расположенной впереди от мочевого пузыря; возникает, как правило, в результате парацистита.
- а. гнильный** (a. putridus) — см. **а. гангренозный**.
- а. ретромаммарный** (a. retromammarius) — А., располагающийся в клетчатке позади молочной железы; возникает при глубокой форме гнойного мастита.
- а. ретрофарингеальный** (a. retropharyngeus) — см. **а. заглоточный**.
- а. скуловой** (a. zygomaticus) — см. **зигоматит**.
- а. субареолярный** (a. subareolaris) — А., располагающийся под кожей околососкового кружка молочной железы; возникает при поверхностной форме гнойного мастита.
- а. субгингивальный** (a. subgingivalis) — см. **а. десневой**.
- а. субдуральный** (a. subduralis) — А., располагающийся под твердой мозговой оболочкой головного или спинного мозга.
- а. субпериостальный** (a. subperiostalis) — см. **а. поднадкостничный**.
- а. тонзиллярный** (a. tonsillaris) — см. **а. миндаликовый**.
- а. туберозный** (a. tuberosus) — см. **гидраденит**.
- а. холодный** (a. frigidus) — А., характеризующийся слабой интенсивностью местной воспалительной реакции.
- а. хронический** (a. chronicus) — А., протекающий медленно, при мало выраженных общих и местных симптомах гнойного воспаления; возникает при некоторых инфекционных болезнях (туберкулез, актиномикоз и др.) или при проникновении маловирулентных возбудителей гнойной инфекции.
- а. Чителли** — см. **Чителли абсцесс**.
- а. экстрадуральный** (a. extraduralis) — см. **а. эпидуральный**.
- а. эпидуральный** (a. epiduralis; син. А. экстрадуральный) — А., располагающийся между твердой мозговой оболочкой и костями черепа; образуется вследствие открытой черепно-мозговой травмы или в результате нагноения эпидуральной гематомы, распространения гнойного воспаления из среднего уха или околоносовых пазух.
- а. эпидуральный спинальный** (a. epiduralis spinalis) — А., локализующийся в эпидуральной клетчатке позвоночного канала; возникает при гнойном спинальном эпидурите.
- абсцессография** (абсцесс + греч. gíarho писать, изображать) — рентгенологическое исследование сформировавшегося абсцесса после искусственного контрастирования его полости.
- а. непрямая** — А., при которой вводят контрастное вещество через имеющийся к абсцессу доступ (дренаж, свищ).
- а. прямая** — А., при которой контрастное вещество вводят при пункции абсцесса.
- абсцессотомия** (abscessotomia; абсцесс + греч. tome разрез, расечение) — хирургическая операция вскрытия абсцесса.
- abscessus multiplex in pantum** — см. **псевдофурункулез**.
- абсцессэктомия** (abscessectomy) — хирургическая операция иссечения или вылушивания инкапсулированного абсцесса без его вскрытия.

абузус (лат. abusus употребление, злоупотребление) — непродолжительное (в течение одного или нескольких дней) употребление чрезмерного количества алкоголя или других наркотических средств, приводящее к выраженной интоксикации.

а. медикаментозный (abusus medicamentosus) — употребление лекарственного средства, не вызванное медицинской необходимостью и (или) в больших, чем нужно, количествах.

Абуладзе методика (К. С. Абуладзе, сов. физиолог) — 1) способ исследования рефлекторного слезотечения у собак, основанный на оперативном выведении наружу протоков обеих слезных желез; 2) способ исследования рефлекторного слюноотделения у собак, основанный на оперативном выведении наружу симметричных лоскутов с задней трети языка с сохраненной иннервацией и кровоснабжением.

Абуладзе прием (Д. А. Абуладзе, сов. акушер-гинеколог) — акушерский ручной прием выделения последа, заключающийся в фиксации брюшной стенки путем плотного охватывания обеих прямых мышц живота с образованием вертикальной складки брюшной стенки, после чего роженице предлагают потужиться.

абулия (abulia; a- + греч. bule воля; син. дисбулия) — патологическое отсутствие желаний и побуждений к деятельности.

Абурела операция (Е. А. Aburel, румын. гинеколог) — пластическая операция при множественной миоме матки, заключающаяся в иссечении вместе с узлами опухоли двух лоскутов на передней и задней поверхности матки, клиновидном иссечении узлов из боковых стенок и формировании матки за счет сохранных боковых стенок.

Абурела проба (Е. А. Aburel, румын. гинеколог) — см. **окситоциновая проба**.

абэмбриональный полюс — полюс бластоцисты (бластодермического пузырька), противоположный полюсу, у которого формируется тело зародыша.

Авеллиса синдром (G. Avellis, нем. оториноларинголог) — сочетание паралича мягкого неба и голосовой мышцы на стороне патологического очага в ЦНС с центральным гемипарезом (гемиплегией) на противоположной стороне; относится к бульбарным альтернирующим синдромам, наблюдается при поражении продолговатого мозга на уровне двойного ядра.

Аветисова способ (Э. С. Аветисов, сов. офтальмолог) — способ лечения амблиопии, основанный на локальных раздражениях центральной ямки сетчатки светом большой яркости.

авиаденовирусы (Aviadenovirus; лат. avis птица + аденовирусы) — род вирусов сем. аденовирусов, к которому относятся аденовирусы птиц; патогенность для человека не установлена.

авиационное санитарное звено — подразделение санитарно-авиационных частей или частей транспортной авиации, предназначенное для аэроэвакуации пораженных и больных.

авиаэвакуация — см. **аэроэвакуация**.

авидин — гликопротеид, содержащийся в яичном белке птиц и рептилий и обладающий свойством образовывать в организме биологически неактивный комплекс с биотином; при повышенном поступлении А. с пищей у человека развивается недостаточность биотина.

авидитет (франц. avidite; лат. aviditas алчность, страсть) — степень прочности полученного комплекса антиген—антитело.

авипоксвирусы (Avipoxvirus; лат. avis птица + поксвирусы) — род вирусов сем. поксвирусов; типичный представитель — вирус оспы птиц; для человека непатогенен.

авирулентность (a- + лат. virulentus — ядовитый) — неспособность отдельных штаммов патогенных видов микроорганизмов вызывать заболевание.

авитаминоз (avitaminosis) — разновидность витаминной недостаточности, характеризующаяся практически полным отсутствием поступления витамина в организм.

Авситидийского—Игуменакиса симптом (истор.; И. Т. Авситидийский, рос. дерматовенеролог; Higoimenakis, греч. врач) — утолщение грудинного конца правой ключицы; вероятный признак позднего врожденного сифилиса.

авто- — 1) см. **ауто-**; 2) составная часть сложных слов, означающая «автоматический», «автономный», «автомобильный».

автоанализатор — прибор (система приборов), используемый в медицине и биологии для автоматизации отдельных видов биохимических и морфологических исследований (определение концентрации компонентов смеси, скорости каталитических процессов, активности ферментов, количества, размеров и формы микрочастиц и др.).

а. морфологический — см. **счетчик клеток крови автоматический**.

автогисторадиография — см. **гистоауторадиография**.

автокампиграфия (авто- + лат. *campus visionis* поле зрения + греч. *grapho* записывать) — метод исследования зрительных и глазодвигательных функций, при котором получаемые данные регистрируются на специальном экране самим испытуемым; используется для выявления и определения размеров Scotoma, определения границ поля зрения, изучения метаморфопсий и косоглазия.

автоклав (авто- + лат. *clavis* ключ) в медицине — см. **стерилизатор паровой**.

автомакс — переносимый на спине ручной аппарат для распыления жидкостей сжатым воздухом; применяется для дезинфекции и дезинсекции помещений и других крупных объектов.

автоматизированные действия — сложные двигательные акты и другие последовательные действия, протекающие без контроля сознания.

автоматизм (греч. *automates* самодельствующий, самопроизвольный; син. **автоматия**) в физиологии — способность органов, отдельных клеток или тканей к ритмической деятельности вне очевидной связи с внешними побудительными причинами.

а. гетеротопный — двигательный А. сердца, обусловленный импульсацией, исходящей из очага возбуждения, расположенного вне номотопного водителя ритма.

а. гетеротопный активный (син. **гетеротопия активная**) — А. г., проявляющийся на фоне неизменных импульсов, исходящих из номотопного водителя ритма.

а. гетеротопный пассивный (син. **гетеротопия пассивная**) — А. г., проявляющийся на фоне снижения частоты или полного отсутствия импульсации, исходящей из номотопного водителя ритма.

а. двигательный — А., проявляющийся в виде однообразных стереотипных движений.

а. номотопный — двигательный А. сердца, обусловленный активностью номотопного водителя ритма.

автоматизм в психологии — умственный, речевой или двигательный акт, происходящий без непосредственного участия сознания.

а. амбулаторный (лат. *ambulo* прогуливаться) — сумеречное помрачение сознания, без выраженных аффективных расстройств, проявляющееся длительным непроизвольным блужданием с упорядоченным поведением, выполнением сложных действий и последующей амнезией; наблюдается гл. обр. при эпилепсии.

а. ассоциативный — см. **автоматизм идеаторный**.

а. аффективный — вид психического А. с возникновением чуждых больному эмоций, вызванных мнимым внешним воздействием.

а. гипнотический — выполнение сложных действий с упорядоченным поведением и речью в состоянии гипнотического сна.

а. идеаторно-мнестический — см. **автоматизм идеаторный**.

а. идеаторный (син.: А. ассоциативный, А. идеаторно-мнестический) — вид психического А., проявляющегося в виде чувства насильственного отнятия и (или) вкладывания мыслей.

а. психический — психопатологическое явление, заключающееся в том, что больной ощущает собственные психические процессы (мыслительные, сенсорные, моторные) как навязанные извне в результате постороннего воздействия (симптом шизофрении).

а. речедвигательный — вид психического А. с восприятием собственной речи как чужой, вызванной насильственно, путем мнимого воздействия извне.

а. сенестопатический (син. А. чувственный) — вид психического А. в форме сенестопатий с локализацией необычных тягостных ощущений в различных областях тела, сочетающихся с бредом воздействия.

а. чувственный — см. **автоматизм сенестопатический**.

автоматический счет — метод исследования экспрессивной функции речи при моторной афазии, заключающийся в оценке воспроизведения больным натурального ряда чисел (1, 2, 3 и т. д.).

автоматическое блуждание — см. **сомнамбулизм**.

автоматическое хватание (син.: рефлекс хватательный дистантный, «рука магнитная», феномен автоматического хватания и преследования) — непроизвольное схватывание предметов, находящихся в поле зрения больного, или непроизвольное движение руки больного вслед за передвигающимся предметом; наблюдается при поражении лобных долей мозга.

автоматия (греч. *automates* самодельствующий, самопроизвольный) — см. **автоматизм**.

автономизация развития (греч. *autonomos* самостоятельный, независимый) — форма эволюции онтогенеза, характеризующаяся уменьшением зависимости процессов формообразования от внешних влияний и переходом детерминирующей роли к внутренним факторам; у высших животных обеспечивает стабильность процессов формообразования в развивающемся организме.

автооперационная (син. **операционная подвижная**) — автомобиль со специальным кузовом, оборудование и конструкция которого предназначены для использования его в качестве операционной при оказании хирургической помощи в полевых условиях.

автоперевязочная (син. **перевязочная подвижная**) — автомобиль со специальным кузовом, оборудование и конструкция которого предназначены для использования его в качестве перевязочной при оказании медицинской помощи в полевых условиях.

авторентген (АР; син. **рентгеновая станция передвижная** — устар.) — автомобиль со специальным кузовом, в котором размещены рентгеновая установка и другое оборудование для рентгенологических исследований в полевых условиях.

автохтонный (греч. *autochthon*, туземный, местный; син. **аутохтонный**) — находящийся в месте возникновения или образования.

avulsio bulbi oculi (лат. *avulsio* отрывание; *bulbus oculi* глазное яблоко) — отрыв глазного яблока от зрительного нерва в результате травмы.

авульсия (лат. *avulsio* отрывание, удаление) — см. **экзерез**.

Авцына мезоглиобластома (А. П. Авцын, сов. патологоанатом) — см. **микроглиома**.

Авцына метод (А. П. Авцын, сов. патологоанатом) — метод окраски миелиновых образований в ЦНС путем импрегнации гистологических срезов мозга фосфорно-молибденовым серебром.

Авцына проба (А. П. Авцын, сов. патологоанатом) — метод выявления кровоизлияний в гиперемированной конъюнктиве при сыпном тифе путем введения адреналина в конъюнктивальный мешок.

агалактия (*agalactia*; а- + греч. *gala*, *galaktos* молоко) — отсутствие секрета молока после родов.

а. вторичная (*a. secundaria*) — А., обусловленная нарушением секреции гормонов передней доли гипофиза или нейрогормонов гипоталамуса.

а. первичная (*a. primaria*) — А., обусловленная патологией молочных желез.

агаммаглобулинемия (*agammaglobulinaemia*; а- + *гаммаглобулины* + греч. *haima* кровь; син.: **гипоагаммаглобулинемия**, **синдром дефицита антител**) — общее название группы наследственно обусловленных болезней, сопровождающихся ослаблением гуморальных и клеточных механизмов специфической защиты вследствие отсутствия или резкого снижения уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови.

агамогония (agamogonia; греч. agamos безбрачный + gone зарождение, потомство) — общее название различных типов бесполого размножения у беспозвоночных, напр., шизогония у споровиков.

агамонематодозы (agamonematodoses) — гельминтозы, вызываемые мигрирующими в организме человека или животного личинками нематод, видовая принадлежность которых не установлена.

агамонематоды (agamonematodum; греч. agamos безбрачный + нематоды) — личинки или неполовозрелые нематоды неизвестной видовой принадлежности, обнаруживаемые у человека и животных.

агамонты (agamontes; a + gamo- + греч. on, ontos сущее, существо) — общее название бесполой стадии развития простейших кл. споровиков, напр., трофозоит, шизонт, морула, мерозоит в жизненном цикле малярийного плазмодия.

агар (малайск.; син. agar-agar) — материал, получаемый из некоторых водорослей (в бывшем СССР — из красной водоросли *Ahnfeltia plicata*), образующий в водных растворах плотный гель (студень); применяется в микробиологии для приготовления питательных сред, а также в фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности.

а. висмут-сульфитный — плотная селективная питательная среда для выделения возбудителя брюшного тифа и других салмонелл, содержащая лимоннокислый висмут, сернистокислый натрий и соль Мора; модификация среды Вильсона—Блера.

а. Дьедоне — см. Дьедонне агар.

а. железосульфитный — см. Вильсона—Блера среда.

а. казеиново-угольный (КУА) — плотная селективная питательная среда для выделения возбудителя коклюша, содержащая солянокислый гидролизат казеина, диализат дрожжей, активированный уголь, цистеин и неорганические соли.

а. кровяной Левингала — см. Левингала кровяной агар.

а. Мартина — см. Мартина агар.

а. мясопептонный (МПА) — плотная или полужидкая питательная среда для культивирования микробов, состоящая из мясопептонного бульона и агара (0,5–2 %); служит основой многих питательных сред.

а. пептонный Сабуро — см. Сабуро пептонный агар.

а. питательный — плотная или полужидкая питательная среда, содержащая 0,3–5 % агара.

а. теллуригит-шоколадный — см. Мак-Лауда среда.

а. Хоттингера — см. Хоттингера агар.

агар-агар — см. агар.

агароид (агар + греч. -eides подобный) — агароподобное вещество, получаемое из черноморских водорослей рода *Phyllophora*; применяется вместо агара.

агастрия (а- + греч. gaster, gastros желудок, живот) — аномалия развития: отсутствие верхней части брюшной стенки и органов верхней половины брюшной полости.

Агафонова ложка-катетер (Б. Н. Агафонов, сов. акушер-гинеколог) — см. эксцеребратор.

агглютинат (лат. agglutino, agglutinatium склеивать) — осадок, образующийся в процессе агглютинации.

агглютинаторы (лат. agglutino, agglutinatium склеивать) — см. гомореактанты.

агглютинация (лат. agglutinatio склеивание) — явление склеивания и выпадения в осадок взвешенных частиц — бактерий, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, клеток тканей, а также поверхностно-активных частиц вследствие взаимодействия их поверхностных или адсорбированных на их поверхности антигенов со специфическими антителами.

Н-агглютинация — крупнохлопчатая А. жгутиковых бактерий, наступающая при их взаимодействии со специфической иммунной сывороткой, содержащей антитела к Н-антигену.

О-агглютинация (син.: А. полярная, А. соматическая) — мелкозернистая А. бактерий, наступающая при их взаимодей-

ствии со специфической иммунной сывороткой, содержащей антитела к О-антигену.

Vi-агглютинация — А., наступающая при взаимодействии бактерий, имеющих Vi-антиген (напр., брюшнотифозных палочек), со специфической иммунной сывороткой, содержащей антитела к этому антигену.

а. групповая — специфическая А. клеток или бактерий, наступающая под действием антител, направленных к групповым (общим) антигенам.

а. макроскопическая — А., выявляемая невооруженным глазом на основании изменения степени гомогенности суспензии антигена или характера его осаждения.

а. микробная — реакция агглютинации, широко применяемая для идентификации видов и типов бактерий и других микробов по известным сывороткам, а также для обнаружения специфических антител в сыворотке крови по известным антигенам.

а. микроскопическая — мелкозернистая А., выявляемая только под микроскопом.

а. полярная — см. О-агглютинация.

а. соматическая — см. О-агглютинация.

а. специфическая — А., обусловленная взаимодействием корпускулярного антигена со специфическими антителами.

агглютинины (лат. agglutino, agglutinatium склеивать) — антитела, агглютинирующие корпускулярные антигены, а также растворимые антигены, адсорбированные на эритроцитах или частицах инертного носителя; принадлежат к IgM и IgG.

а. антилейкоцитарные — см. антитела лейкоагглютинирующие.

а. анти-Р — А. к одной или нескольким разновидностям антигена Р эритроцитов человека.

а. анти-Т — А. к антигену Томсена—Фриденрейха, появляющиеся в эритроцитах и других клетках под действием нейраминидазы бактерий и вирусов.

а. групповые (син. антитела групповые) — естественные А. сыворотки человека, направленные против соответствующих изоантигенов крови системы АВ0.

а. холодовые — А., для которых температурный оптимум реакции агглютинации находится при 18 °С и ниже.

агглютиногены — антигены, участвующие в реакции агглютинации.

агглютинископ (агглютинация- + греч. skopeo рассматривать, наблюдать) — прибор для наблюдения реакции агглютинации при боковом освещении и визуальной оценки результатов осадочных реакций.

аггравация (aggravatio; лат. aggravare, aggravatum отягощать, ухудшать) — преувеличение больным симптомов действительно имеющегося заболевания.

а. активная — умышленная А., при которой больной совершает действия, ведущие к ухудшению состояния своего здоровья или затягиванию болезни.

а. пассивная — умышленная А., ограничивающаяся преувеличением отдельных симптомов, но не сопровождающаяся действиями, препятствующими проведению лечения.

а. патологическая — А. соматических заболеваний психически больными (при декомпенсации истерической психопатии, истерическом неврозе, истерическом психозе и т. п.).

а. подсознательная — А., вызванная неосознанным стремлением больного привлечь к себе сочувствие окружающих, внимание медицинского персонала.

а. сознательная — см. аггравация умышленная.

а. умышленная (син. А. сознательная) — А. с целью извлечения каких-либо выгод; А. у., сопряженная с нарушением закона, может быть наказуема.

агевзия (ageusia; а- + греч. geusis вкус) — утрата вкусовой чувствительности.

агенезия (agenesia; а- + греч. genesis происхождение, развитие) — см. аплазия.

агипногнозия (ahypnognosia; а- + греч. hypnos сон + gnosis познание) — отсутствие осознания сна, выражающееся в жалобах на полную его потерю при наличии у больного объективно установленных периодов сна.