

Г. Е. Рахманин

Охота на зайца

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 796
ББК 75.5
Г11

Г11 **Г. Е. Рахманин**
Охота на зайца / Г. Е. Рахманин – М.: Книга по Требованию, 2023. – 54 с.

ISBN 978-5-519-15546-5

Репринт оригинального издания 1951 года.

ISBN 978-5-519-15546-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Зайцу-беляку свойственно резко выраженное сезонное изменение окраски: летом он рыжевато-бурого цвета, зимой - снежно-белого, за исключением кончиков ушей, которые остаются черными.

В зависимости от подвидовой принадлежности-местности обитания и индивидуальных свойств (пол, физическое состояние, упитанность и пр.) - размер и вес беляка сильно колеблются: длина тела в пределах 45-65 см, вес - 2,5-5,5 кг.

Заяц-беляк в СССР распространен по всей тундровой, лесной и лесостепной полосам. Южная граница его распространения в европейской части Советского Союза проходит приблизительно по городам Чернигов, Тамбов, Саратов Чкалов. Изолированными колониями заяц-беляк встречается и в некоторых более южных местностях. Так, например, зафиксировано его обитание в ряде районов Киевщины, Полтавщины, в Воронежской области и т.д. В азиатской части СССР заяц-беляк распространен всюду - от Северного Казахстана до Дальнего Востока включительно. На Кавказе, в Крыму и в большей части Средней Азии беляка нет.

Помимо Советского Союза, заяц-беляк встречается и в северной части Западной Европы (Финляндия, Скандинавия, Британские острова) и в Северной Америке.

В пределах СССР заяц-беляк образует ряд подвидов, отличных друг от друга как размерами и весом, так и окраской волосяного покрова и рядом других признаков.

Заяц-беляк - типичный житель лесов. Лишь в тундровой зоне и местами на юге заяц-беляк держится в безлесных местностях, но и здесь преимущественно придерживается кустарниковых зарослей или изрезанных берегов рек и озер. Являясь типичным обитателем леса, заяц-беляк вместе с тем избегает больших лесных массивов, отдавая явное предпочтение лесам, прорезанным старыми гарями, вырубками, лужайками и т.д. Особенно не любит беляк сплошных массивов хвойного леса, лишенного лиственного подлеска и травяной растительности. Редко можно встретить беляка и в чисто лиственных насаждениях лесной полосы. Исключением являются березовые колки лесостепной полосы Сибири, где этого зайца довольно много. Впрочем, следует заметить, что эти колки являются вообще единственным типом лесонасаждений этой полосы.

Наиболее часто встречается заяц-беляк в, перемежающихся со старыми уже заросшими лиственным молодняком вырубками и гарями, лужайками и в прочих смешанных лесных насаждениях с преобладанием хвойных пород, в особенности ели.

По периодам года места лежек беляка различны. Так, летом беляк преимущественно залегает в тенистых, густых лесах с редким подлеском. Зимой, наоборот, - в лесах с более или менее плотным подлеском, особенное предпочтение отдавая подлеску из молодых порослей ели, зарослей можжевельника и т.д., дающих хорошее укрытие.

Жирует беляк летом, главным образом, в редкостойных участках леса, богатых травяным покровом, а в некоторых местностях - преимущественно в посевах овса и огородных культур. Любит этот зверек жировать летом и в зарослях кустарниковой ивы по долинам рек, в особенности там, где эти заросли перемежаются с участками кое-где покрытых редкой травяной растительностью песков. Здесь беляк не только жирует, но и «купается» в песчаных ямках, освобождаясь этим путем, видимо, от клещей и других паразитов.

Зимой беляк кормится преимущественно в редкостойных лесах, по старым гарям и вырубкам, в долинах рек, где преобладающими породами подлеска и подроста являются ива, осина и береза.

Пища беляка в различные периоды года различна. Летом этот зверек кормится преимущественно зелеными частями различных, главным образом травянистых растений. В европейской части СССР охотнее всего беляки в летнее время поедают клевер, одуванчик, тысячелистник, мышиный горошек, подмаренник, реже - конский щавель, полынь, подорожник, золотую розгу, кошачью лапу, многие виды осок и т.д. Местами охотно едят молодые побеги овса, грибы (в частности олений трюфель, который вырывают из земли) и т.д.

С наступлением осени, часто уже в сентябре, по мере высыхания травяной растительности беляк постепенно переходит на питание веточками черники, ивы и т.д., а также корой осины. В более позднюю пору, зимой, основной пищей беляка являются ветки и молодые побеги различных мягких и широколиственных пород кустарников и деревьев, а равно и их кора. Наряду с этим беляк охотно поедает сухие стебли и листья трав, а в ряде случаев и сено, в особенности клеверное.

Как и многие другие грызуны, беляки размножаются несколько раз в год. Число пометов в северных районах распространения беляка - 2, в южных - 3. В третьем помете участвуют не все самки. В северных районах первый гон происходит во второй половине - конце марта, а в более южных местностях в середине этого месяца. Беременность у самки-беляка длится 49-51 день. Во время гона самки издают характерный крик, привлекающий самцов. Между последними нередко происходят драки. Котятся зайчихи на поверхности земли в кустах. В тундре - иногда в выкопанных в земле норах.

Число молодых в помете, колеблясь в пределах от 1 до 10, в среднем составляет 5-8. Наименьшее количество зайчат бывает в третьем помете, наибольшее - во втором. В третьем (осеннем) помете обычно участвуют самки, которые не котились в июне (т.е. во втором помете). Средняя величина помета беляка по годам меняется довольно существенно.

Молодые зайчата способны передвигаться в первый же день после рождения. Они находятся некоторое время вместе с матерью, не разбегаясь далеко друг от друга. Находят их обычно целым выводком. Зайчата рождаются весом в 90-130 г. Растут они чрезвычайно быстро и уже на 9-10-й день едят траву и начинают самостоятельный образ жизни (без матери). Продолжительность жизни беляка около 7-8 лет.

Численность беляка по годам сильно колеблется, в годы минимума составляя всего 18-20% от численности в годы максимума. Основной причиной колебаний численности беляка являются вспышки заразных заболеваний, более или менее регулярно повторяющиеся среди этих зайцев. Наибольший урон заячьему поголовью причиняют глистные болезни, вызываемые легочными и кишечными паразитами. Болеют беляки и другими инфекционными болезнями. Массовые заболевания и большая смертность зайцев обычно падают на годы высокой численности этого зверька и наличия благоприятных условий для развития возбудителей этих болезней. Замечено, что вспышки заболеваний зайцев бывают, главным образом, в холодные и дождливые годы и чаще наблюдаются в сырых, болотистых местностях. Напротив, в засушливые годы, а равно в сухих, песчаных местностях заболевания зайцев беляков наблюдаются значительно реже.

Врагов у зайцев-беляков очень много. Наиболее серьезными врагами беляка являются лисица и рысь, а из пернатых - ястреб-тетеревятник и филин. Чаще всего жертвами указанных хищников становятся ослабевшие, больные зайцы.

В долинах больших рек, по островам которых в значительных количествах держатся беляки, в годы высокого паводка бывают случаи массовой гибели зайцев от внешней воды.

Беляк линяет дважды в год. Весенняя линька обычно начинается: на севере - с середины марта, а в более южных местностях - с конца февраля. Заканчивается весенняя линька в мае, а на севере даже в начале июня. Осенняя линька начинается с конца августа и заканчивается (смотря по погоде и широте местности) в октябре и (в более южных местностях) в ноябре. Осенью сначала белеют задние лапы и круп, затем передние лапы и бока. Дольше всего задерживается летний волос на спине и около глаз. Весенняя линька протекает в обратном порядке. Первыми белеют осенью старые самцы. Молодняк, в особенности последнего помета, и самки линяют несколько позднее.

Заяц-русак характеризуется относительно крупными размерами: общая длина тела 56-68 см, вес от 4,0 до 5,0, а иногда и до 7,0 кг. Хвост у русака, как уже отмечалось выше, клиновидной формы, длиннее, чем у беляка, с черным или черноватым участком на верхней поверхности. Уши - длинные. Загнутые вперед, они заходят за конец носа. Общий цвет волосяного покрова русака летом желтовато-палево-рыжий, с ясно заметной крупной рябью. Сезонные изменения окраски волосяного покрова у русака выражены несравненно слабее, чем у беляка. Степень поедения рубака на зиму находится в зависимости от широты местности, где он обитает. Так, русаки, живущие на Кавказе и в Крыму, зимой окраски не меняют. У русаков, обитающих в пределах Украинской ССР и в центральной степной полосе, зимой заметно лишь некоторое поедение боков тела. Наконец, у русаков, живущих в более северных местностях, зимнее побеление выражено несравненно сильнее, причем у тех из них, которые живут у северной и северо-восточной границы распространения, на зиму темным остается только узкий «ремень», тянущийся на спине по хребту.




Рис. 2. Заяц-русак

Полоса распространения русака лежит в пределах южной и средней Европы и лишь частично заходит в Азию. В настоящее время в СССР восточная и северная граница области распространения русака проходит от северо-восточного угла Каспийского моря на восток, к северной оконечности Аральского моря. Отсюда граница идет на север, к Акмолинску и Омску. Здесь она сворачивает на запад, подходит к Кургану и к Свердловску. В глубь Уральского хребта русак не заходит. Огибая хребет с юга и с запада, граница поднимается к северу до Молотов а. Отсюда она поворачивает на северо-запад и, пересекая верховья рек Вятки и Сухоны, проходит несколько южнее Архангельска к северной оконечности Онежского и Ладожского озер.

Следует указать, что на протяжении последнего столетия область обитания русака в России заметно расширилась, в основном за счет энергичного, но не постепенного, а скачками (в годы наивысшего подъема численности) расселения этого зверька на восток и север. Наиболее быстрое продвижение русака наблюдалось на востоке, в южных степях, т.е. в типичные для русака места. Расселение на север, несомненно, было связано с изменением ландшафтов, вызванным расширением площадей, занятых посевами, лугами, вырубками, гарями и т.д.

Район обитания русака расширен у нас и искусственно путем акклиматизации этого зверька в ряде восточных областей и краев. Так, в период с 1936 по 1939 г. около 1000 русаков, отловленных в Башкирской и Татарской АССР, были выпущены в различных районах Новосибирской, Иркутской и Читинской областей, Алтайского и Красноярского краев. Акклиматизация дала вполне положительные результаты, хотя до настоящего времени и не привела к значительному их размножению в новых местах обитания.

В пределах Советского Союза русак образует несколько подвидов, отличных друг от друга не только той или иной степенью зимнего побеления волосяного покрова, но еще и размерами тела и некоторыми другими признаками.

Русак - типичный обитатель открытых пространств. Охотно селится он в целинных степях, среди хлебных полей, в пойменных лугах, в зарослях кустарников среди полей и лугов и т.д. В более северных районах русаки, помимо хлебных полей и пойменных лугов, часто держатся еще и по лесным опушкам, в гарях и рубках. Лесов русак избегает, а в глубину хвойных лесов почти никогда не заходит. Даже в чисто лиственных лесах русаки держатся почти исключительно по опушкам, гарям, рубкам, у широких просек и дорог и т.д.

Человеческого жилья русак не только не избегает, до, наоборот, определенно тяготеет к нему, главным образом зимой. Возле жилья он находит остатки огородных растений, сено, садовые деревья, озими и т.д. На поля русака привлекает не только обилие корма зимой, но и его большая доступность.

Летом русак питается в основном травянистой растительностью. Зимой кормится сухими травянистыми растениями, озимями, корой лиственных древесных пород, сеном. Особенно охотно едят русаки в зимнюю пору молодые побеги и кору клена, ракитника, осины, вяза, боярышника, ивы, яблони, груши и т.д. Склонность русака к поеданию коры плодовых деревьев, а равно и молодых побегов указанных выше деревьев ведет к тому, что местами эти зверьки приносят значительный ущерб лесным посадкам и фруктовым садам.

Русаки мечут детенышей 2-3, а на юге даже и 4 раза в год. Период размножения у русака сравнительно растянут. На юге, в степях Предкавказья, беременные самки

попадают уже в январе - феврале. В северных частях степной зоны период размножения охватывает март - сентябрь. В еще более северных местностях, а равно и на северо-востоке период размножения у русака еще более сокращается, практически ограничиваясь мартом-июлем.

Средняя величина помета географически и по сезонам неодинакова. Наибольшее количество зайчат наблюдается во втором помете.

Период беременности у русака 45-48 дней. Рождение происходит на поверхности земли. Вес новорожденных зайчат около 100 г. Зайчата очень быстро растут и в возрасте 2 недель уже весят около 325-400 г. С этого возраста они начинают есть траву и вести самостоятельный образ жизни. На втором году жизни русаки уже становятся способными для размножения.

Численность русака по годам сильно колеблется, хотя эти зайцы (видимо, в основном вследствие особенностей заселяемых ими угодий) менее подвержены глистным заболеваниям, чем зайцы-беяки. Легочные глисты у русаков наблюдаются крайне редко, кишечные - несколько чаще.

На численность русаков существенное влияние оказывают метеорологические факторы. Особенно губительны весенние заморозки со снегопадом, которым предшествовала продолжительная оттепель. В этих условиях размножение начинается ранее обычных сроков, в результате чего первый помет погибает нередко почти целиком. Напротив, ранняя и дружная весна, без возвращения холодов, способствует массовому размножению русаков.

Врагов у русака много, и они наносят поголовью этого зверька довольно существенный урон.

Заяц-толай (или песчаник) по внешнему виду несколько напоминает русака, но значительно меньше последнего. Этот заяц имеет легкий склад тела, длинные лапы и уши. Последние лишены темной каймы по наружному краю. Верхняя поверхность хвоста имеет черное поле. Общий тип окраски несколько напоминает окраску русака, но волосяной покров толая более светлого цвета и лишен ясно заметных у русака пестрин. Помимо этого, шерсть толая не имеет той ясной волнистости, которая столь характерна для волосяного покрова русака.

Длина тела 40-55 см, вес 1,5-2,5 кг.

В пределах Советского Союза толай обитает в двух разобщенных друг от друга, обширных по площади участках. Наиболее широко толай распространен в Средней Азии, где встречается от Каспийского моря до гор Тянь-Шаня. Наряду с этим, толай обитает и в степной части Забайкалья, почти до Читы и Ундинского хребта. Наиболее обыкновенен он в долине рек Аргуни и Онона и далее к югу в Маньчжурии, Монголии и смежных пустынях Центральной Азии.

Толай образует несколько подвидов, отличающихся размерами и деталями окраски.

Толай живет преимущественно в низменностях по тугаям, в зарослях гребенщика и в барханных песках. Реже селится он в глинистых полынных полупустынях и на невысоких безлесных горах, например на таких хребтах, как Копет-Даг, Балханы, Кара-Тау.

На более высоких горах толай обитает, главным образом, в предгорьях и в нижнем, безлесном поясе гор. В Тянь-Шане выше 2000 м толай уже не встречается, но на Памире селится и выше, держась в большинстве случаев на горных плато. Глубоких снегов толай избегает и поэтому в горах часто перекочевывает на зиму в нижние, с менее глубоким снежным покровом пояса.

Питается толай преимущественно песчаной осокой, злаками (мятлик, типец), полынью, ветками гребенщика, каллигонума и других кустарников. Толай, живущие вблизи человеческого жилья, нередко являются вредителями бахчевых культур и хлебных злаков.

Толай отличается высокой плодовитостью. Самка мечет молодых 3-4 раза в год, причем в первом помете зайчат чаще всего бывает от 1 до 4 (обычно 1-2), во втором - 4-7 и в последующих - 3-5. В низменностях Средней Азии первый гон у толая происходит с половины января. Зайцы собираются небольшими группами до 5-6 штук, причем между самцами происходят ожесточенные драки. Котятся самки в первый раз в начале марта. Второй окот происходит в апреле - начале мая, третий - в июне - июле. Беременные самки встречаются даже в сентябре. Зайчата рождаются зрячими и в шерсти, весом в 85-95 г. Держатся вместе лишь первые дни, а затем разбредаются. Половозрелыми становятся на следующий год.

Численность толая довольно велика. Никакой другой вид зайцев не заселяет угодий с такой плотностью, как толай. Густота его заселения угодий примерно в 3-4 раза больше, чем плотность заселения угодий белякам. Как и у других зайцев, численность толая резко колеблется по годам. Причины столь резких колебаний численности толая заключаются, главным образом, в периодически вспыхивающих заболеваниях.

Длина и густота волосяного покрова толая меняется по сезонам не так заметно, как у беляка и русака. Весенняя линька (в Казахстане) начинается в конце февраля - начале марта. Осенняя линька заканчивается в половине ноября.

Маньчжурский заяц имеет плотное телосложение, небольшую, но широкую голову с короткими ушами. Тыльная сторона их явно двухцветная. Лапы относительно короткие. Верхняя поверхность хвоста сплошь черная. Окраска волосяного покрова по сезонам не меняется. Верх тела насыщенного ржаво-коричневого цвета, грудь и бока желтовато-рыжие, низ белый. Длина тела 42-52 см, вес - 1,6-2,5 кг.

В наших пределах маньчжурский заяц встречается только на юге Дальнего Востока, на севере - примерно до 49° с. ш. и по долине Амура до 51° с. ш. Наиболее обыкновенен он по долине реки Уссури. Южнее этот вид зайца водится в Корее и Маньчжурии. Живет он в лиственных и смешанных лесах с богатым подлеском. В хвойной тайге не встречается. Охотно селится в долинах рек, богатых зарослями ивы. Образ жизни этого зайца изучен крайне недостаточно.

Из всех видов зайцев в СССР в наибольшем количестве добывается заяц-беляк. Русака добывается несколько меньше, хотя это компенсируется лучшим качеством его шкурки и мяса. Толай добывается в относительно небольшом количестве, причем налицо все условия для того, чтобы повысить добычу этого вида зайца в несколько раз. Добыча маньчжурского зайца крайне незначительна.


Законодательством об охоте принимается ряд мер, направленных к сохранению запасов зайца. Основными из них являются: запрет охоты на зайца в период его размножения,

борьба с хищниками, запрещение применять некоторые способы лова зайца, ведущие к его массовому истреблению, борьба с браконьерством и другие.

Кроме того, в деле дальнейшего увеличения запаса зайца большую роль играет широко применяемая акклиматизация зайца в новых районах нашей страны.

Основными объектами ружейной охоты на зайцев, несомненно, являются заяц-беляк и заяц-русак. Охотничья практика выработала ряд специальных приемов ружейной охоты на этих зверьков.

О них и будет идти речь в следующих главах.





Глава вторая. Охота с гончими

Облетает лист... Печально, совсем не так, как бывало еще недавно летом, шумит раздетый лиственный лес. Оголились, опустели поля и луга. Поблекла, пожелтела растительность, и лишь одни зелены крепнувших озимых ярким, цветным пятном, радуя глаз, выделяются на тусклом, однообразном фоне умирающего лета. И день и ночь моросит, не переставая, мелкий, частый, как сквозь тонкое сито, дождь. Лишь изредка выпадает погожий денек и выглянет на осиротелую землю бледное солнышко... И тогда жди, что в ночь ударит крепкий заморозец: серебристым инеем покроется к утру трава, тонкой ледяной коркой подернутся лужицы. А днем опять затянется низкими тучами небо - и снова капли дождя будут поить и без того уже напитанную влагой землю...

Сбиваются в табуны тетерева, умолкают певчие птицы, отходят последние долгоносые, в разгаре отлет уток и гусей...

На смену знойному, полному жизни и ярких красок лету приходит ненастье, увядание, мрачная тишина... Приходит осень...

Скучная, навевающая грустные мысли эта пора... Но только не для охотника!

Многим дарит охотника осень. И среди ее даров далеко не последнее место занимает охота с гончими на беляка и русака.

Охоту на зайцев с гончими следует начинать* с середины октября, когда все полевые работы уже закончены и природа оделась в осенний наряд. К этому времени в большинстве случаев молодые зайчата последних пометов уже вполне созревают и по величине и весу почти сравниваются со взрослыми зайцами. Помимо этого соображения, следует иметь в виду, что в начале осени работа гончих, по сравнению с более поздним временем, сильно затруднена. Высокая трава, нависшие, еще покрытые листвой ветви, плотные заросли кустарников и чаща лиственного молодняка - мешают гончим. Они начинают терять след, скалываются, проносятся мимо запавшего зайца и т.д. Да и заяц в эту пору, в особенности молодой, идет под гончими далеко не так, как поздней осенью: часто западает, неохотно покидает острова, кружится по одним и тем же местам, упорно придерживаясь крепей и т.д. Не следует также забывать и того, что ранней осенью нередко выпадают очень теплые дни, что сильно отражается как на работе, так и на выносливости собак.

* Конечно, сообразуясь при этом с действующими в данной местности правилами о сроках и способах охоты.

Лучшая пора для охоты с гончими начинается тогда, когда облетит лист с деревьев, заметно поредеет лиственная чаща, поблекнет и пригнется к земле трава и в лесу, несмотря на пасмурное небо и временами идущий мелкий дождь, станет как-то светлее и просторнее.

Заяц - животное преимущественно ночное. Поэтому вся жизнь зайца за редкими исключениями (главным образом, в периоды гона, когда нередко можно увидеть зайца бодрствующим и даже бродящим дном) проходит ночью. С рассветом заяц обычно заканчивает жировку, разыскивает укромное местечко и затаивается на дневной отдых.

В силу указанного, отправляясь на охоту с гончими, всегда следует выходить как можно раньше, чтобы с первыми проблесками дня быть уже на месте охоты. В этом случае собаки несравненно скорее разыщут зайца, перехватят его еще горячий след с жировки. Лишь в дни с сильными утренниками лучше выходить на охоту несколько позднее, давая тем самым земле немного отойти.

И беляк, и русак, как и все остальные звери и птицы, очень чутко реагируют на всякое изменение погоды. Поэтому в зависимости от метеорологических факторов следует отыскивать зайцев в отличных друг от друга угодьях.

Как общее правило следует указать, что беляк преимущественно придерживается более сырых мест, а русак, напротив, - более сухих.

Если осень стоит дождливая и воды много везде, беляка нужно искать в более сухих угодьях. Наоборот, в сухую осень нет смысла разыскивать беляков там, где нет воды: все они переселяются в заросли по берегам речек, ручьев, озер, на окраины болот и т.д. В сильный дождь мало надежды найти беляка в лесу, еще одетом листвой. Шум падающих дождевых капель пугает зайца, и он переключивается на время дождя в самые густые, плотные заросли (ельник, можжевельник и проч.), а иногда и уходит в поля и кустарники, где и лежит чрезвычайно крепко. Аналогичное явление имеет место и в разгар листопада, а иногда и в сильный ветер. В упорно дождливую погоду беляк нередко вовсе покидает лиственный лес, в котором обычно держится, и перебирается в смешанный или даже в хвойный. Нередко находит себе защиту от непогоды заяц и в молодых чащах ельника, смешанного с березняком. С выпадением снега и наступлением холодов беляки, как правило, перебираются из мелочей и других мест, где держатся осенью, в крупный, преимущественно смешанный лес, избегая чистых боров, и живут здесь по опушкам, в осинниках и ивняках, вдоль лесных дорог, у лужаек, старых гарей, вырубок и т.д.

Русак в хорошую погоду осенью держится всегда вблизи полей по жнивам, в озимях по межам и т.д., залегая на день или в чистом поле, или в прилегающих к нему мелких кустарниках. Лишь у северной границы области своего распространения русаки жируют не только в полях, но и по лесным вырубкам и гарям, покосам, окраинам болот и т.д. По мере наступления холода и выпадения снега русак все более и более приближается к жилью, кормясь преимущественно на озимях, огородах, в садах, около гумен и т.д. и залегая на день где-либо от них поблизости. В ненастную и ветреную погоду, а тем более в снегопад русак избегает ложиться на открытых местах, избирая для лежки опушки лесов, овраги и иные защищенные от ветра места. Зимой он устраивает себе логово в вырытой в снегу ямке. Некоторые русаки, в особенности там, где их относительно мало тревожат, нередко располагаются на дневной отдых у гумна или под ригой, у деревенских бань, под огородными заборами и т.д.

Самая лучшая погода для охоты с гончими - безветренная, пасмурная, прохладная, но без заморозков, так чтобы под ногой было мягко и сыро. По влажной земле гончие обычно работают очень хорошо. Не плох бывает и по тающему снегу, в оттепель, если, конечно, снежный покров не очень глубок. Мелкий осенний дождь ни в малейшей степени не отражается на работе гончих и вообще на успешности охоты. Зато сильный дождь определенно портит охоту, заглушая гон и затрудняя работу собак. Поэтому в такую погоду, пожалуй, лучше вовсе не выходить на охоту, чтобы не мотать зря и себя, и собак; мешает охоте и сильный ветер, особенно в ту пору, когда деревья еще не успели окончательно сбросить листву. Заяц в этих условиях ходит под гончими неправильно, часто далеко уводит собак, да и гон из-за ветра почти не слышен. Охотясь с гончими в сильный ветер, рекомендуется всегда устраиваться так, чтобы собаки находились от охотника против ветра. К сожалению, это не всегда возможно, так как многое здесь зависит не от воли охотника, а от топографических особенностей местности, поведения зайца и т.д. Нелишне помнить, что зайцы, в особенности русаки, в ветер преимущественно держатся в подветренной стороне леса, более защищенной от его порывов.

Гололедица, т.е. довольно сильный мороз после обильных дождей или мокрого снегопада еще по черной тропе, покрывающий ледяной коркой и землю и лужи, - самая неблагоприятная погода для охоты с гончими: собаки очень скоро режут себе ноги да и сбиваются со следа постоянно. Неблагоприятствует охоте с гончими и глубокий снег, по которому собакам приходится скорее плыть, чем идти. Заяц в таких случаях как более легкий по весу и как более приспособленный для передвижения по рыхлой снежной массе обычно далеко уходит от собак, а последние быстро выбиваются из сил. Сплошь и рядом убьешь в такую погоду зайца и долго думаешь: шумовой ли это заяц или тот самый, по которому гонят собаки?.. И разрешишь этот вопрос только тогда, когда спустя долгое время после выстрела по заячьему малику не выйдут, а именно «выплывут» измученные и мокрые собаки... В глубокий снег, покрывшийся после оттепели довольно твердой коркой - настом, пускать гончих в работу не следует. Заяц в большинстве случаев идет по такому насту не проваливаясь, а гончие, далеко отстав от него и пробивая лапами наст, режут их, словно стеклом, на каждом шагу и вскоре совсем (и часто далеко не на один день!) выбывают из строя.

Не следует также забывать и про ту опасность, которой подвергаются гончие, работающие по зайцу (по черной или белой тропе - безразлично) в ту пору, когда мороз покрывает тонким слоем льда реки и озера. Далеко не такой глупый, как принято думать, заяц очень любит перебежать по выдерживающему его тяжесть тонкому льду реки или озера, тем самым заставляя и гончих вываливаться на этот коварный и ненадежный мост. За особое счастье в этом случае надо считать, если собаки отделаются только холодной ванной... Поэтому, чтобы предохранить гончих от подобной опасности, лучше всего в эту пору вовсе избегать на охоте таких мест, где реки и озера попадают довольно часто.

В мороз свыше 9-10° охотиться с гончими вовсе не следует, так как в холод, как выражаются некоторые охотники, «стынет след» и собаки постоянно будут скалываться и вообще работать плохо и с частыми переборами.

Нелишне также предостеречь охотников от охоты с гончими зимой близ деревень таких районов, где сильно развит лов зайца капканами и проволочными петлями. Следует помнить, что эти ловушки (и притом настоженные не только на одних зайцев, но и на лисиц) ставятся, главным образом, на заячьих тропах. В силу этого всегда есть риск, что в один из этих самоловов, вместо зайца или лисицы, может попасть гончая и либо сломает