

Виктория Зонова

Цветы. Полное руководство по выращиванию и размножению



ЛитРес: Самиздат
Москва

УДК 030
ББК 92
384

Зонова В.

Цветы. Полное руководство по выращиванию и размножению /
Зонова В. — Москва: ЛитРес: Самиздат, 2021. — 142 с.

ISBN 978-5-532-98124-9

В книге самая суть по уходу, размножению цветов, устранению ошибок при выращивании. Прочитав книгу, вы научитесь выращивать и правильно ухаживать за астрами, амариллисами, виолами, георгинами, гиацинтами, гладиолусами, гортензиями, ирисами, каллами, клематисами, лилиями, лилейниками, нарциссами, петуниями, пионами, розами и тюльпанами. Это отдельная практическая книга, включенная в серию "Цветы. Лучшие сорта"

ISBN 978-5-532-98124-9

© Зонова В., текст, 2021
© Omiko Trading LTD., оформление, 2021

Содержание

Как вырастить цветы потрясающей красоты	4
1. Астра	5
2. Амариллис	7
3. Виола Виттрока	17
4. Георгина	20
5. Гиацинт	27
6. Гладиолус	32
7. Гортензия	39
8. Ирис	49
9. Калла	54
10. Клематис	64
11. Лилия	75
12. Лилейник	83
13. Нарцисс	92
14. Петуния	97
15. Пион	99
16. Роза	118
17. Тюльпан	130
Благодарю!	140

Как вырастить цветы потрясающей красоты

Хочу поделиться с вами на страницах этой книги своими знаниями и наработками по уходу за астрами, амариллисами, виолами, георгинами, гиацинтами, гладиолусами, гортензиями, ирисами, каллами, клематисами, лилиями, лилейниками, нарциссами, петуниями, пионами, розами и тюльпанами.

Прочитав книгу, вы научитесь выращивать эти прекрасные цветы, правильно ухаживать за ними. Сможете определиться и выбрать из этих сортов те, что посадите в своем саду. Они все великолепны!

Уверена, посаженные вами цветы станут украшением сада и долго-долго будут радовать вас красотой пышного цветения, ароматом и вдохновением!

Здесь, в этой книге, самая суть по уходу, размножению цветов, устранению ошибок при выращивании. Фото из моего сада. А больше информации по лучшим сортам, видам и легендам о цветах читайте в моей заключительной книге серии **«Цветы. Лучшие сорта»**: <https://www.litres.ru/viktoriya-zonova/cvety-luchshie-sorta-posadka-uhod-foto/>

1. Астра



Корневая система имеет мочковатую структуру, широко расходуется по сторонам, достигая глубины 15 – 25 см. Стебли астр кустистые, зеленого оттенка, иногда имеют красноватый тон. По высоте могут варьироваться от 20 см до метра. На стебле имеются небольшие волоски и продольные бороздки.

Листья астр темно-зеленая, может быть, как гладкой, так и опушенной. Листья, по форме напоминающие овально-ромбическую фигуру с заострениями, расположены, в основном, внизу стебля, где они достигают приличных размеров, в то время как верху они более мелкие, слегка продолговатые.

Астры есть как однолетние сорта, так и многолетние. Многолетние разновидности погибают каждые несколько лет. Когда замечаете обильное высыхание средней части скопления цветка, это признак того, что астра отходит. Поэтому важно не забывать об омо-

ложении кустов. Растение нужно выкопать, отделить молодые части и посадить в другом месте. Если цветы посажены на слабых почвах, омоложение нужно делать каждые 2-3 года.

Эти цветы размножаются делением куста в апреле-мае. Наиболее быстро разрастаются кустарниковые и новобельгийские сорта. Чтобы растения росли пышно и обильно, их нужно разделять каждые 2-3 года.

Высокие сорта требуют подвязки. Новобельгийские и кустарниковые астры восприимчивы к мучнистой росе. Чтобы снизить риск заражения, обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха между отдельными кустами, посадив растения на достаточно больших расстояниях. Слишком плотно растущим растениям нужно обеспечить доступ солнца, удаляя некоторые побеги.

Все виды астр требуют солнечных и проветриваемых позиций.

Пышно растущие новоанглийские, новобельгийские и кустовые виды требуют проницаемые, плодородные, влажные почвы. Чтобы выглядели здоровыми и цвели обильно, их следует удобрять и поливать в течение сезона. На сухом и плохом грунте нижние листья быстро теряются. Другие виды можно посадить на более слабые почвы. Это особенно характерно для видов с более узкими листьями, таких как узколистная астра. Они предпочитают проницаемый, более сухой субстрат.

Все виды, полностью устойчивы к морозу. Альпийские астры, растущие в скальном саду, должны быть покрыты хвойными ветвями на зиму.

2. Амариллис



Как отличить амариллис от гиппеаструма?

Внешне амариллис выглядит почти как гиппеаструм. Нередко даже цветоводы-любители их путают, да и в магазинах второе растение зачастую выдают за первое, так как оно более распространенное. Однако сходство двух цветов вполне объяснимо, ведь они ближайшие родственники: относятся к одному роду Амариллисовых.

Отличия.

1. Родина амариллиса – это Южная Африка, в то время как гиппеаструм – выходец из Южной Америки. Поэтому второй цветок быстрее привыкает к российскому климату в отличие от первого, которому его происхождение в стране вечного лета затрудняет адаптацию к более суровым условиям. Из-за этого амариллис несколько привередливее к уходу и условиям выращивания, чем его сородич.

2. У них разные форма и размер луковицы: у гиппеаструма она круглая, похожая на обычный репчатый лук, 7–9 см в длину, а ама-

риллис имеет вытянутую и удлиненную, грушевидную луковицу, достигающую в диаметре до 12 см и даже больше.

3. Цветонос у гиппеаструма пустой внутри, поэтому при легком сжатии края стержня соприкасаются. Его длина составляет около 60–70 см, он имеет красно-коричневый оттенок. У амариллиса стебель зеленовато-бурого цвета и короче – вырастает всего до 60 см, но он значительно плотнее, потому что пустого пространства внутри у него нет.

4. Амариллис цветет лишь один раз в год – это происходит в конце лета или начале осени. Гиппеаструм же радуется своими цветками в конце зимы или начале весны, а повторное цветение может произойти и в конце лета – это зависит от условий ухода и сорта растения.

5. Цветы у амариллиса бывают только розовой гаммы: от бледно-розового и даже белого до ярко-красного. У его сородича более богатая и разнообразная цветовая палитра: все оттенки красного, включая бардовый, кроме того, желтый, зеленый, оранжевый, пурпурный, встречаются даже двухцветные и пятнистые варианты.

6. Цветы у амариллиса воронковидные, а у гиппеаструма – похожи на орхидею и, как правило, более крупные – у некоторых сортов могут превышать в диаметре 20 см. Количество лепестков в цветке одинаковое – 6, а вот самих бутонов больше у амариллиса – их число иногда доходит до 12 штук, хотя обычно бывает 5–7. У гиппеаструма в соцветии обычно 2–4 цветка.

7. Амариллис во время цветения источает сильный и приятный аромат, а вот его сородич здесь проигрывает – запаха у гиппеаструма практически нет или он очень слабый, еле ощутимый.

8. У амариллиса выделяют всего 2 основных вида, остальные многочисленные разновидности – результат селекции. А у гиппеаструма только в природе насчитывается около 80–90 сортов, плюс еще искусственно выведено больше 2000.

Обеспечить амариллису подходящие условия содержания не так сложно. Однако следует помнить, что у него есть фаза вегетации и фаза покоя. И в эти периоды требования к месту размещения, освеще-

щению и температуре, а также поливам и подкормке будут существенно отличаться.

1. Свет и температура.

Растению, появившемуся на свет в жарком африканском климате, жизненно необходимо яркое солнце, поэтому горшочек с амариллисом нужно поставить в южную зону дома. Лучше, чтобы это был юго-запад или юго-восток, поскольку прямые солнечные лучи могут сжечь листья, так что освещение старайтесь делать рассеянным.

Световой день должен длиться не меньше 14 часов, при этом дневная температура должна быть от +20 до +25 градусов, а ночная – ниже ее примерно на 5 градусов.

Необходимо обеспечить одинаковую порцию солнечных лучей всем частям растения. Для этого в течение дня горшок нужно поворачивать, чтобы цветок со всех сторон получил равномерный свет, а стебель не искривился.

2. Влажность.

Влажность должна быть пропорциональна температуре – чем выше столбик термометра, тем больше влаги должен получать цветок.

Поэтому в самые жаркие периоды амариллис нужно не только поливать, но и опрыскивать. Сквозняки цветок не любит, но нуждается в периодическом проветривании.

3. Период покоя.

Когда растение отцвело, а его внешняя часть отмерла, луковицу нужно переместить в теневую прохладную зону с температурой +10–+13 градусов. В таких условиях амариллис «отдохнет» и наберется сил для новой активной фазы.

Прекрасным местом обитания для растения на период «спячки» станет, например, погреб или подвал.

4. Посадка и пересадка.

1. Очень важно подобрать правильный горшок для посадки. Лучше отдавать предпочтение тяжелым вариантам, сделанным из керамики или глины – они устойчивее, поэтому больше подходят для высокого и толстого стебля амариллиса, снижая риск опрокидывания цветка вместе с емкостью.

К тому же корни растения, сидящего в доме из натуральных материалов, хорошо снабжаются кислородом и избавляются от излишков воды.

Горшок должен быть высоким и такой ширины, чтобы расстояние от его кромки до луковицы было 2–3 см.

В более объемном вазоне может начаться обильное деткообразование. Поэтому лучше посадить несколько луковиц в одну емкость на расстоянии 3 см друг от друга.

2. Почву для посадки амариллиса проще всего приобрести в цветочном магазине – в качестве такой подойдет субстрат для луковичных растений. Однако можно приготовить грунт и самому, придерживаясь следующих рецептов:

дерновая земля (2 ч.) + листовая земля (2 ч.) + песок (1 ч.) + перегной (1 ч.);

дерновая земля (1 ч.) + садовая земля (1 ч.) + речной песок (1 ч.) + перегной (1 ч.) + торф (1 ч.).

Важно! Какой бы вариант грунта вы ни выбрали, не забудьте простерилизовать его перед посадкой, обдав кипятком – это необходимо для уничтожения вредных микроорганизмов.

3. Выбор луковицы. Материал для посадки нужно тщательно отбирать. Луковица должна быть здоровая на вид, гладкая и ровная: без пятен, плесени, мягких вмятин, гнили и других повреждений.

Неприятного запаха от нее также исходить не должно. Оптимальный размер посадочной луковицы – 7 см в диаметре.

4. Алгоритм посадки.

Процесс посадки включает следующие шаги:

перед посадкой с луковицы снимают темные чешуйки, пока она вся не станет равномерного светло-зеленого цвета; затем ее замачивают на 30 минут в марганцовке или любом другом фунгициде, после чего отправляют на сутки сушиться;