

Кулешов Павел Николаевич

**Настоящее положение нашего
тонкорунного овцеводства и меры
к его улучшению**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
П12

П12 **Павел Николаевич К.**
Настоящее положение нашего тонкорунного овцеводства и меры к его улучшению / Кулешов Павел Николаевич – М.: Книга по Требованию, 2025. – 44 с.

ISBN 978-5-519-91706-3

ISBN 978-5-519-91706-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

совых овецъ въ Южной Америкѣ и въ Соед. Штатахъ быть можетъ на 30⁰/₀ или даже на 40⁰/₀ больше того, чѣмъ указано выше ¹⁾.

Не меньшія затрудненія представляетъ вопросъ объ опредѣленіи количества шерсти, получаемой какъ съ простыхъ, такъ и съ мериносовыхъ овецъ. По свѣдѣніямъ французскаго военнаго министра, шерсти во всемъ свѣтѣ производится 2152 милл. фунтовъ или около 54 милл. пудовъ ²⁾. По Зеттегасту, количество шерсти должно быть еще болѣе, а именно около 2400 милл. фунт. ³⁾; а по даннымъ американскихъ статистиковъ количество шерсти, продаваемой на европейскомъ и американскомъ рынкахъ, не болѣе 2000 милл. фунтовъ ⁴⁾.

Нужно замѣтить, что во всѣхъ этихъ данныхъ имѣется въ виду *шерсть перегонная*, т. е. мытая на овцахъ, хотя въ дѣйствительности шерстяные рынки получаютъ шерсть въ самомъ различномъ видѣ. Капская земля и Ю. Америка доставляютъ шерсть по преимуществу фабрично мытую; Австралія, особенно въ последнее время, доставляетъ шерсть почти исключительно грязную; въ Россіи и Франціи шерсти поступаютъ на рынокъ также въ грязномъ видѣ въ огромномъ большинствѣ случаевъ (до 80⁰/₀), и только въ Англіи и Германіи овцеводы продаютъ свою шерсть главнымъ образомъ въ видѣ перегона.

Какъ видно изъ вышеприведенныхъ цифръ, въ среднемъ вѣсѣ перегоннаго руна для овецъ всѣхъ породъ нужно принять въ 3 фунт. и никакъ не болѣе 3¹/₂ фунт.; составители извѣстныхъ лондонскихъ циркуляровъ о торговлѣ шерстью, Гельмусъ и Шварцъ, дѣйствительно и принимаютъ средній вѣсъ руна всѣхъ овецъ въ 3 фунт. перегона и въ 2 фунт. чистой шерсти, а для мериносовыхъ — въ 4 фунт. перегона ⁵⁾. Если принять количество мериносовъ въ 150 милл. головъ, а наименьшій вѣсъ руна въ 4 фунт. перегона на овцу, то количество шерсти, доставляемой тонкорунными стадами всего свѣта, будетъ не менѣе 600 милл. фунтовъ, т. е. около ¹/₃ всего количества шерсти, продаваемой на рынкахъ Европы и Соед. Шт. Сѣв. Америки. Если принять, далѣе,

¹⁾ Ibid. Настоящее количество овецъ равняется 36 милл. Овцы эти представляютъ примѣръ быстрого усовершенствованія въ отношеніи количества и качества шерсти путемъ значительнаго прилитія крови мериносовъ.

²⁾ «Live Stock-Journal». 1888. April. p. 320,

³⁾ Settegast, «Die deutsche Viehzucht». 1890. p. 111.

⁴⁾ «Bulletin of Wool Manufacturers». 1888. p. 198.

⁵⁾ «Bulletin of Wool Manufacturers». 1887. p. 201.

во вниманіе, что цѣна мериносовой шерсти обыкновенно на 20% и даже на 30% выше цѣны шерсти простыхъ овецъ, то нужно вполне согласиться съ тѣмъ, что, *какъ шерстопроизводительница тонкорунная овца занимаетъ до сихъ поръ первенствующее значеніе въ овцеводствѣ всего свѣта.*

Статистика овцеводства въ Россіи, не смотря на многія изслѣдованія, произведенныя въ послѣднее время, даетъ такія указанія, въ особенности относительно мериносоваго овцеводства, въ точности, которыхъ есть основаніе сомнѣваться. По даннымъ «Сборника свѣдѣній по Россіи за 1890 годъ», у насъ насчитывается до 48 милліоновъ всѣхъ овецъ. По свѣдѣніямъ же, собраннымъ департаментомъ земледѣлія и сельской промышленности за 1886 годъ, въ Европейской Россіи вмѣстѣ съ Царствомъ Польскимъ и донскою областю насчитывалось овецъ всѣхъ породъ 50.161,911 головъ, причемъ 10.658,600 головъ относилось на долю овецъ тонкорунныхъ. Мы не имѣемъ никакихъ основаній оспаривать данныя о числѣ овецъ грубошерстныхъ, но имѣемъ полное право думать, что свѣдѣнія о числѣ овецъ тонкорунныхъ далеко не отвѣчаютъ дѣйствительному ихъ количеству. Исходя уже изъ того соображенія, что въ указанныя статистическія свѣдѣнія не вошли мериносы кубанской, терской и черноморской областей, можно предполагать, что количество мериносовыхъ овецъ значительно больше приведенной цифры, такъ какъ, по точнымъ свѣдѣніямъ торговцевъ изъ означенныхъ мѣстностей, въ послѣдніе годы доставляется въ Ростовъ и Одессу не менѣе 1 милл. пудовъ грязной шерсти. Принимая, что въ среднемъ овцы этихъ областей даютъ не болѣе 8 фунт. съ головы, нужно считать, что въ терской, кубанской и черноморской областяхъ содержится до 5 милл. мериносовыхъ овецъ.

По словамъ Зеттегаста въ Россіи настригается ежегодно, будто бы, не болѣе 427 тыс. пуд. мериносовой шерсти ¹⁾).

Едва ли даже нужно опровергать неточность этихъ свѣдѣній, такъ какъ достовѣрно извѣстно, что только на одной харьковской (Троицкой) ярмаркѣ продается ежегодно до 500 тыс. пуд. шерсти. По даннымъ профессоровъ Ильина и Лангова, количество мериносовой шерсти въ Россіи опредѣляется въ 1.600,000 пуд. ²⁾).

¹⁾ Settegast. «Die deutsche Viehzucht». 1890. p. 111.

²⁾ Матеріалы къ пересмотру тарифа, p. 11. Предположеніе, что въ Россіи производится только 1,600,000 пуд. грязной мериносовой шерсти уже потому невѣроятно, что въ періодъ отъ 1879—1883 гг. вывозилось изъ Россіи за границу до 1.200,000 пуд. грязной шерсти (Ibid. p. 9). Думать, что въ это

Болѣ близкой къ дѣйствительности будетъ цифра, которую даетъ отчетъ по ислѣдованію овцеводства въ Россіи; по даннымъ этого источника, со всѣхъ тонкорунныхъ овецъ, включая донскую область и сѣверный Кавказъ, получается 2 милл. пудовъ грязной шерсти ¹⁾).

Свѣдѣнія о количествѣ шерсти, собранныя нами отъ шерсто-торговцевъ, наиболѣе знакомыхъ съ главнѣйшими шерстяными рынками Россіи, вполне подтверждаютъ то предположеніе, что количество мериносовыхъ овецъ въ Россіи должно быть не менѣе 16 милл. головъ. По мнѣнію извѣстнаго комисіонера по шерстяной торговлѣ г. Кречетова, количество всей шерсти, добываемой въ Россіи, въ зависимости отъ урожая травъ, зимняго кормленія, пыльности пастбищъ и общаго числа овецъ, поступающихъ въ стрижку, колеблется въ предѣлахъ отъ 3¹/₂ до 4 милл. пудовъ грязной шерсти.

Само собою понятно, что при хорошемъ лѣтнемъ и зимнемъ кормленіи, количество шерсти увеличивается иногда отъ 1 до 2 фунт. на голову. Точно также при пыльныхъ пастбищахъ вѣсь руна увеличивается. Наконецъ, что касается количества овецъ, поступающихъ въ стрижку, то оно обуславливается — различіемъ въ количествѣ валуховъ: при низкихъ цѣнахъ на сало или при плохомъ урожаѣ травъ, валухи остаются въ хозяйствѣ, что увеличиваетъ количество получаемой шерсти въ ближайшую стрижку иногда на 20%.

По свѣдѣніямъ, любезно сообщеннымъ намъ представителемъ торговаго дома К. Стукенъ и московскимъ шерстопромышленникомъ г. Соловьевымъ, количество мериносовой шерсти, добываемой въ Россіи, не многимъ превосходитъ 3 милл. пудовъ въ годъ. Это количество шерсти распределяется по районамъ такимъ образомъ:

въ ростовскомъ районѣ	1.200,000 пуд.
харьковскомъ	800,000 »
» херсонскомъ и одесскомъ районахъ.	600,000
западномъ краѣ.	150,000
тамбовскомъ и саратовскомъ районахъ.	300,000
	3.050,000 пуд.

время всѣ русскія фабрики довольствовались 400,000 пуд. грязной шерсти, понятно нельзя, такъ какъ у насъ имѣлась напр. въ Петербургѣ фабрика Торнтона, потребляющая одна до 300,000 пуд. мериносовой шерсти.

¹⁾ «Ислѣдованіе соврем. состав. овцев. въ Россіи». В. VII, р. 125.

Въ виду того, что въ другихъ районахъ мериносы не отличаются такой многошерстностью, какъ овцы сѣверной части Кавказа, средній вѣсъ руна для мериносовъ всей Россіи не можетъ быть принятъ болѣе $7\frac{1}{2}$ ф. на голову ¹⁾. Сопоставляя общее количество шерсти со среднимъ вѣсомъ руна, мы найдемъ, что *общее количество мериносовыхъ овецъ въ Россіи должно быть нѣсколько болѣе 16 милл.*

Имѣя намѣреніе сравнить количество шерсти, получаемой со всѣхъ мериносовъ въ Россіи, съ общимъ количествомъ шерсти и количествомъ шерсти, доставляемой овцами простыми, мы должны замѣтить, что основанія для вычисленія шерсти послѣдняго сорта кажутся намъ совершенно неправильными. Въ дѣйствительности не существуетъ ни одной породы простыхъ овецъ, которая бы по своей шерстопроизводительности превосходила овецъ мериносовыхъ, и большинство овцеводовъ и статистиковъ, какъ въ Европѣ, такъ и въ Соед. Шт. С. Америки, считаютъ, что мериносы даютъ шерсти въ среднемъ на $20\frac{0}{10}$ — $30\frac{0}{10}$ болѣе, чѣмъ овцы простыхъ породъ. Между тѣмъ въ нашихъ статистическихъ данныхъ средній вѣсъ руна простыхъ овецъ принимается не менѣе 4 ф. на голову, а для овецъ волошскихъ и цигайскихъ даже въ 8 ф. на голову, т. е. на 1 или 2 ф. болѣе, нежели вѣсъ руна мериносовъ кавказскаго — мазаевскаго типа. Профессора Ильинъ и Ланговъ считаютъ даже, что сборъ грязной шерсти съ простыхъ овецъ можно принять въ 7 ф., а съ мериносовыхъ всего въ 6 ф. Соображаясь со всѣмъ, что намъ извѣстно о производительности различныхъ породъ овецъ грубошерстныхъ, мы думаемъ, напротивъ, что максимальный вѣсъ руна простой овцы не превосходитъ 5 ф. на голову, такъ что со-всѣхъ 40 милл. (приблизительное количество) этихъ овецъ получается 5 милл. пуд. простой шерсти, а не $6\frac{1}{2}$ милл. пуд. какъ это обыкновенно предполагается ²⁾.

¹⁾ По «Исслѣдованію соврем. сост. овц. въ Россіи», Т. 7, стр. 125, въ южно-русскомъ районѣ средній вѣсъ руна опредѣляется въ 8 ф.; для юго-восточнаго района и Кавказа въ 7 ф.; для Царства Польскаго, сѣверо-западнаго и юго-западнаго районовъ — въ $2\frac{1}{2}$ —3 ф. перегона, т. е. слѣдовательно, въ 5—6 ф. грязной шерсти. Точно также нашъ извѣстный знатокъ овцеводства и предсѣдатель комиссіи А. Л. Филиберъ опредѣляетъ средній вѣсъ руна для русской тонкорунной овцы въ 6—7 ф. (тамъ-же, Т. 3, стр. 1). Руководясь этими данными и на основаніи личнаго знакомства съ мериносовымъ овцеводствомъ, мы и считаемъ вѣсъ руна въ $7\frac{1}{2}$ ф. наиболѣе отвѣчающимъ дѣйствительности.

²⁾ «Исслѣд. совр. сост. овцев. въ Россіи», Т. 7, стр. 127. По этимъ даннымъ общее количество шерсти равняется 6.344,000 пуд., а по Ильину и Лангову

Такимъ образомъ, мы видимъ, что и въ Россіи количество шерсти мериносовой (3 милл. пуд.) отъ общаго количества получаемой въ Россіи шерсти (8 милл. пуд.) составляетъ болѣе $\frac{1}{3}$ или точнѣе 37,5%.

Мы потому такъ подробно остановились на разсмотрѣніи статистики овцеводства, что считаемъ этотъ вопросъ заслуживающимъ вообще вниманія; далѣе, потому, что опредѣленные нами цифры будутъ необходимы для многихъ другихъ выводовъ и, наконецъ, для того, чтобы указать на удивительное преобладаніе мериносовой породы надъ породами грубошерстными, которыхъ въ различныхъ странахъ свѣта насчитывается нѣсколько десятковъ породъ.

Наука шерстовѣдѣнія, изучая мериносовую шерсть во всѣхъ ея свойствахъ и особенностяхъ, уже давно дала объясненіе этому преобладанію мериносовой овцы. Она показала, что шерсть мериносовой овцы, по своему строенію, упругости, тягучести, валкости, представляетъ такой матеріалъ, который можетъ удовлетворять самымъ разнообразнымъ цѣлямъ фабрикаціи, а во многихъ случаяхъ является вовсе незамѣнимымъ матеріаломъ. Если шерсть вообще даетъ самую легкую и теплую одежду для человѣка, принимаетъ при крашеніи безконечное число оттѣнковъ (2500), имѣетъ благородный блескъ и пріятна на-ощупь, то всѣми этими качествами въ наивысшей степени обладаетъ шерсть мериносовая ¹⁾. Въ рунѣ всѣхъ овецъ въ чрезвычайно различныхъ соотношеніяхъ перемѣшаны два сорта волосъ: волосъ грубый, наименѣе пригодный для фабрикаціи, такъ называемая ость, и волосъ болѣе нѣжный и цѣнный — пухъ или подшерстокъ. Несомнѣнно, что на увеличеніе въ рунѣ количества пуха вліяетъ до извѣстной степени климатъ; но есть основанія думать, что у мериносовой овцы преобладаніе пуха надъ остью, которая почти отсутствуетъ, явилось какъ результатъ сознательнаго заводскаго подбора въ теченіи, быть можетъ, многихъ вѣковъ. Очень недавно одинъ изъ довольно извѣстныхъ нѣмецкихъ писателей по овцеводству высказалъ взглядъ, что особенности шерсти мериносовой овцы выработались подъ вліяніемъ теплаго и бездожнаго климата Испаніи ²⁾.

около 6½ милл. пуд. («Матеріалы къ пересмотру общаго таможеннаго тарифа» 1889, с. 11).

¹⁾ Уд. вѣсъ шерсти 1,26—1,34, между тѣмъ какъ уд. вѣсъ хлопчатой бумаги 1,47 и льна 1,60. «Bulletin of Wool Manufacturers». 1877, p. 204, и Bohm. «Schafzucht», 1873, p. 243.

²⁾ «Landwirthschaftliche Thierzucht», 1890, p. 246. «Briefe über Wolle». A Körte.

Это воззрѣніе не соотвѣтствуетъ явленіямъ, наблюдаемымъ въ дѣйствительности, такъ какъ хорошо извѣстно, что развитіе пуха насчетъ ости гораздо чаще замѣчается у овецъ, живущихъ въ сѣверныхъ странахъ. Гораздо большаго вниманія заслуживаетъ наблюденіе американца Бонда, которое бросаетъ свѣтъ на происхожденіе мериносовъ и подтверждаетъ, съ другой стороны, давно высказанное предположеніе о перенесеніи этой овцы изъ Африки въ Европу. Именно, Бонду посчастливилось найти въ Аравіи породу овецъ, пухъ которой удивительно напоминаетъ мериносовую шерсть; но ости эта порода овецъ имѣетъ болѣе, чѣмъ даже самые грубые современные мериносы. Если это изслѣдованіе подтвердится и сходствомъ другихъ зоологическихъ признаковъ, то вполне возможно будетъ допустить, что мериносы дѣйствительно происходятъ изъ Африки, гдѣ они культивировались маврами и вмѣстѣ съ ними перешли въ Испанію ¹⁾).

Высказанный нами взглядъ о сравнительныхъ достоинствахъ мериносовой овцы въ настоящее время раздѣляется далеко еще не всѣми. Защитники грубошерстного овцеводства не только забываютъ объ удивительной способности мериносовой овцы измѣняться подъ вліяніемъ искусственнаго подбора и условій содержанія, но даже нерѣдко приравниваютъ шерстопроизводительность и хозяйственную полезность мериносовъ къ тѣмъ же качествамъ овецъ простыхъ. По поводу послѣдняго, мы должны замѣтить, что этотъ расчетъ оправдывается только для плохихъ, малошерстныхъ мериносовыхъ овчаренъ, гдѣ въ теченіи многихъ лѣтъ нисколько не заботились ни о подборѣ овецъ, ни о соотвѣтствующемъ ихъ содержаніи. Вообще же нужно признать за правило, что *во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда производство шерсти составляетъ главный доходъ хозяйства, мериносовой овецъ должно быть отдано рѣшительное предпочтеніе*. Съ другой стороны необходимо отмѣтить еще тотъ фактъ, что при извѣстномъ направленіи мериносовая овца можетъ обладать мясными качествами въ такой степени, что дѣлается способной удовлетворять условіямъ очень интенсивныхъ хозяйствъ и вкусамъ разборчивыхъ потребителей.

Нерѣдко выставлялось также на видъ, что развитіе хлопчатобумажнаго производства отодвигаетъ на второй планъ потребность въ специально-шерстяной овецъ, такъ какъ количество потребляемой во всемъ свѣтѣ шерсти будто бы постоянно уменьшается. Этотъ

¹⁾ «Bulletin of Wool Manufacturers», 1887, p. 222. Статья John L. Hayes.

пессимистическій взглядъ на будущность тонкоруннаго овцеводства рѣшительно опровергается болѣе точными свѣдѣніями.

«Потребность въ шерстяныхъ тканяхъ, говоритъ одинъ извѣстный писатель по овцеводству, постоянно увеличивается не только потому, что возрастаетъ народонаселеніе, но также и вслѣдствіе возрастанія культуры и большаго накопленія богатствъ; вотъ почему во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ шерстяная мануфактура все болѣе развивается и потребление шерсти все болѣе усиливается» ¹⁾).

Фактическое подтвержденіе этому взгляду мы находимъ въ слѣдующихъ цифровыхъ данныхъ, представленныхъ Гельмусомъ и Шварцемъ, которыя по словамъ Бонда заслуживаютъ полнѣйшаго довѣрія.

Годъ.	Абсолютное колич. шерсти чистой, потреблен. насел. Европы и Сѣв. Америки. Въ миллион. англ. фунт.	Количест. чистой шерсти на чело- вѣка въ англій- скихъ фунтахъ.
1850	514	1,93
1860	610	2,03
Среднее за 1861 — 65	654	2,13
1866 — 70	766	2,38
1871 — 75	822	2,44
1876 — 80	865	2,42
1881 — 85	952	2,52
1886	1041	2,66 ²⁾).

Приведенныя цифры, какъ мы видимъ, показываютъ, что потребление шерсти постоянно и чрезвычайно равномерно возрастаетъ, причемъ есть полное основаніе думать, что, чѣмъ богаче страна, тѣмъ рѣзче выражается прогрессъ потребления. Такъ, напр. въ Соед. Штатахъ Сѣв. Америки въ 1850 г. потребление шерсти было 2,7 ф. на человѣка; въ 1870 г. оно уже равняется 4,2 ф.; въ 1880 г. — 4,8 ф., а въ 1885 г. достигаетъ почти 6 ф. ³⁾).

Всѣ эти соображенія и цифры даютъ полное основаніе предполагать, что *мериносовому овцеводству предстоитъ еще широкая будущность*, и что оно еще долго и, даже можетъ быть въ еще большей степени, нежели въ настоящее время, будетъ служить для удовлетворенія потребности человѣка, какъ въ одеждѣ, такъ и въ пищѣ.

¹⁾ «Landwirthschaftliche Thierzucht», 1886, p. 381. Статья Körte.

²⁾ «Bulletin of Wool Manufacturers», 1887, p. 176.

³⁾ Ibid. p. 64.

Но если признать этот выводъ справедливымъ, то спрашивается—чему же нужно приписать причину постоянныхъ жалобъ на бездоходность этой отрасли скотоводства и значительное уменьшеніе числа мериносовыхъ овецъ въ Европѣ и у насъ?

«Общее количество мериносовыхъ овецъ за послѣднее десятилѣтіе подверглось значительнымъ сокращеніямъ въ силу различныхъ причинъ. Такъ, по даннымъ за 1870 г., въ Россіи числилось 12.579,500 головъ, а въ 1879—82 гг. число овецъ сократилось до 10.658,600, т. е. болѣе, чѣмъ на 15⁰/₀» ¹⁾).

У насъ это уменьшеніе овцеводства объясняютъ паденіемъ цѣнъ на шерсть въ 70-хъ годахъ вмѣстѣ съ возвышеніемъ цѣнъ на зерновые хлѣба, а также усиленнымъ требованіемъ на камвольную шерсть, которой лѣтъ 20 тому назадъ было дѣйствительно немного.

Въ Германіи овцеводство съ 1863 по 1883 гг. уменьшалось въ общемъ на 33⁰/₀, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр. въ Силезіи, на 57⁰/₀. Общее сокращеніе овцеводства за этотъ періодъ достигаетъ 10 мил. головъ ²⁾),

Во Франціи въ періодъ съ 1832 по 1882 г. овцеводство уменьшилось съ 29 мил. на 21¹/₂ мил. ³⁾).

Въ Соед. Шт. Сѣв. Америки овцеводство съ 51 милл. въ 1884 г. сократилось до 42¹/₂ мил. въ 1889 г. ⁴⁾).

Только овцеводство Англіи избѣжало общей участи и въ этой странѣ мы, напротивъ, замѣчаемъ увеличеніе овцеводства въ теченіи послѣднихъ 8 лѣтъ. Съ 1881 г. по 1888 г. овцеводство въ Англіи увеличилось на 2 милл. головъ. Но если взять англійское овцеводство за періодъ времени съ 1878 г. по 1888 г., то окажется, что и оно также уменьшилось на 2 милл. головъ ⁵⁾).

Причины этого общаго сокращенія европейскаго овцеводства обусловливаются, дѣйствительно, паденіемъ цѣнъ на шерсть, вызваннымъ конкуренціей со стороны Австраліи, Ю. Америки и Капской земли, гдѣ овцеводство уже достигло колоссальныхъ размѣровъ и имѣетъ постоянную тенденцію увеличиваться съ удивительною быстротой. Размѣры овцеводства въ Австраліи, африканскихъ колоніяхъ и Ю. Америкѣ нужно принять теперь въ 200 милл. головъ т. е. неменѣе ¹/₃ овцеводства всего свѣта. Быстрота роста овцеводства

¹⁾ «Исслѣд. соврем. сост. овцев. въ Россіи». Т. 7. с. 100.

²⁾ «Landwirthschaftliche Thierzucht», 1886, p. 381.

³⁾ Neumann Spallart, ibid. p. 196.

⁴⁾ «Mark-Lane Express». 1889, p. 886.

⁵⁾ «Landwirthschaftliche Thiorzucht», 1886, p. 225.

въ указанныхъ мѣстахъ между прочимъ видна изъ слѣдующихъ цифръ: въ Новой-Зеландіи овцеводство съ 14 мил. въ 1885 г. увеличилось на 15 милл. въ 1887 г.; въ Австраліи овцеводство за послѣдніе 3 года увеличилось на 20⁰/₀, а количество шерсти на 32¹/₂⁰/₀ ¹⁾).

Незначительные размѣры площади земли, занятой въ настоящее время подъ скотоводствомъ и земледѣліемъ въ Австраліи и Южной Америкѣ, даютъ полное основаніе предполагать, что конкуренція европейскому овцеводству не только не прекратится, но приметъ еще болѣе острый характеръ, такъ что овцеводство въ европейскихъ государствахъ, особенно же мериносовое, которому заокеанская конкуренція болѣе опасна, уничтожится почти совсѣмъ если европейскія государства не примутъ надлежащихъ мѣръ къ его огражденію. По Нейману Спалларту паша Ю. Америки могутъ дать помѣщеніе скотоводству въ 7 разъ большему, противъ настоящихъ его размѣровъ. Точно такое же, если не лучшее будущее, представляетъ для развитія овцеводства и Австралія съ ея роскошною растительностью, влажнымъ и умѣреннымъ климатомъ, дающимъ возможность выращивать какъ хорошихъ мясныхъ овецъ, такъ и производить наилучшую по тонинѣ, блеску и прочности мериносовую шерсть.

Одинъ нѣмецкій овцеводъ по этому поводу пишетъ слѣдующее: При обсужденіи всего вопроса приходится принять во вниманіе, что страны, наводняющія теперь Европу своими шерстями, далеко не достигли кулиминаціоннаго пункта ихъ производительности и что эти страны могутъ вмѣстить втрое большее овцеводство. Если уже теперь ввозится изъ-за океана до 200 мил. центнеровъ шерсти, то черезъ 10 — 15 лѣтъ это количество можетъ удвоиться. Шерсть потеряетъ цѣну, такъ какъ мануфактуры не будутъ въ состояніи переработать всего этого количества. Время, когда наступитъ этотъ моментъ, вовсе не такъ далеко, какъ это думаютъ многіе, и естественное, неизбѣжное слѣдствіе этой дикой конкуренціи будетъ то, что овцеводство, а также и другія отрасли скотоводства погибнутъ, а вмѣстѣ съ ними и многіе милліоны національнаго богатства» ²⁾).

Если повторяющіеся время отъ времени падежи овецъ въ Ю. Америкѣ и оживляютъ надежды европейскихъ овцеводовъ, то это оживленіе временное, напоминающее собой улучшеніе здоровья больного передъ наступленіемъ предсмертной агоніи. Постоянное и быстрое улучшеніе овцеводства въ заокеанскихъ странахъ и та-

¹⁾ «Live Stock Journal», 1888; «Landw. Thierzucht». 1890, p. 339.

²⁾ «Landw. Thierzucht». 1888.

кое же быстрое уменьшение овцеводства въ Европѣ ясно говорятъ за то, что развитіе одного идетъ на счетъ другаго и что въ тѣхъ государствахъ, гдѣ потребленіе овечьяго мяса развито слабо, овцеводство въ очень недалекомъ будущемъ должно утратить настоящее его значеніе, сократившись до минимума. Россія, не смотря на обширность ея степныхъ пастбищъ, должна будетъ раздѣлить участь другихъ европейскихъ государствъ, такъ какъ наши хозяева по многимъ причинамъ не могутъ производить шерсть по такой низкой цѣнѣ, по какой ее производятъ овцеводы Австраліи и Ю. Америки. При настоящихъ цѣнахъ на шерсть овцеводство не окупается даже въ степяхъ донской и кубанской областей, а не только въ среднихъ черноземныхъ губерніяхъ, гдѣ пастбищный періодъ короче, земли дороже и менѣе производительны. Кромѣ уменьшенія овцеводства заокеанская конкуренція вызываетъ еще ухудшеніе овцеводства, выражающееся въ пониженіи качествъ шерсти и средняго руннаго вѣса. Этотъ регрессивный процессъ тѣмъ ощутительнѣе чѣмъ выше была культура овцеводства въ данной странѣ. «Мы прежде въ Германіи, пишетъ извѣстный знатокъ шерстяной промышленности Гроте, производили наилучшую въ мірѣ шерсть и имѣли цвѣтущее овцеводство. Покупатели изъ всѣхъ странъ привлекались на нашъ рынокъ тонкой шерсти; но послѣ того какъ иностранной конкуренціи былъ открытъ свободный доступъ, овцеводство въ Германіи уменьшилось количественно, и еще болѣе понизилось въ качествѣ» ¹⁾. Даже знаменитыя силезскія шерсти и тѣ потеряли свой характеръ, и не отличаются теперь не только характерностью по раіонамъ, но даже и однохарактерностью въ отдѣльныхъ стадахъ. Для такихъ шерстей въ Германіи существуетъ даже особый терминъ «*verzüchtete Wollen*», обозначающій шерсти, полученныя изъ овчаренъ, въ которыхъ не отдаютъ должнаго вниманія соотвѣтствующему подбору и уходу за овцами. Извѣстный нѣмецкій бонитеръ Рудольфъ Тило, говоря о современномъ состояніи нѣмецкаго овцеводства, указываетъ точно также, что подъ вліяніемъ заатлантической конкуренціи особенно потерпѣло суконное направленіе, распространенное въ сѣверной и южной Германіи, но даже и камвольное направленіе удерживается только съ трудомъ, а вмѣсто этихъ направленій разводятся метисы всевозможныхъ породъ и типовъ ²⁾.

¹⁾ «*Bulletin of Wool Manufacturers*», 1877 p. 166.

²⁾ Thilo. «*Woll-Convent*». 1881.