

Скобликов Евгений Иванович

**Об ущемленных паховых
грыжах и их лечении**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Е14

Е14 **Евгений Иванович С.**
Об ущемленных паховых грыжах и их лечении / Скобликов Евгений Иванович – М.: Книга по Требованию, 2022. – 140 с.

ISBN 978-5-519-73826-2

ISBN 978-5-519-73826-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА УЩЕМЛЕНИЙ ПАХОВЫХЪ ГРЫЖЪ.

Не многіе изъ отдѣловъ хирургіи обращали на себя такое вниманіе врачей всѣхъ временъ и народовъ, какъ герніологія; въ сочиненіяхъ, принадлежащихъ самой глубокой древности, мы встрѣчаемъ уже указанія на особенный видъ опухолей паховой складки, которыя, по намекамъ на ихъ происхожденіе, должны считать за паховыя грыжи; однакоже только въ 16 вѣкъ ученіе объ ущемленіи получило свое развитіе. До этого времени, хотя *Heraclides de Tarente*, *Coelius Aurelianus*, *Celsus* и многіе другіе изъ извѣстнѣйшихъ и гениальнѣйшихъ врачей своего времени списывали скопленіе фекальныхъ веществъ въ кишкахъ и зависящіе отъ того тяжкіе припадки и смертельныя исходы, а *Praxagoras*, *Leonidas*, *Archigenes*, *Paulus Aegineta* предлагали различныя средства для вправленія неподвижныхъ грыжъ; но вообще понятія о сущности ущемленія были сбивчивы и неясны. Въ 1550 году *Petrus Franco*, вмѣстѣ съ другимъ врачомъ *Rousset*, въ первый разъ при встрѣ-

тившемся ущемленіи паховой грыжи произвелъ операцію грыжесъченія и описалъ ее; потомъ *Rousset*, издавшій въ 1580 году свои сочиненія, представилъ болѣе точное описаніе операцій, названной имъ *kilotomia*. Съ этого времени многіе хирурги начали пробовать уничтожать ущемленіе, вскрывая грыжевую опухоль (что считалось до того какою-то химерою), собирать факты и дѣлать наблюденія надъ сущностью ущемленія. Въ 17 вѣкѣ были сдѣланы многія анатомическія открытія; изъ ученыхъ, особенно знаменитыхъ въ этомъ вѣкѣ, занимавшихся изученіемъ устройства паховаго канала, брюшныхъ колець и вообще ущемленій, можно назвать *Riolan'a* *Dionisius'a* *Saviard'a* и *Winslow'a*; кромѣ того было извѣстно уже много случаевъ ущемленія паховыхъ грыжъ, происшедшаго отъ накопленія въ кишкахъ газовъ и фекальныхъ веществъ, отъ воспаленія, сращенія кишекъ и проч., и хирурги перестали колебаться въ понятіяхъ о сущности ущемленія и отвергать пользу операцій. Въ 18 вѣкѣ были сдѣланы новыя открытія, и во всѣхъ сочиненіяхъ этого періода находимъ уже большую обработку и опредѣленность идей о ущемленіи и средствахъ, могущихъ помогать при леченіи оныхъ. Опредѣленное значеніе операціи *herniotomia* установилось тоже въ этомъ вѣкѣ, а до того времени подъ этимъ названіемъ разумѣлись многія операціи, какъ-то: *ligatura herniarum* (*Celsus*), *punctum aureum* (*Bernard de Metz*), *cauterisatio ferro candente* (*Paulus Aegineta*), *sutura regia* (*Fabricius ab Aquapendente*). Въ 18 вѣкѣ сдѣлались извѣстными: открытія *Arnaud* и *Ledran'a* о ущемленіи мошоночныхъ грыжъ въ шейкѣ грыжеваго

мышка, подтвержденныя наблюденіями *Petit* и *Pott'a*, изысканія *Richter'a*, который описалъ и доказалъ особенный родъ ущемленія, названный имъ судорожнымъ; изслѣдованія *Sharp'a* и *Hunter'a* о врожденныхъ паховыхъ грыжахъ, которыя до этого времени были смѣшиваемы съ приобретенными; еще кромѣ того другими хирургами были объяснены и упрочены въ наукѣ, какъ неопровержимые факты, многія предположенія и догадки прежнихъ врачей. Наконецъ, девятнадцатому столѣтію, богатому великими открытіями въ области наукъ и искусствъ принадлежитъ честь болѣе полной разработки ученія, какъ сущности и ближайшей причины ущемленій, такъ и искуснаго и безопаснаго производства операціи, съ болѣе или менѣе точнымъ опредѣленіемъ показаній къ оной. Почти всѣ знаменитые хирурги нашего вѣка занимались ущемленіемъ грыжъ и обогатили этотъ отдѣлъ хирургіи своими изысканіями и открытіями; изъ числа многихъ, особенно замѣчательны: *Scarpa*, *Hesselbach* и *Velpeau*, опредѣлившіе отличіе различныхъ видовъ паховыхъ грыжъ и отношеніе къ нимъ надбрюшной артеріи; *A. Cooper*, открывшій внутреннее паховое кольцо; *Boyer*, *Dupuytren*, *Sanson*, *Lawrence* и *Langenbeck*, представившіе множество наблюденій и опредѣлившіе различные виды ущемленій; *Malgaigne*, возбудившій своими сочиненіями жаркіе споры и принесшій даже этимъ огромную пользу герніологіи; *Diday*, положительно доказавшій возможность ущемленія въ паховыхъ кольцахъ; наконецъ въ послѣдніе годы *Roser*, показавшій ближайшую причину ущемленій, объяснивъ механизмъ ихъ

образованіемъ клапана на слизистой оболочкѣ кишокъ. Представивъ этотъ краткій историческій очеркъ, я указалъ только на главнѣйшіе періоды въ исторіи ущемленія; при дальнѣйшемъ же изложеніи этого разсужденія, постараюсь нѣсколько подробнѣе рассмотреть исторически послѣдовательность разработки идей, послужившихъ основой настоящему понятію о ущемленіи паховыхъ грыжъ и ихъ леченіи.

Литература избраннаго мною предмета такъ обширна, что только краткое перечисленіе оригинальныхъ сочиненій и различныхъ журнальныхъ статей, написанныхъ о ущемленіи грыжъ, могло бы составить довольно объемистый томъ. Вообще литература ущемленій, по направленію, которое она имѣла въ разные времена, можетъ быть раздѣлена на четыре періода: первый, начало котораго теряется въ глубокой древности, оканчивается выходомъ въ свѣтъ сочиненій *P. Franco* и *Rousset*, т. е. въ 1580 году; второй продолжается до открытій, сдѣланныхъ *Ledran*омъ и *Arnaud*, т. е. съ 1580 года и по 1731; третій, самый богатый и плодотворный, заключаетъ въ себѣ конецъ 18 вѣка и начало нашего столѣтія до того времени, когда споры, возбужденные *Malgaigne*емъ, пролили новый свѣтъ на ученіе о ущемленіи, т. е. съ 1731 и по 1842; наконецъ четвертый періодъ заключаетъ въ себѣ послѣднее двадцатилѣтіе и замѣчателенъ открытіемъ *Roser*'а. Не задавая себѣ напраснаго труда перечислять всѣ извѣстныя сочиненія, укажу на тѣ изъ нихъ, которыя преимущественно служили мнѣ руководствомъ при составленіи этой диссертациі.

- Richter*, Abhandlung von der Brüchen. Göttingen. 1785.
- Sabatier*, Наставленія для практическихъ врачей. Переводъ Громова, ч. I. С.-Петербургъ. 1808.
- J. N. Rust*, Handbuch der Chirurgie. B. VIII. Berlin. 1832.
- A. Cooper*, Oeuvres complètes chirurgicales. Traduct. de Chossoignac. Paris. 1837.
- Emmert*, Lehrbuch der Chirurgie. B. III. 1858.
- Boyer*, Traité des maladies chirurgicales. T. XIII. Paris. 1831.
- Jobert de Lamballe*, Traité des maladies chirurgicales du canal intestinal. T. I, II. Paris. 1829.
- Hager*, Die Brüche und Vorfälle. Wien. 1834.
- Nelaton*, Eléments de Pathologie chirurgicale. T. IV, переводъ Д. Хана. С.-Петербургъ. 1859.
- Roser*, Handbuch der Anatomischen Chirurgie. Tübingen. 1859.
- Velpeau*, Nouveaux éléments de médecine opératoire. T. IV. Paris. 1839.
- Hyrzl*, Топографическая Анатомія, перев. ч. I. С.-Петербургъ. 1860.
- Голицинъ*, Руководство къ Анатоміи человѣческаго тѣла. Переводъ. Берлинъ. 1860.
- Заблוצкій*, Описаніе грыжъ. С.-Петербургъ. 1855.
- Vidal de Cassis*, Lehrbuch der Chirurgie. Berlin. 1854.
- Хелиусъ*, Теоретическая Хирургія, перев. Лея. С.-Петербургъ. 1845.
- Malgaigne*, Руководство къ операт. Хирургіи. Пер. С.-Петербургъ. 1851.
- Вальтеръ*, Курсъ Анатоміи человѣч. тѣла. Кіевъ. 1853.

Н. Пироговъ, Хирургическая Анатомія артер. стволовъ.
С.-Петербургъ. 1854.

Саломонъ, Оперативная Хирургія. С.-Петербургъ. 1840.

A. Guérin, Оперативная Хирургія. Пер. С.-Петербургъ.
1860.

Popoff, Momenta quaedam de herniis incarceratis. Diss.
S.-Petersburg. 1844.

Mulert, De hernia ovarii. Diss. Mitaviae. 1848.

Meckel, Tractatus de morbo hernioso congenito. Diss.
Berolini. 1776.

Naranovicz, Tractatus de herniis. Diss. S.-Petersburg.
1836.

Bredoff, De herniotomia. Diss. S.-Petersburg. 1813.

Кромъ того, для составленія диссертациі служили различные журнальныя статьи, помѣщенныя въ—

Dictionnaire de médecine et chirurgie prat. T. IX.
Paris. 1833.

Dictionnaire des sciences médicales, T. III. Paris. 1812.

Biblioth. du médecin-praticien, T. XI. Paris. 1849.

Annales de la chirurgie française, 1840, 1841, 1842.

Gazette médicale, 1839, 1840, 1842, 1860, 1861.

Энциклопедическій Медицинскій Лексиконъ, Лек. ч.
II. С.-Петербургъ. 1843.

Военно - Медицинскій Журналъ, чч. V, XIX, XX,
XXVIII, XXXIV, XXXVIII, XLVIII, XLIX.

Другъ Здравія, Медицинская газета. 1856.

Г Л А В А I.

Образованіе паховыхъ грыжъ и ихъ раздѣленіе; устройство грыжеваго мѣшка и его содержимое.

Приступая къ изложенію ущемленныхъ паховыхъ грыжъ, считаю необходимымъ, для ясности и избѣжанія повтореній, сказать нѣсколько словъ о паховыхъ грыжахъ вообще; тѣмъ болѣе, что образованіе ихъ и раздѣленіе, а также устройство грыжеваго мѣшка и отношеніе его къ окружающимъ частямъ и заключеннымъ въ немъ внутренностямъ, играютъ весьма важную роль въ объясненіи механизма ущемленія и при операціи грыжесъченія.

ОБРАЗОВАНИЕ ПАХОВЫХЪ ГРЫЖЪ И ИХЪ РАЗДѢЛЕНІЕ. Хотя уже въ глубокой древности паховыя грыжи были извѣстны, однакожъ только въ настоящемъ столѣтіи сдѣлались ясными анатомическій ихъ характеръ и способы происхожденія. Изъ числа многихъ знаменитыхъ хирурговъ, занимавшихся обработкою этого предмета, особенно замѣчательны — *Scarpa, Dupuytren, A. Cooper, Hesselbach, Velpeau* и *Malgaigne*.

Паховыя грыжи образуются черезъ смѣщеніе внутренностей въ какое-нибудь отверстіе надъ Фаллопиевой связкой; это отверстіе — или бываетъ натуральное, или же образуется напоромъ внутренностей на какую-нибудь наислабѣйшую часть брюшной стѣнки паховой области, черезъ расхожденіе волоконъ мышцъ и сухожильныхъ растяженій. Вообще брюшная стѣнка въ паховой области слабѣе, чѣмъ на другихъ мѣстахъ, и не всѣ ея точки имѣютъ одинаковую крѣпость. Такъ, она слабѣе между подвздошною костью и сѣмяннымъ канатикомъ, чѣмъ между послѣднимъ и лобковыми костями; потому что въ этомъ мѣстѣ поперечная фасція значительно утолщена, чѣмъ и объясняется самое частое смѣщеніе внутренностей черезъ внутреннее паховое кольцо. Соответственно мѣсту происхожденія, паховыя грыжи раздѣляются на —

I *Грыжа паховая наружная* (*Hernia inguinalis obliqua externa*). Смѣщенные внутренности входятъ во внутреннее отверстіе паховаго канала, выдвигая сначала впереди себя брюшину и лежащій на ней клетчатый слой; потомъ вдаются въ клетчатое влагалище сѣмяннаго канатика и въ то, которое происходитъ отъ внутренней косой мышцы; при выходѣ же, изъ наружнаго отверстія паховаго кольца, покрываются кромѣ того волокнами *fasciae intercolumnaris* (*fibres col-laterales*), подкожною клетчаткою и кожей. При этой грыжѣ, внутренности иногда довольно долго остаются въ паховомъ каналѣ, образуя продолговатую опухоль, которую весьма легко смѣшать съ другими опухолями паховой складки. Главныя анатомическіе признаки па-

ружной паховой грыжи состоятъ — въ направленіи опухоли, наружномъ ея видѣ и отношеніи къ пахчревной артеріи и сѣмянному канатику. Направленіе этой грыжи натурально должно соответствовать положенію пахового канала, т. е. сверху внизъ, сзади напередъ и снаружи внутрь; отъ чего она и получила названіе косой (*hernia obliqua externa*). Артерія, обыкновенно, лежитъ съ внутренней стороны отъ шейки грыжеваго мѣшка, а сѣмянной канатикъ, нѣсколько сплюснутый, на задней и внутренней части опухоли. Впрочемъ иногда грыжа вѣдряется между элементами канатика и раздвигаетъ всѣ части, составляющія его; такъ — что при ущемленіи и операціи нельзя всегда руководствоваться положеніемъ выносящаго протока и кровеносныхъ сосудовъ. Такія анатоміи были извѣстны еще Камперу¹. Форма опухоли продолговато-грушевидная, съ основаніемъ, обращеннымъ внизъ. Нужно замѣтить, что иногда образуется наружная грыжа не чрезъ внутреннее отверстіе, а нѣсколько наружнѣе, или же, войдя въ паховой каналъ, выходитъ не чрезъ наружное кольцо, а гдѣ-нибудь наружнѣе черезъ расхожденіе волоконъ наружнаго косаго мускула (*hernie par éraillure de l'aponevrose du grand oblique, Velpeau*)².

Особенный видъ наружныхъ паховыхъ грыжъ представляютъ врожденныя (*herniæ congenitæ, s. h. tunicæ vaginalis Cooper'a, s. hernies à canal ouvert Malgaigne'a*); онѣ образуются обыкновенно немедленно по рожденіи

¹ *Icones herniarum. Tab. V. VII. 1801.*

² *Velpeau, Nouveaux éléments de méd. opérat. T. IV, стр. 178.*

ребенка или же гораздо позже; по необходимымъ условіемъ ихъ развитія есть приостановленное или недостаточное заростаніе processus vaginalis. Врожденныя грыжи долго были смѣшиваемы съ приобретенными, при чемъ отсутствіе грыжеваго мѣшка объясняли случайнымъ разрывомъ брюшины. Въ 1750 году первый *Sharp* обратилъ вниманіе на особенности этихъ грыжъ¹, а *John'y Hunter'y* удалось доказать своими наблюденіями, что онѣ, завися отъ остановки развитія, должны быть названы врожденными. Эти грыжи, выходя изъ брюшной полости въ открытый каналъ, не имѣютъ особеннаго грыжеваго мѣшка, а лежатъ въ сывороточной оболочкѣ яичка; слѣдовательно находятся съ послѣднимъ въ непосредственномъ соединеніи, а иногда даже съ нимъ срастаются.

Врожденные грыжи, по наружному своему виду и отношенію къ артеріи, совершенно сходны съ обыкновенными наружными паховыми грыжами; однако же недостатокъ яичка въ мошонкѣ, круглое твердое тѣло, замѣчаемое въ грыжевой опухоли при изслѣдованіи ея, возрастъ больного могутъ руководить при распознаваніи.

II. Грыжа паховая внутренняя прямая (*hernia directa Hesselbachi, s. ventro inguinalis Cooperi*) была описана въ первый разъ *Cline* въ 1777 году; она образуется, почти прямо, по направленію сзади напередъ въ средней паховой ямочкѣ черезъ отверстіе, произшедшее отъ разхожденія волоконъ поперечной и внутренней косої мышицы. Прямая грыжа рѣдко дости-

¹ *Sabatier*, l. c. стр. 73.