

Порфирьев Сергей Петрович

**Сифилис в Европейской
России**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
С32

С32 **Сергей Петрович П.**
Сифилис в Европейской России / Порфирьев Сергей Петрович – М.: Книга
по Требованию, 2022. – 199 с.

ISBN 978-5-519-79202-8

ISBN 978-5-519-79202-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Требованіе при всѣхъ статистическихъ изслѣдованіяхъ абсолютно безукоризненнаго матеріала было бы смертнымъ приговоромъ надъ многими отдѣлами статистики и между прочимъ надъ самымъ главнымъ для гігіены отдѣломъ, надъ статистикой состава и движенія народонаселенія.

Эрисманъ.

Цифры не управляютъ міромъ, но онѣ указываютъ, какъ міръ управляется.

Goethe.

Предисловіе.

Приступая къ настоящей работѣ, авторъ, какъ можно видѣть и изъ заглавія, главнымъ образомъ имѣлъ въ виду свести за нѣсколько лѣтъ матеріалъ, накопившійся въ первоисточникахъ по вопросу о степени распространенія сифилиса въ Европейской Россіи и борьбѣ съ нимъ врачебно-медицинской организаціи при помощи больницъ, амбулаторій и другихъ—тому подобныхъ учреждений лечебно-санитарнаго типа въ видѣ лечебно-продовольственныхъ пунктовъ, яслей и т. п.

Предполагалось, конечно, при этомъ разобрать критически самыя приемы медицинско-статистической методологіи по собиранію свѣдѣній о заболѣваемости сифилисомъ, подробно выяснить ab initio генезисъ объединяемаго матеріала, опредѣлить положительныя и отрицательныя стороны,--словомъ, дать полную и всестороннюю характеристику и уже предварительно статистически сгруппировать его для детальной обработки.

Съ цѣлью еще болѣе облегчить пользованіе этимъ матеріаломъ въ будущемъ, въ работѣ приведены даже и тѣ относительныя вычисленія, которыя лично авторъ и не имѣлъ въ виду использовать, но которыя при дополнительныхъ или и совершенно новыхъ самостоятельныхъ изслѣдованіяхъ все же будутъ неизбѣжны.

Авторъ не видитъ причины скрывать, что одніѣ выборки первоначальныхъ свѣдѣній изъ 300 рукописныхъ отчетовъ, давшія въ результатъ до 400 листовъ первоначальнаго цифрового матеріала, дальнѣйшая группировка его въ такъ назыв. основныя таблицы и подсчетъ абсолютныхъ и отно-

сительныхъ величинъ, даже при посредствѣ спеціальной счетной машины, заняли при довольно усидчивомъ трудѣ около двухъ лѣтъ, причемъ для переписки все время пришлось пользоваться еще и сторонней помощью.

Помимо одной сводки и предварительной систематизации было, конечно, у автора и желаніе, при помощи хотя бы и наиболѣе только надежной съ современной критической точки зрѣнія части матеріала, такъ или иначе освѣтить и самый вопросъ о степени распространенія сифилиса какъ по всей территоріи Европ. Россіи вообще, такъ и по отдѣльнымъ ея единицамъ, до уѣздовъ включительно, показать въ числахъ взаимоотношеніе его отдѣльныхъ формъ и т. д.— словомъ, дать до нѣкоторой степени въ предѣлахъ намѣченнаго періода общій его очеркъ. Но въ послѣднемъ своемъ намѣреніи, особенно гдѣ заходила рѣчь о Россіи въ цѣломъ, или болѣе или менѣе крупныхъ районахъ ея, авторъ до послѣднихъ предѣловъ былъ стѣсненъ крайней ограниченностью матеріала и потому *volens nolens* долженъ былъ ограничиваться узкими рамками тѣхъ свѣдѣній, какія давалъ ему основной первоисточникъ. Поэтому, если часть вины за недостаточность полноты и яркости очерка падаетъ на неопытность автора, то часть ея, по справедливости, должна быть снесена и на счетъ трудности не рядовой задачи и крайней ограниченности матеріала, т. е. на независимыя отъ автора причины.

Въ общемъ же,—если одни, кто и до выхода настоящей работы относительно степени распространенія сифилиса въ Россіи держались аналогичныхъ съ авторомъ взглядовъ, въ приведенномъ цифровомъ матеріалѣ и сдѣланныхъ изъ него выводахъ найдутъ хоть нѣкоторую фактическую основу для своихъ мнѣній; если другихъ, у кого подъ вліяніемъ или личныхъ впечатлѣній, или иныхъ цифръ сложились и совершенно несходныя представленія, работа натолкнетъ, наоборотъ, на новыя колебанія и размышленія,—если, далѣе, она снова подниметъ интересъ къ данному вопросу, вызоветъ пересмотръ его, а тѣмъ болѣе, если хоть сколько-нибудь облегчитъ изслѣдованіе въ будущемъ,—то авторъ результатами ея будетъ удовлетворенъ вполне.

С. Порфирьевъ.

С.-Петербургъ, 28 февраля 1911 года.

ВВЕДЕНІЕ.

Первая попытка суммировать за нѣсколько лѣтъ данныя о распространеніи сифилиса по всей Россіи сдѣлана была д-ромъ М. Кузнецовымъ въ его работѣ „Сифилисъ и проституція въ Россіи“, появившейся къ 1871 г.

Приведенныя въ ней данныя обнимаютъ періодъ времени съ 1861 г. по 1869 г. Ежегодное среднее число сифилитиковъ, опредѣляемое на основаніи этихъ данныхъ, оказывается равнымъ приблизительно 62 тысячамъ *).

Въ 1882 г. проф. Д. И. Стуковенковъ, обобщая вычисления имъ 5% заболѣваемости венерической болѣзною у солдатъ на все русское населеніе, общее количество зараженныхъ сифилисомъ въ Имперіи опредѣляетъ въ 5 миллионъ человекъ *).

Въ 1885 году по инициативѣ проф. А. П. Доброславина появилась большая работа ставшаго впоследствии извѣстнымъ въ области санитарно-статистическихъ изслѣдованій д-ра Г. М. Герценштейна—„Сифилисъ въ Россіи“.

Работа основана на данныхъ за періодъ времени съ 1877—80 г. включительно. Часть характеристики этихъ данныхъ передаю словами самого автора. Такъ, на стр. 10-й и 11-й д-ръ Герценштейнъ пишетъ: „Многіе врачи (земскіе) не обособляютъ напр. сифилиса отъ остальныхъ, такъ называемыхъ венерическихъ болѣзней“; „многіе отчеты не отдѣляютъ сифилитиковъ отъ другихъ венерическихъ болѣзней. Гдѣ это было возможно, мы тщательно выдѣляли подобныхъ больныхъ, чтобы имѣть возможность, хотя бы путемъ при-

*) Цитирую по Герценштейну.

близительнаго $\%$ опредѣленія, вычислить приблизительное число сифилитиковъ въ тѣхъ случаяхъ, когда показана общая сумма венерическихъ больныхъ“; на стр. 32 авторъ продолжаетъ: „Еъ сожалѣнію, по рѣшительно непонятной научной отсталости нашей официальной записи въ группу венерическихъ болѣзней сводятся воедино такія разнородныя по своему, клиническому, а тѣмъ болѣе по своему общественному значенію страданія, какъ сифилисъ, мягкій шанкръ и перелой“.

Общую сумму сифилитиковъ для всей Имперіи д-ръ Герценштейнъ опредѣляетъ приблизительно равной $1\frac{1}{2}$ —2 милліонамъ. Еъ такому итогу онъ приходитъ путемъ слѣдующихъ вычисленій:

1) По официальнымъ даннымъ „изъ 549.349 осматрѣнныхъ двадцатилѣтковъ сифилитиковъ было 3.293 (стр. 46), или одинъ сифилитикъ на 169 конскриптовъ, т. е. 0,60 $\%$, но означенные новобранцы были забракерованы исключительно въ виду третичнаго характера ихъ страданій. Между тѣмъ всѣ больные съ первичными и вторичными формами были зачислены въ ряды войскъ“. „Исходя изъ того, что $\%$ третичныхъ формъ колеблется въ разныхъ мѣстностяхъ отъ 35 до 40 или въ общемъ равенъ приблизительно $\frac{1}{3}$ всего числа больныхъ сифилисомъ, не будетъ ошибки признать, что число принятыхъ на службу сифилитиковъ доходитъ до 6.000 и слѣдовательно на все число 549.349 конскриптовъ всего большихъ означенной болѣзью было 9.300 человекъ, или около 1,7 $\%$, т. е. одинъ сифилитикъ на 59 чел. новобранцевъ“. „При подобномъ предполагаемомъ отношеніи числа большихъ сифилисомъ среди новобранцевъ, число сифилитиковъ во всемъ стомилліонномъ населеніи Русской Имперіи должно быть не менѣе 1.700.000 чел.“. Отсюда, принимая въ расчетъ, что среди женщинъ сифилисъ развитъ сильнѣе, чѣмъ среди мужчинъ, д-ръ Герценштейнъ при посредствѣ промежуточныхъ подсчетовъ доходитъ до заключенія, что должно быть: „одинъ сифилитикъ на 52,5 жителя или 1,9 $\%$, а на все стомилліонное населеніе Имперіи 1.900.000 больныхъ“.

Есть основаніе думать, что взятая д-ромъ Герценштейномъ (какъ база) сумма забракерованныхъ изъ-за сифилиса,

конскриптовъ 3.293 опредѣлена имъ путемъ приблизительнаго подсчета.

Такъ какъ врачи приемныхъ комиссій, руководясь при освобожденіи отъ военной службы § 20 соответствующихъ правилъ, обычно въ качествѣ основаній указываютъ лишь пунктъ установленнаго Росписанія болѣзней, а въ Росписаніи приняты за весьма рѣдкими исключеніями за основаніе къ освобожденію не этиологическій моментъ, а послѣдствія или симптомы, то ни въ сообщеніяхъ Военскихъ присутствій, ни въ отчетахъ Медицинскаго Департамента готовыхъ чиселъ о числѣ забракованныхъ изъ-за сифилиса найти нельзя. Можно съ крайнимъ приближеніемъ получить ихъ только, учтя отдѣльныя статьи, указывающія напр., что причиной освобожденія могутъ быть язвы сифилитическаго, цыготнаго и другого происхожденія (ст. 10 прежняго Росписанія) потеря и разрушеніе костей, хрящей и мягкихъ частей носа и т. д.

2) „% венерическихъ заболѣваній составляетъ 40,3 на 1.000 чел. списочнаго состава“. „Смѣло можно принять, что сифилитики составляютъ только половину общаго числа венерическихъ больныхъ среди солдатъ. Принимая такой процентъ, мы на 100 миллионное населеніе Россійской Имперіи должны считать 2 миллиона сифилитиковъ“.

3) „По отчетамъ Мед. Департамента изъ осматрѣнныхъ всего за три года на фабрикахъ, заводахъ, тюрьмахъ и т. п. мѣстахъ 4.362.608 разныхъ лицъ оказалось больныхъ венерическими болѣзнями 60.941, т. е. 1,4%. Принимая такое отношеніе для всей Имперіи, можно вычислить всю сумму больныхъ въ 1.400.000 чел. Но что касается осмотра рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ, то несомнѣнно, что имѣющіяся officialныя данныя гораздо ниже дѣйствительности и далеко ей не соответствуютъ“.

4) „По отчетамъ Мед. Департамента среднее количество сифилитиковъ, пользовавшихся въ больницахъ за время съ 1877—1880гг. = 71.601, „отсюда“, принимая городское населеніе въ 11 миллионовъ жителей и допуская, что контингентъ больничныхъ сифилитиковъ составляется главнымъ образомъ изъ горожанъ, мы получимъ процентъ пользовавшихся горожанъ равнымъ 0,65, или что одинъ пользовавшийся приходится на 154 жителя. Но если вспомнить, что въ свѣдѣ-

ніяхъ о движеніи больничныхъ сифилитиковъ не упомянуты пользованные въ военныхъ госпиталяхъ, не приведены данныя относительно Петербурга и нѣкоторыхъ другихъ городовъ, то, несомнѣнно, что указанный процентъ долженъ быть значительно повышенъ. Вместе съ тѣмъ на увеличеніе процента должны повліять и амбулаторные больные и пользующіеся на дому.

Если даже допустить, что послѣднихъ только въ 2 раза больше, чѣмъ больничныхъ, то и тогда мы получимъ почти 2 проц. числа горожанъ, страдающихъ сифилисомъ. А допуская одинаковую степень распространенія сифилиса въ городахъ и селахъ, то подобный процентъ можемъ принять для всего населенія Имперіи“.

Послужившій основаніемъ для приведенныхъ сейчасъ подсчетовъ цифровой матеріалъ о венерическихъ заболѣваніяхъ, гсрпіе по принятой тогда номенклатурѣ, и о сифилисѣ среди новобранцевъ, фабрично-заводскихъ рабочихъ, о стационарныхъ венерикахъ взятъ авторомъ въ томъ или иномъ видѣ изъ отчетовъ Мед. Департамента и доставляемыхъ туда по третямъ года вѣдомостей мѣстныхъ врачебныхъ отдѣленій.

Помимо свѣдѣній о числѣ зараженныхъ „любострастными“ болѣзнями среди новобранцевъ и прочихъ лигъ, обнаруживаемыхъ по различнымъ губерніямъ въ Военскихъ присутствіяхъ, и при осмотрахъ фабрикъ, заводовъ, тюремъ и т. п. мѣсть, отдѣльныя вѣдомости даютъ указанія и „общаго числа извѣстныхъ Департаменту венерическихъ больныхъ съ выдѣленіемъ числа вновь заразившихся въ теченіе отчетнаго періода“ и числа венерическихъ больныхъ, только пользованныхъ въ больницахъ Вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, также съ указаніемъ числа вновь заразившихся, и распредѣленіе тѣхъ и другихъ по губерніямъ... „Самыми достовѣрными“ изъ всѣхъ этихъ данныхъ д-ръ Герценштейнъ считаетъ „цифры сифилитиковъ, найденныхъ при осмотрахъ рекрутовъ въ Военскихъ присутствіяхъ“.

Среднее число ежегодно пользованныхъ сифилитиковъ въ Европ. Россіи по прямому подсчету данныхъ равняется, по д-ру Герценштейну, 205.892 б. Общее же количество сифилитиковъ въ Европ. Россіи должно равняться 70 — 75%

приведенныхъ выше коррегированныхъ итоговъ для всей Россіи (стр. 48—40).

Въ представленномъ на съѣздѣ по обсужденію мѣръ противъ сифилиса въ Россіи докладъ д-ра В. И. Гребенникова „Статистическія данныя о распространеніи сифилиса и венерическихъ болѣзней въ Россіи“ сведены данныя за 6 лѣтъ съ 1889 по 1894 г. включительно. Первое мѣсто по степени распространенія сифилиса по этимъ даннымъ—врачебнымъ и фельдшерскимъ вмѣстѣ, принадлежитъ Тамбовской губерніи, давшей 21,7 больныхъ на тысячу жителей,—за ней слѣдуетъ Саратовская съ 21,1 больныхъ на 1.000 *). Средній же процентъ сифилитиковъ къ населенію по всей Россіи авторъ находитъ возможнымъ принять въ $\frac{2}{3}$ процента. Общее количество зарегистрированныхъ за 6 лѣтъ сифилитиковъ по взятымъ авторомъ даннымъ=4.383.535 б. Въ докладѣ д-ра Гребенникова въ особыхъ таблицахъ приводится за 5 лѣтъ цифровой матеріалъ отдѣльно по городамъ. За тѣ же 5 лѣтъ приводится сводка цифрового матеріала по городамъ Россіи и у проф. Петерсена въ докладѣ „Городской сифилисъ“.

Данныя по сифилису въ городахъ Россіи за пятилѣтіе 1890—1894 г. сведены и дополнены вычисленіями относительныхъ величинъ также и въ докладѣ Г. М. Герценштейна, „Статистика сифилитическихъ и венерическихъ страданій среди городского населенія“. Въ среднемъ, процентъ сифилитиковъ къ населенію въ городахъ опредѣляется 2,17.

Общія данныя по всей Россійской Имперіи сведены также и д-ромъ П. И. Мессарошемъ въ статьѣ „Къ вопросу о распространеніи сифилиса въ Россіи“, помѣщенной въ Вѣстникъ Общ. Гигіены въ іюлѣ 1896 г. Д-ръ Мессарошъ для освѣщенія вопроса о степени распространенія сифилиса по различнымъ губерніямъ и областямъ Россіи бралъ отношенія числа сифилитиковъ къ больнымъ, страдавшимъ одними заразными болѣзнями (общими). На основаніи полученныхъ изъ данныхъ за 1890—1894 г. статистическихъ выводовъ авторъ находитъ возможнымъ „раздѣлить губерніи и области Россіи на 3 группы, причемъ въ I-ю группу входятъ губерніи и области, гдѣ сифилитики составляютъ въ

По нашимъ даннымъ Тамбовская губ. занимаетъ лишь 4-е мѣсто

среднемъ выводѣ за пятилѣтіе 1890—1894 г. болѣе 5%, числа больныхъ съ общими заболѣваніями; во 2 группу—мѣстности съ числомъ сифилитиковъ отъ 3—5% общихъ заболѣваній; остальные же мѣстности составляютъ 3-ю группу съ числомъ сифилитиковъ менѣе 3% числа больныхъ“. Рациональность и доказательность такого приѣма освѣщенія данныхъ подлежитъ большому сомнѣнію въ виду того, что, какъ показано будетъ ниже, кривая сифилиса идетъ болѣею частью совершенно независимо отъ кривой общей обрацаемости, и сифилитики обращаются за помощью чаще и охотнѣе другихъ больныхъ.

1894 годъ является какъ бы предѣломъ, дальше котораго цифровыя данныя, могущія служить матеріаломъ по вопросу о степени распространенія сифилиса по всей Россіи, не подвергаются не только освѣщенію въ той или иной группировкѣ, но даже и простой сводкѣ за нѣсколько лѣтъ.

Въ связи съ приведеннымъ краткимъ обзоромъ данныхъ по указанному вопросу въ русской печати, считаю небезинтереснымъ привести указаніе изъ-за границы. По сообщенію *Wiener medicinische Presse* (20 мая 1905 г.), заимствованному изъ *Russische medicinische Rundschau*, въ Россіи заражена половина всего населенія, въ Одессѣ насчитывается не менѣе 75.000 сифилитиковъ на 450.000 населенія, въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Рязанской губ. больны почти всѣ поголовно. Это ужасное распространеніе болѣзни объясняется недостаткомъ врачей: 1 врачъ въ среднемъ на 1.000 кв. километровъ, въ Англіи 1—на 9 километровъ.

Указанная выше значительная разниа въ конечныхъ итогахъ, качество источниковъ, которыми вынуждены были пользоваться авторы, и наконецъ продолжительная пауза отъ послѣдней работы являются, по моему, достаточнымъ оправданіемъ попытки—разобрать насколько возможно накопившійся по данному вопросу матеріалъ, тѣмъ болѣе, что, какъ будетъ показано ниже, онъ въ послѣдніе годы повысился въ своихъ качествахъ.
