

Лейхман Леонид Карлович

Окраска мехов

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Л47

Л47 **Леонид Карлович Л.**
Окраска мехов / Лейхман Леонид Карлович – М.: Книга по Требованию, 2026. –
121 с.

ISBN 978-5-519-92996-7

ISBN 978-5-519-92996-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2026

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2026

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

І. Нѣсколько словъ о мѣхѣ.

Подъ *мѣхомъ* подразумѣваютъ *шкуръ*, снятыя съ животныхъ, покрытыя волосомъ, когда онѣ предназначены исключительно для того, чтобы быть обработанными съ *сохраненіемъ* волоса.

Въ мѣхѣ различаютъ кожу и волосъ.

Волосъ мѣха можетъ быть коротокъ или длиненъ, тонокъ или толстъ, грубъ или нѣженъ, и эти свойства вмѣстѣ съ его окраской опредѣляютъ достоинство мѣха, само собою разумѣется, если кожа здорова. Понятіе о длинѣ волоса относительное. Существуютъ мѣха съ болѣе короткимъ, другіе съ болѣе длиннымъ волосомъ; напримѣръ, норка и выхухоль имѣютъ короткій волосъ, заяцъ, кошка, кунница, соболь—средній, а лиса, рысь, волкъ имѣютъ длинный волосъ.

Различаютъ верхній волосъ или *остъ* и нижній волосъ или *подшерстокъ*. Послѣдній богатъ шерстью и по своей мягкости уподобляется шелку; верхній волосъ толще и длиннѣе, чѣмъ подшерстокъ, часто другого цвѣта и въ большинствѣ случаевъ болѣе темнаго; въ общемъ онъ представляетъ главную красоту мѣха; если же онъ слишкомъ длиненъ и топорщится (стоитъ), то цѣнность мѣха понижается.

Волосъ на мѣхѣ одного и того же вида животного часто бываетъ различенъ, что зависитъ отъ времени года, мѣстности, климата и корма животного.

Что касается кожи, то для достоинства мѣха она имѣет такое большое значеніе, что иногда даже и красивый волосъ не придаетъ мѣху цѣны, если кожа не хороша. Добротность кожи зависитъ отъ сушки мѣха.

Мѣхъ тотчасъ послѣ снятія надо хорошо растягивать и сушить на воздухѣ. Если эта сушка происходитъ вблизи огня или горячей печи, а также при очень большой солнечной жарѣ, то кожа *прожора*етъ: она дѣлается клейкой, съезживается, ломается и съ ней ничего нельзя будетъ сдѣлать. Если же прогорятъ только отдѣльные мѣста, какъ это и бываетъ въ большинствѣ случаевъ, то при дальнѣйшей выдѣлкѣ, хотя мѣхъ и будетъ готовъ, но эти отдѣльные мѣста останутся въ первоначальномъ состояніи и большей частью въ послѣдствіи проваливаются. Если жаръ не былъ слишкомъ рѣзкимъ, то кожа остается сырой и дѣлается неэластичной; но все же такой мѣхъ можетъ еще употребляться для нѣкоторыхъ цѣлей, при чемъ въ такомъ случаѣ эти неэластичныя мѣста часто и хорошо натираютъ крѣпкой мыльной кашицей, смѣшанной съ большимъ количествомъ соли *), пока кожа не сдѣлается немного гибкой, затѣмъ оставляютъ лежать нѣсколько часовъ или ночь и потомъ, пока шкурка еще влажна, натираютъ ее хорошимъ деревяннымъ масломъ. Такимъ образомъ до нѣкоторой степени она приобретаетъ гибкость, но такая операція вредна съ другой стороны, такъ какъ мыло и масло все-таки со временемъ проникаютъ въ волосъ, да и перемѣна погоды остается не безъ вліянія на кожу, такъ какъ соль притягива-

*) Растворяютъ мыло въ горячей водѣ и затѣмъ прибавляютъ соли сколько можно.

еть влагу, а съ другой стороны тепло опять со временемъ все-таки сдѣлаетъ кожу ломкой. — Совершенно тоже самое наблюдается, если промывать сырой мѣхъ горячей водой (свыше 38° Р.) или если подвергнуть его во влажномъ состояніи сильному жару.

Другимъ бячемъ является возможность «загниванія» («протуханія») мѣха. Именно, если мѣхъ сохнетъ очень медленно или неправильно вытянуть, то клеевое вещество, удерживающее корень волоса въ порахъ кожи, начинаетъ разлагаться, издавать непріятный запахъ, волосъ начинаетъ лѣзть и, наконецъ, выпадаетъ.

Если во-время высушить, то хотя волосъ и укрѣпится, но зато потомъ, когда при обработкѣ приходится смачивать кожу, волосъ вылѣзаетъ и образуются большія или меньшія оголенные мѣста, что конечно обезцѣниваетъ мѣхъ.

Часто выпадаетъ одинъ верхній волосъ, но въ большинствѣ случаевъ выпадаетъ одновременно и подшерстокъ. Иногда удается еще провести мѣхъ черезъ операцію дубленія, но зато оказывается, что это обезцѣниваетъ мѣхъ еще больше, чѣмъ если бы онъ имѣлъ оголенные мѣста, именно въ томъ отношеніи, что даже при самомъ легкомъ прикосновеніи волосъ лѣзетъ. При поскѣ подобнаго мѣха волосъ пристаётъ къ платью.

Кожа не во всѣхъ мѣстахъ имѣетъ одинаковую толщину, а также и не вездѣ и одинаково эластична. Вообще надо сказать, что наибольшая толщина кожи бываетъ по хребту, а наименьшая — по бокамъ.

Мѣхъ вытягивается по ширинѣ, очень мало въ длину, наибольшая же эластичность замѣчается между передними и задними конечностями.

Но еще болѣе, чѣмъ кожа, не равномеренъ въ разныхъ мѣстахъ мѣха и волосъ. Вообще онъ на головѣ коротокъ, затѣмъ длина его увеличивается немного на спинѣ и обыкновенно на крестцѣ онъ уже является наиболѣе длиннымъ. По ширинѣ мѣха волосъ наиболѣе длиненъ на хребтѣ и уменьшается съ боковъ, которые иногда даже совсѣмъ почти голы (скунгсъ). Опять-таки существуютъ нѣкоторые длинно- и густо-шерстные мѣха, которые имѣютъ брюхо съ наиболѣе длиннымъ волосомъ, напримѣръ лиса. Къ конечностямъ волосъ постепенно уменьшается въ длину, такъ что онѣ представляютъ части мѣха, наиболѣе коротко-шерстныя. На хвостѣ волосъ бываетъ еще длиннѣе и часто представляетъ наиболѣе цѣнную часть мѣха, напримѣръ у соболя. Но надо замѣтить, что отклоненія отъ приведеннаго относительно длины волоса довольно значительны.

Въ отношеніи окраски мѣха можно принять за правило, что крестецъ мѣха окрашенъ наиболѣе темно. Окраска распространяется по крестцу и бокамъ такъ же, какъ и длина волоса, именно, усиливаясь на крестцѣ въ интенсивности и густотѣ цвѣта, и уменьшаясь по бокамъ, хотя хвостъ и лапы обыкновенно бываютъ темнѣе. Но нѣкоторые сорта мѣха и въ этомъ отношеніи представляютъ отступленія.

Чѣмъ больше мѣхъ, тѣмъ больше изъ него можетъ сдѣлать скорнякъ; чѣмъ онъ темнѣе, тѣмъ менѣе легко онъ можетъ выцвѣсть и потерять свою красоту; чѣмъ онъ тоньше, тѣмъ лучше носится, т. е. долѣе удерживаетъ при носкѣ свой полный глянецъ и цѣлость. Чѣмъ онъ тоньше, тѣмъ обыкновенно и эластичнѣе; чѣмъ

грубѣе, тѣмъ болѣе ломокъ. Если же волосъ эластиченъ, то при носкѣ, а слѣдовательно при треніи, которому онъ подвергается, онъ будетъ сгибаться и потомъ опять выпрямляться, но не надламываться. Если же волосъ грубъ, то при употребленіи легко надламывается, свой- лачивается и мѣхъ очень быстро, такъ сказать, вы- тирается.

II. Сорта мѣха.

Выше было сказано, что свойства мѣха различны для одного и того же животнаго въ зависимости отъ времени года, когда животное убито, отъ мѣстности, гдѣ оно жило, и отъ того, чѣмъ оно питалось.

По времени года различаютъ *лѣтній* и *зимній* мѣхъ. Извѣстно, что весной большинство животныхъ теряетъ свой зимній волосъ. Лѣтній мѣхъ короткошерстный, часто окрашенъ нѣсколько иначе, при чемъ обыкновенно тем- нѣе, чѣмъ зимній мѣхъ, большей частью грубѣе, а под- шерстокъ нерѣдко и совсѣмъ отсутствуетъ. Кожа бо- лѣе мягка и часто толще, чѣмъ при зимнемъ мѣхѣ; верх- ній волосъ сидитъ такъ глубоко, что его можно замѣтить съ мездряной стороны въ видѣ черныхъ пятнышекъ. На нѣкоторыхъ животныхъ, какъ - то выхухоль, кроликъ, заяцъ, лѣтомъ съ боковъ волосъ линяетъ на столько силь- но, что образуются пятна, представляющія участки съ очень короткой шерстью. Но по мѣрѣ приближенія къ зимѣ мѣхъ дѣлается болѣе густымъ и къ новому году обыкно- венно мѣхъ находится во всей своей красѣ, хотя опять- таки это зависитъ еще и отъ суровости зимы.

Слѣдовательно, мѣха можно раздѣлять по тѣмъ особен-

ностямъ, о которыхъ было говорено выше, и это раздѣленіе приводитъ естественно и къ классификаціи самихъ животныхъ по тѣмъ свойствамъ, которыя вообще присущи имъ мѣхамъ. Но опять-таки здѣсь надо оговориться, что нерѣдко мѣха, находящіе себѣ сбытъ въ одну зиму, на слѣдующую уже не имѣютъ почти спроса; зависятъ это отъ *моды*, вліяніе которой на міровой рынокъ весьма значительно.

Во всякомъ случаѣ всѣ мѣха можно раздѣлить по ихъ достоинству вообще (въ зависимости отъ свойствъ, приобретаемыхъ отъ ненадлежащей обработки), т. е. по красотѣ, тонинѣ и густотѣ волоса, на 3 разряда.

Къ самымъ цѣннымъ мѣхамъ принадлежатъ: черная, серебристая крестовка и голубая лисица, черный, бурый, сѣрый и бѣлый медвѣдь, виргинскій хорекъ, шиншилла, сибирскій и американскій соболь, американская норка, куница, рѣчная выдра, бобръ, шведская рысь, бѣлый и черный волкъ, ангорская коза и т. п.

Къ мѣхамъ второго разряда причисляются: бѣлая и красная лисица, бѣлодушка или каменная куница, европейскій и азіатскій хорекъ, русская и американская рысь, выхухоль, скунгъ, росомаха, черныя и сѣрыя мерлушки, бѣличій мѣхъ и т. п.

Самыми малоцѣнными сортами считаются: русская норка, барсукъ, дикая кошка, домашняя кошка, хомякъ, заяцъ, кроликъ, овца, собака и т. п.

Въ дальнѣйшемъ краткомъ описаніи отдѣльныхъ мѣховъ эти послѣдніе расположены по алфавиту.

Выставленные цѣны мѣховъ относятся къ зимѣ 1903—1904 года, при чемъ германскія цѣны взяты изъ преис-

куранта D. Köllner въ Лейпцигѣ, а русскія—изъ преискурапта торговаго дома А. М. Михайлова въ Москвѣ.

Барсукъ обитаетъ во всей Европѣ, а также и въ Азіи. Онъ достигаетъ въ длину 93 сант., изъ которыхъ на хвостъ приходится 18 см. Шерсть, покрывающая все тѣло, длиною 6—10 см., по своей жесткости напоминаетъ щетину. Окраска на спинѣ пестрая, зависитъ отъ того, что волосъ у корня желтоватъ, въ срединѣ черенъ, а въ концѣ сѣровато-бѣлаго цвѣта. Съ боковъ и на хвостѣ шерсть съ рыжеватымъ оттѣнкомъ, а на нижней части тѣла и на конечностяхъ черно-бураго цвѣта. Голова бѣлая, но съ обѣихъ сторонъ морды—черная полоса, доходящая до плечъ. Мѣхъ его, собственно говоря, не пригоденъ для носки вслѣдствіе его сильной щетинистости; волосъ его идетъ главнымъ образомъ на изготовленіе кистей. Лишь только мѣхъ американскаго барсука имѣетъ мягкій волосъ, такъ что еще находитъ примѣненіе въ скорняжномъ дѣлѣ. Стоитъ онъ отъ 50 до 120 марокъ ¹⁾ за 10 шкурокъ; у насъ отъ 8 до 10 руб.

Бобръ обитаетъ по всей Сѣверной Америкѣ, а также и въ Сибири—въ бассейнѣ рѣкъ Оби, Иртыша, а также и въ Камчаткѣ; достигаетъ онъ въ длину 80 см., не считая хвоста. Шерсть его состоитъ изъ очень густого, пушистаго, шелковистаго подшерстка и рѣдкихъ, но длинныхъ, толстыхъ, упругихъ и блестящихъ волосъ ости, которые на головѣ и нижней части спины коротки, а на остальныхъ частяхъ достигаютъ 5 см. длины. На спинѣ шерсть темно-каштановаго цвѣта, переходящаго на под-

¹⁾ Марка по курсу стоитъ 46—47 коп.

шерстка въ сѣроватый, на брюхѣ окраска свѣтлѣе. Ноги окрашены въ болѣе темный цвѣтъ, чѣмъ туловище. Чѣмъ темнѣе мѣхъ, тѣмъ онъ драгоцѣннѣе. Лучше всего шкурки животныхъ, пойманныхъ зимою. Самыми лучшими мѣхами считаются американскіе, именно канадскіе и гудзонскіе. Стоимость чрезвычайно различна въ зависимости отъ красоты мѣха; обыкновенныя шкурки стоятъ теперь отъ 10 до 50 мар., въ Россіи же отъ 10 до 25 руб. за штуку. Передъ выпускомъ въ продажу изъ мѣха вырываютъ всѣ жесткіе волосы, оставляя почти одинъ подшерстокъ, или же эти волосы обстригаютъ.

Бѣлка или *векша* распространена по всей Европѣ, Азій и Сѣверной Америкѣ. Этотъ извѣстный всѣмъ звѣрекъ достигаетъ почти 25 см. въ длину, не считая хвоста въ 20 см. Мѣхъ бываетъ различнаго цвѣта зимой и лѣтомъ, на сѣверѣ и югѣ. Лѣтній мѣхъ буровато-краснаго цвѣта, по бокамъ въ смѣси съ сѣрымъ, на брюхѣ бѣлаго цвѣта; зимній же мѣхъ отличается тѣмъ, что верхнія части, хотя и буро-краснаго цвѣта, но смѣшаны съ сѣровато-бѣлыми волосами. Въ Сибири и въ сѣверной Европѣ зимній и лѣтній мѣхъ часто бываетъ бѣловато-сѣрый безъ всякихъ примѣсей рыжихъ волосъ. Длина волоса достигаетъ 2 см. Хвостъ чрезвычайно пушистъ.

Лучшими сортами считаются сибирскія бѣлки, доставляемыя съ верховьевъ Оби; нѣсколько похуже будутъ тобольскія и ленскія, карагопольскія, вятскія, казанскія, уступающія предыдущимъ сортамъ въ тонинѣ волоса. Наиболеѣ дешевой считается «зырянка», добываемая въ Вологодской губерніи. Американскія бѣлки гораздо хуже русскихъ и германскихъ, которыя очень близки по ка-

честву между собой. Бѣличій мѣхъ является однимъ изъ излюбленныхъ и при дешевизнѣ имѣетъ большое распространѣніе. Бѣличьи шкурки сортируются въ бунты по 20 шт. въ каждомъ, а бунты собираются въ тюки. При выкройкѣ мѣха отдѣляютъ брюшко отъ спинки, и, сшивая ихъ, получаютъ изъ нихъ мѣхъ хребтовый и черевій, изъ которыхъ первый цѣнится выше второго. Тысяча шкурокъ даетъ 5 черевыхъ и столько же хребтовыхъ мѣховъ, имѣющихъ въ длину $1\frac{3}{4}$ —2 аршина и состоящихъ изъ 2 половинокъ, изъ которыхъ каждая имѣетъ въ верхнемъ концѣ $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ арш., а внизу $1\frac{3}{4}$ —2 арш. Хвосты также находятъ примѣненіе для выдѣлки боа. Стоимость европейскаго мѣха равняется 15—20 коп., а сибирскаго—25—45 к. за шкурку; хвосты же продаются на всѣхъ отъ 40 до 100 руб. за килограммъ. Въ Германіи стоимость бѣлки (только спинки) за 100 шт.—30—70 мар., а хвосты отъ 30 до 120 мар. за сотню; въ Россіи же бѣлка стоитъ отъ 15 до 35 руб. за сотню. На мѣхъ идетъ 200 шкурокъ.

Волкъ распространенъ по всѣмъ странамъ свѣта, но теперь количество его уменьшается отъ повсемѣстнаго усиленнаго истребленія. Это всѣмъ извѣстное животное, достигающее свыше 1 метра длины, имѣетъ длинную жесткую и густую шерсть, болѣе длинную на животѣ и бедрахъ. Цвѣтъ обыкновенно грязно-сѣро-желтый со значительной примѣсью черныхъ волосъ; на нижней части окраска свѣтлѣе. Лѣтомъ цвѣтъ болѣе рыжеватый, а зимой—желтоватый; въ сѣверныхъ странахъ бѣлѣе, въ южныхъ—чернѣе. Въ Америкѣ встрѣчаются волки съ черной шерстью, а также и съ чисто-бѣлой (встрѣчаются

и въ Сибири); волосъ ихъ бываетъ довольно тонкій. Мѣхъ волка употребляется главнымъ образомъ на полости и ковры и цѣнится различно въ зависимости отъ чистоты окраски. Лучшими считаются шкуры изъ Лабрадора, стоимость которыхъ достигаетъ въ Германіи 60 — 100 мар.; затѣмъ идутъ сибирскія (160 — 250 мар. за 10 шт.), гудзонскія (45 — 120 мар. за 10 шт.), русскія, польскія и т. д.; самыми худшими считаются венгерскіе и испанскіе волки. Въ Россіи десятокъ волчьихъ шкуръ стоятъ 50—150 руб. На мѣхъ идетъ 11—12 штукъ.

Выдра рѣчная является однимъ изъ наиболѣе распространенныхъ по земному шару звѣрей (за исключеніемъ Австраліи и крайняго Сѣвера). Она длиною до 1 метра, при чемъ на долю хвоста приходится около $\frac{1}{2}$ всей длины. Все туловище ея покрыто густой короткой шерстью, состоящей изъ жесткихъ верхнихъ волосъ темно-бурой окраски (на нижней сторонѣ свѣтлѣе) и изъ очень тонкихъ волосъ подшерстка, который у корня свѣтло-бурого цвѣта, а на концахъ темнѣе. Общій тонъ мѣха сѣровато бурый. Онъ употребляются на опушку пальто, на воротники, муфты и шапки. Мѣха выдры идутъ въ слѣдующей послѣдовательности отъ лучшихъ къ худшимъ: лабдорская выдра, гудзонская, канадская, сѣверо-американская (все болѣе темнаго цвѣта, чѣмъ европейскія, и съ болѣе тонкимъ волосомъ), шведская, датская, русская, германская, французская, испанская, мексиканская и остьиндская. Стоимость американскихъ отъ 40 до 150 мар., у насъ 25—40 руб., а болѣе худшіе сорта отъ 12 до 60 мар. (въ Россіи 5 — 10 руб.) за шкурку. На мѣхъ идетъ 20—22 шт.