

Предисловіе къ 1-му изданію.

Въ послѣднее время въ гинекологіи явились два новыхъ терапевтическихъ агента—электричество и массажъ. Нельзя не порадоваться этому, такъ какъ современная гинекологія чрезвычайно бѣдна терапевтическими пособіями и слишкомъ богата оперативными приѣмами. Къ сожалѣнію, оперативные приѣмы, направленные къ излѣченію матки и ея придатковъ, не носятъ на себѣ характера консервативной хирургіи; съ другой стороны они требуютъ отъ врача спеціальной и продолжительной подготовки, съ третьей стороны они требуютъ особыхъ приготовленій и пособій, какъ со стороны медицинскаго персонала, такъ и окружающей обстановки, въ четвертыхъ они всегда серьезны, или даже опасны, ибо арена ихъ дѣятельности—брюшина, брюшные и тазовые органы; кромѣ того, показанія къ этимъ операціямъ не покоятся на твердыхъ основаніяхъ. Въ виду всего вышесказаннаго, всякій не кровавый агентъ, способный ограничить количество хирургическаго вмѣшательства, заслуживаетъ полнаго вниманія и требуетъ обстоятельнаго, подробнаго и точнаго изученія. Массажъ принадлежитъ къ таковымъ терапевтическимъ пособіямъ. Будущее его обезпечено, потому что примѣненіе его совершается на органахъ мышечно-сосудистыхъ, подвижныхъ и претерпѣвающихъ фізіологическія измѣненія въ величинѣ, консистенціи, въ кровообращеніи и питаніи.

Въ большинствѣ случаевъ, если матка и ея придатки обладаютъ нормальной величиной, консистенціей и подвижностью, функціи половой сфѣры совершаются правильно—эти условія и могутъ быть достигнуты гинекологическимъ массажемъ. Личная моя опытность не велика, но то, что я видѣлъ, заставляетъ меня рекомендовать массажъ въ особенности при гипертрофіяхъ верхневлагалищной порціи, при выпаденіяхъ матки, при наклоненіяхъ ея взадъ съ опущеніемъ, при хроническихъ экссудатахъ тазовой клѣтчатки (безъ нагноенія), при *hydrops tubae fallopianae profluens*, при врожденныхъ недостаткахъ развитія матки и при *Superinvolutio* и *Subinvolutio*. Этими показаніями, конечно, не ограничивается приложеніе массажа. Этимъ я указываю только границы своего личного наблюденія.

Лично для меня стоитъ вѣтъ всякаго сомнѣнія, что нѣкоторыя формы брюшинныхъ приращеній могутъ легко быть устранены массажемъ.

Въ виду этого, я весьма благодаренъ доктору Марку Матвѣвичу Ремизову, что онъ принялъ на себя трудъ познакомить Гг. врачей и студентовъ въ краткой, сжатой формѣ съ примѣненіемъ массажа въ гинекологіи.

В. Θ. Снегиревъ.

2-е марта 1889 г.

Предисловіе ко 2-му изданію.

Около двухъ лѣтъ назадъ была издана книжка д-ра Ремизова „Массажъ въ Гинекологіи“ и была принята медицинской публикой съ большимъ вниманіемъ, что вполне оправдывалось ея солидностью и зрѣлостью. Она была написана легко, толково и практично. Но въ ней недоставало многихъ фактовъ, которыхъ требовала жизнь и которыхъ изученіе и освѣщеніе были вполне необходимы. Сознавая это вполне, авторъ все это время употребилъ на изученіе ихъ въ женской клиникѣ Императорскаго Московскаго Университета и въ настоящее время желаетъ подѣлиться ими. Нельзя не быть признательнымъ за это, тѣмъ болѣе, что нужда въ гинекологическомъ массажѣ растетъ съ каждымъ днемъ. Достаточно сказать, что въ послѣдніе полтора года операція для излѣченія выпаденія матки стала у насъ въ клиникѣ рѣдкостью. Благодаря болѣе строгой разработкѣ анатоміи таза, мы, кажется, находимся наканунѣ весьма интереснаго поворота въ жизни гинекологіи. Можетъ быть, теперь массажъ, излѣчивая многія страданія матки и ея придатковъ болѣе или менѣе радикально,—излѣчитъ намъ и одно очень частое страданіе—retroflexiо настолько, что кольца и другія механическія приспособленія станутъ историческимъ достояніемъ. Вся фактическая сторона книги провѣрена въ гинекологической клиникѣ Императорскаго Московскаго Университета.

В. О. Снегиревъ.

Январь 1891.

Глубокаго уваженія и признательности заслуживаетъ человѣкъ, который безъ серьезной медицинской подготовки и руководства,—не врачъ, могъ дойти до такого оригинальнаго и вполне научнаго метода лѣченія женскихъ болѣзней.

Хотя мы и до Брандта имѣли уже нѣкоторыя указанія къ примѣненію массажа въ гинекологіи, однако практическая разработка этого метода всецѣло принадлежитъ Брандту, который болѣе 25 лѣтъ съ успѣхомъ пользуется имъ, какъ терапевтическимъ средствомъ.

Двадцати двухъ лѣтній шведскій офицеръ Брандтъ, окончивъ курсъ въ 1842 году въ Стокгольскомъ Центральномъ Королевскомъ институтѣ для шведской гимнастики, гдѣ и былъ оставленъ преподавателемъ. Затѣмъ онъ перешелъ въ Норркёпингъ, гдѣ въ продолженіи 5 лѣтъ имѣлъ возможность наблюдать и изучать женскія болѣзни. Отсюда онъ былъ приглашенъ въ Söderköping въ качествѣ врачабнаго гимнаста въ водолѣчебное заведеніе. Здѣсь онъ изучалъ женскія болѣзни на большомъ количествѣ случаевъ. Въ 1847 году къ нему обратился за помощію больной съ prolapsus ani. Какъ не врачъ, не зная, какъ взяться за дѣло, а врача въ то время не случилось, онъ уложилъ больнаго въ лежащее положеніе съ приведенными къ животу колѣнами, ввелъ чрезъ брюшныя покровы правую руку въ лѣвую подчревную область глубоко въ тазъ, стараясь попасть подъ flexuram sigmoideam и началъ оттягивать кишку внутрь и вверхъ, причемъ производилъ сотрясенія кишки, которыя, по его соображеніямъ, должны были произвести оживляющее дѣйствіе.

Такимъ способомъ ему удалось вправить выпавшій кусокъ кишки, на столько прочно, что выпаденіе не повторялось болѣе. Правда, случай былъ свѣжій и касался молодого субъекта. Въ 1859 году онъ прочелъ въ статьѣ д-ра Liedbeck, что въ Dalekarlien необыкновенно часто встрѣчаются выпаденія матки. Ему пришла мысль, что быть можетъ и эти случаи можно вылѣчить, какъ и prolapsus ani. Ему казалось возможнымъ захватить матку чрезъ брюшные покровы и поднять ее. Съ этой цѣлью онъ ревностно принялся, при помощи врачей, изучать анатомію, фізіологію и патологію женской половой сферы и много работалъ въ этомъ направленіи, прежде чѣмъ ему привелось осуществить свою мысль. Въ 1861 году къ нему обратилась 47 лѣтняя простая женщина Lisa Kjork, страдавшая 27 лѣтъ выпаденіемъ матки, которую она поддерживала бандажемъ, ею самой придуманнымъ. Послѣ 14 дневнаго лѣченія, матка болѣе не выпадала. Спустя нѣсколько дней явились еще двѣ такія же больныя и ихъ онъ вылѣчилъ. Слухъ о такомъ, поистинѣ, чудесномъ исцѣленіи быстро сталъ распространяться и къ Брандту начало стекаться множество больныхъ съ подобными страданіями.

Такимъ образомъ съ 1861 года Брандтъ началъ вырабатывать свой методъ, трудясь надъ нимъ и до сихъ поръ уже 72 лѣтнимъ старцемъ.

Для знакомства съ своимъ методомъ врачей, онъ писалъ брошюры, но врачи не приняли его метода. Одни пробовали и не получили удовлетворительныхъ результатовъ, другимъ онъ показался слишкомъ сложнымъ.

Не смотря на это, излѣченные имъ больныя успѣли разнести славу объ немъ далеко за предѣлы его отечества.

Единственный изъ всѣхъ врачей Скандинавскаго полуострова д-ръ Ниссенъ обратилъ серьезное вниманіе на методъ Брандта. Въ 1873 году онъ пріѣхалъ къ Брандту и въ продолженіи 8 мѣсяцевъ изучалъ подъ его руководствомъ его методъ. По возвращеніи на родину, Ниссенъ сталъ примѣнять его. Въ 1875 году онъ слѣлалъ объ этомъ сообще-

ніе въ медицинскомъ обществѣ въ Христіаніи, гдѣ разъяснили технику, показанія и указали на удовлетворительность полученныхъ результатовъ, въ особенности при выпаденіи матки. Большинство врачей высказалось однако противъ пригодности этого способа, многіе сочли его даже непозволительнымъ и лишь ничтожное меньшинство врачей рѣшилось испробовать его.

Въ западную Европу въ это время тоже проникъ методъ Брандта, но употреблялся безъ системы. Большинство врачей и здѣсь отнеслось къ нему съ недовѣріемъ, за исключеньемъ д-ра Prochowick, который основываясь болѣе чѣмъ на 2-хъ лѣтнемъ опытѣ, сдѣлалъ докладъ о примѣненіи массажа въ женскихъ болѣзняхъ на съѣздѣ естество-испытателей и врачей въ Гамбургѣ въ 1884 году. Массажъ былъ примѣненъ имъ на 102 больныхъ. Хорошіе результаты онъ получилъ при Descensus, Prolapsus uteri, при экссудатахъ, сращеніяхъ и зависящихъ отъ нихъ неправильныхъ положеніяхъ матки. Далѣе—Bandl упоминаетъ объ успѣшномъ примѣненіи массажа для растяженія рубцовъ послѣ параметрита, но считаетъ этотъ способъ опаснымъ при экссудатахъ, вслѣдствіе обостренія процесса. Д-ръ Chrobak высказывается осторожно о способѣ Брандта, прибавляя, что, быть можетъ, современемъ этотъ способъ и получитъ болѣе широкое примѣненіе. Winiwarter примѣнялъ массажъ у 79 лѣтней женщины съ кистой яичника и въ теченіи 9 мѣсяцевъ достигъ уменьшенія окружности живота на 19 cm. и улучшенія общаго состоянія, такъ что не было нужды прибѣгать къ проколу, между тѣмъ какъ въ предшествовавшіе массажу 8 мѣсяцевъ, 5 разъ дѣлали проколь. Negar и Winkel тоже упоминаютъ объ массажѣ, не придавая ему, впрочемъ, серьезнаго значенія. Такъ стоялъ этотъ въ высокой степени интересный вопросъ до 1886 года, когда д-ръ Profanter отправился въ Стокгольмъ къ Брандту и лично подъ его руководствомъ зимой 1885—1886 года познакомился съ его методомъ. Усвоивъ технику, изучивъ показанія, онъ вернулся съ этимъ запасомъ въ Германію. „Моимъ сообще-

ніямъ о Брандтѣ рассказываетъ Profanter, и о томъ, чего можно достигнуть при помощи его способа, не повѣрили, а мое заявленіе, что выпаденіе матки м. б. излѣчено безъ оперативнаго вмѣшательства, было встрѣчено рѣзкими насмѣшками. Поэтому, я, чтобъ доставить этому способу должное положеніе, рѣшился подъ контролемъ извѣстнаго авторитета доказать его достоинство путемъ излѣченія больныхъ. Вмѣстѣ съ этимъ я имѣлъ въ виду, что и Брандту будетъ т. о. возможность продемонстрировать свой способъ и устранить неправильныя сужденія объ немъ. Съ этою цѣлью я адресовалъ письмо къ проф. Шульце въ Іенѣ, который любезно согласился предоставить въ мое распоряженіе необходимый клиническій матеріалъ и принялъ на себя критическую оцѣнку результатовъ лѣченія.

Пользуясь этимъ я, Брандтъ и Д-ръ Ниссенъ прибыли въ Ноябрь 1886 года въ Клинику Проф. Шульце и получили для лѣченія 16 больныхъ. Изслѣдованіе больныхъ передъ лѣченіемъ Брандтовскимъ способомъ было произведено самимъ Шульце подъ хлороформомъ; тоже было повторено и послѣ лѣченія. Случаи касались хроническихъ и подострыхъ пара—и периметритовъ, перегиба матки назадъ, опущенія, полного выпаденія матки и свѣжей гематомы. Лѣченіе продолжалась отъ 2 до 8 недѣль. Съ перваго же дня лѣченія была прекращена этимъ больнымъ всякая терапия, взамѣнъ ея назначена была ежедневная прогулка на открытомъ воздухѣ. Въ большинствѣ этихъ случаевъ было достигнуто излѣченіе, а въ остальныхъ — значительное улучшеніе“. Полученные результаты было опубликованы Докторомъ Profanter въ его брошюрѣ: *Massage in der Gynaekologie*, гдѣ въ предисловіи Проф. Шульце настоятельно указываетъ на цѣнныя качества Брандтовскаго способа при растяженіи и отдѣленіи старыхъ периметритическихъ сращеній матки съ одной стороны и при опущеніи и выпаденіи матки съ другой. Кромѣ того Д-ръ Profanter сообщилъ случай полного выпаденія матки, излѣченнаго по способу Брандта, гдѣ чрезъ годъ послѣ прекращенія лѣченія, Prolapsus не возвратился.

•

Познакомившись съ этой брошюрой и увлекшись результатами лѣченія, Д-ръ Resch въ Грейфсвальдѣ и Проф. Шаута въ Прагѣ тоже отправились въ Стокгольмъ къ Брандту. Они подтвердили хорошіе результаты Брандтовскаго метода, въ особенности въ хроническихъ и подострыхъ воспаленіяхъ тазовой клѣтчатки и вызванныхъ этимъ смѣщеній матки и ея придатковъ, при гематоцеле, при опущеніи и выпаденіи матки. Д-ръ Resch пишетъ, что превосходные результаты отъ массажа получаются при слѣдующ. страданіяхъ: 1) При хроническомъ и подостромъ воспаленіи тазовой клѣтчатки и происходящихъ отъ этого смѣщеній матки и ея придатковъ, 2) При хроническомъ метритѣ, 3) При Haematocele retrouterina 4) При Descensus и prolapsus uteri.—Благодаря Д-ру Resch, сочиненіе Брандта явилось въ нѣмецкомъ переводѣ. Жаль только, что переводъ переданъ очень сжато.

Проф. Шаута подробно описываетъ способъ Брандта, говоритъ о показаніяхъ, противопоказаніяхъ и сообщаетъ нѣсколько собственныхъ хорошихъ результатовъ этого способа лѣченія. Въ то время какъ Д-ръ Profanter, Брандтъ и Niessen были у Проф. Шульце, Д-ръ Seiffart былъ ассистентомъ его клиники. Воспользовавшись ихъ присутствіемъ, онъ изучилъ этотъ способъ и описалъ 12 случаевъ успѣшнаго лѣченія воспаленій тазовой клѣтчатки, матки, яичниковъ и prolapsus uteri. Кромѣ того онъ съ успѣхомъ примѣнилъ массажъ въ 60 случаяхъ и описалъ технику, показанія и противопоказанія.

Далѣе Д-ръ Preuschen, тоже работавшій у Брандта, сообщилъ случай prolapsus uteri, существовавшій 31 годъ и излѣченный по способу Брандта ¹⁾ Д-ръ Preuschen даетъ научное объясненіе методу Брандта. Затѣмъ я могу указать на сочиненіе Theilhaber, Френкель статьи Winawer, Никольской, Семянникова, и т. д. ²⁾ Всѣ они съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ примѣняли способъ Брандта.

¹⁾ По истинѣ чудесное излѣченіе!

²⁾ См. источники.

Позволяю себѣ надѣяться, что это краткое введеніе дастъ желающему ключъ для болѣе подробнаго знакомства съ историческимъ ходомъ развитія этого метода лѣченія женскихъ болѣзней.

Въ Гинекологической клиникѣ Проф. В. О. Снегирева методъ Брандта примѣняется мной съ Сентября 1888 года.

Изслѣдованіе больной.

Больная изслѣдуется Брандтомъ сначала стоя, потому что матка и ея придатки въ такомъ положеніи легче достижимы ¹⁾; затѣмъ лежа. Больная лежитъ на спинѣ на низкой кушеткѣ съ высоко приподнятымъ изголовьемъ (*Halbkrummliegende Stellung*), колѣна и бедра согнуты и разведены. Брандтъ садится съ лѣвой стороны больной у ея ногъ и не обнажая наружныхъ половыхъ частей, изслѣдуетъ, *per Vaginem* или *per rectum*, указательнымъ пальцемъ лѣвой руки, которая проводится подъ лѣвымъ бедромъ больной. Большой палецъ помѣщается на *Symphisis pubis*, а три остальные вытянуты и прижимаются къ промежности или ягодицамъ. Такое положеніе изслѣдующей руки даетъ возможность войти глубже во влагалище. Мочевой пузырь и *rectum* должны быть предварительно опорожнены.

Брандтовскій методъ лѣченія можно раздѣлить на 2 отдѣла. Въ одинъ входитъ общее лѣченіе, состоящее изъ цѣлаго ряда врачебно-гимнастическихъ упражненій — пассивныхъ, активныхъ и упражненій съ противодѣйствіемъ, которыя видоизмѣняются, сообразно каждому отдѣльному случаю. Въ другой отдѣлъ входитъ собственно мѣстное лѣченіе тазовыхъ органовъ, къ которому относятся: массажъ матки и ея придатковъ, растяженіе сращеній, спаивающихъ матку съ сосѣдними частями, репозиція матки, подниманіе матки и т. д. Къ этому же отдѣлу можно отнести тѣ гимнастическія упражненія, которыя имѣютъ цѣлью укрѣпить крестцовые

¹⁾ Въ настоящее время такой способъ изслѣдованія оставленъ.