



О содержаніи канареекъ.

Сіи пшички, какъ сказываютьъ;
имѣють свое названіе отъ
Канарскихъ острововъ, лежа-
щихъ на Атлантическомъ морѣ,
противъ береговъ Африканской
Ледугеридской области; попо-
му что изъ сихъ принадлежа-
щихъ Испанцамъ острововъ имѣ-
ють онѣ первоначальное свое
происхожденіе, и опшуда снача-
ла къ намъ въ Европу вывезены;
нынѣ же пшички сіи выводятся
въ Нѣмецкой землѣ, во Фран-
ціи и въ Англіи, и въ каждой

изъ сихъ земель исправлены ихъ роды, такъ что родящіяся въ сихъ государствахъ канарейки какъ красошою своихъ перьевъ, такъ и пѣніемъ своимъ много превосходящъ привозимыхъ изъ самаго ихъ отечества.

Канарейки различаются по именамъ ихъ колеровъ, которые весьма многоразличны, и по которымъ по своему нраву вкуса приписывается имъ либо больше, либо меньше преимуществъ. По сему раздѣленію бывающъ ихъ слѣдующіе виды:

1. Обыкновенныя сѣрыя; сѣрыя съ бѣлыми ножками и бѣлымъ пушкомъ, кои пестроперными называются.

2. Сѣрыя съ бѣлыми хвостами.

3. Обыкновенныя бѣложелтыя.

4. Бѣложелтые съ красными глазами.

5. Бѣлые желтоватые опливающие нѣсколько вѣ. померанцовой, цвѣтѣ.

6. Бѣложелтые съ пушкомѣ.

7. Бѣложелтоватые съ бѣлыми хвостами.

8. Обыкновенно желтые.

9. Желтые съ пушкомѣ.

10. Желтые съ бѣлыми хвостами.

11. Обыкновенного янтарнаго цвѣта.

12. Янтарнаго цвѣта съ красными глазами.

13. Янтарнаго цвѣта съ бѣлыми хвостами.

14. Изабельнаго цвѣта.

15. Изабельнаго съ красными глазами.

16. Изабельнаго жаркаго цвѣта.

17. Изабельнаго съ пушкомъ.
18. Бѣлая красноглазки.
19. Обыкновенно пестрыя.
20. Пестрыя красноглазки.
21. Бѣлопестрыя.
22. Бѣлопестрыя красноглаз-
ки.
23. Чернопестрыя.
24. Пестрыя и жонкилочер-
ныя красноглазки.
25. Порядочно расписанныя
желшья и чернопестрыя.

Инако же онѣ раздѣляются вообще всѣ на два рода: а именно, на настоящихъ канареекъ и неублюдковъ, которыя послѣднія производятся отъ самца или самочки канарейки появившейся съ какою нибудь другою пшичкою, какъ на примѣръ, зяблицею, щегленкомъ, овсянкою и конюшнякою, о чемъ ниже упомянуто будетъ.

За

За нѣсколько лѣтъ до сего не были также извѣстны хохлатая канарейки, у которыхъ бываетъ маленькой хохолокъ между носомъ и головою.

Канарейки изъ относящагося къ увеселенію человѣческому имѣютъ въ себѣ почти все то совокупно, что другія въ розницу. Еслии хотѣть пріучить ихъ къ вылетанію и обратному влѣтанію изъ клѣшки, то онѣ и къ тому готовы, въ которомъ случаѣ можно ихъ вынимать изъ гнѣзда отъ матерей и пріучать быть ручными; а можно выпускать и на дворъ, но для сего послѣдняго надобно дождаться до того времени, какъ онѣ начнутъ понимать, и ту парочку, которую хочешь выпускать, продержавъ напередъ всю зиму въ покояхъ и

пріучить, чтобъ онѣ вылетали изъ клѣшки и опять влетали въ оную; но въ клѣшкѣ той надобъ о сдѣлать такія дверцы, которыя бы могли онѣ снаружи вовнутрь сами разшворять; когда же въ нихъ пшичка войдетъ, тобъ онѣ сами затворялись по примѣру западни, и пшички привыкли бы симъ образомъ сами себя запирасть, а чрезъ то можно бы было ихъ всегда получать, когда хочешь.

И такъ когда онѣ весною начнутъ пониматься, тогда выпускается напередъ самецъ въ свободной воздухъ, однако въ какое мѣсто, гдѣбъ были деревья, а клѣшка съ самкою вывѣшивается за окно; но самецъ полетавъ не много не прѣминетъ прилешѣшь въ клѣшку, и самъ
опять

опять понимается. Сіе выпусканіе подтверждается ежедневно ошѢ 6 до 7 дней сряду, и всякой разѢ, когда онѢ понимается, должно его оцять выпускать, однако не бравѢ его вѢ руки, ибо онѢ ошѢ того будетѢ пугаться. ПослѢ сего выпускается и самка, и сѢ того времени дворцы вѢ клѢшки оставляющіяся всегда ошворенными, дабы онѢ всегда изѢ клѢшки, или буде хопяшѢ, по изѢ самой горницы вылеташь могли и оцять влешать обратно; однако надлежитѢ послѢ сего, какѢ онѢ выведутѢ молодыхѢ, по естѢ вѢ АвгустѢ мѣсяцѢ, оцять ихѢ изловить, ибо вѢ противномѢ случаѢ осенью, когда начнется летѢ птицамѢ, онѢ разпропадутѢ. Что же касается до молодыхѢ, которыя выводятся на волѢ и на деревьяхѢ, по тѢхѢ спарашься на-

надобно изловить ранѣе, безъ чего онѣ всѣ разлещатся.

Канарейки разклевываютъ свою пищу и ѣдятъ всякія зерны; но ежели имѣ бытъ прямымъ, здоровымъ и бодрымъ, то надобно имѣ всегда имѣть какую нибудь зелень, которую въ зимнее время можеть составлять единая свѣжая копушта. Изъ всѣхъ сѣменъ для канареекъ здоровѣе и полезнѣе рѣпныя сѣмена; и изъ нихъ выбираютъ, которыя крупны и не много синеваты, сіи не имѣютъ въ себѣ никакой горечи; такъ какъ прочія, а особливо черноватыя, которыя имѣ очень вредительны, но первыя напротивъ того ихъ питаютъ и ободряютъ. Ежели сѣмена сіи случатся старыя, то онѣ пахнутъ заплывомъ, не имѣютъ никакого почти вкуса и имѣ мало питательны; ешь-
лижѣ

лижѢ онѢ слишкомѢ свѣжи, по
причиняющѢ поносѢ, и для того
надлежитѢ всегда запасаться сѣ-
менами въ МартѢ на цѣлые пол-
года и доставать самыя свѣжія;
ибо когда онѢ мѣсяцовѢ 8 или
10 полежатѢ, то могутѢ уже
безѢ опасности даваемы быть и
никакѢ не повредятѢ.

Просо, а особливо бѣлое очень
питаетѢ; разгорячаетѢ и дѣла-
етѢ жирными; почему оное имѢ и
не слишкомѢ много дается, а въ
иныя времена и совсѣмѢ давать не
должно. Конопляныя сѣмена пи-
тающѢ, горячатѢ и дѣлающѢ жир-
ными болѣе, нежели просо: по-
чему въ холодную зиму оное вы-
годно; но лѣтомѢ, ежели много да-
вать, то очень вредительно: поче-
му въ такое время употребляетѢ
ся канареечное сѣмя; но о семѢ
другіе писатели говорятѢ, что
его

его сибѣ пшичкамъ опнюдъ не надлежитъ давать слишкомъ много, потому что оное у нихъ сожигаетъ внутреннюю. Однако есть примѣры, что многіе сѣющіе сїи сѣмена сами и имѣющіе ихъ множество, кромѣ ихъ ничѣмъ своихъ канареекъ не кормятъ, но имѣютъ изрядныхъ и здоровыхъ, слѣдовательно многое при томъ и отъ обыкновенія зависитъ.

Гвоздичныя сѣмена, имѣющія сахарной вкусъ, даются пшичкамъ сибѣ тогда, когда у нихъ поносъ, для того что онѣ вяжутъ; а какъ оныя похожи на маковыя сѣмена, кромѣ только того, что сїи сѣры, а тѣ черноваты: то Гервіо предостерегаетъ, чтобъ вмѣсто гвоздичныхъ не употребляютъ маковыхъ; а отъ сихъ послѣднихъ онѣ непременно умираютъ.

Одъ