

Урусов Сергей Петрович

Свиноводство

Практическое руководство к разведению свиней

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
С32

С32 **Сергей Петрович У.**
Свиноводство: Практическое руководство к разведению свиней / Урусов Сергей Петрович –
М.: Книга по Требованию, 2024. – 54 с.

ISBN 978-5-519-78314-9

ISBN 978-5-519-78314-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Выборъ свиней для расплода.

Вопросъ о выборѣ свиней для расплода представляется болѣе сложнымъ, чѣмъ выборъ той или другой породы, и такъ какъ при различности сложенія между отдѣльными разновидностями имѣются извѣстныя существенныя качества, общія для всѣхъ животныхъ этого вида, какъ-то: крѣпкое тѣлесное развитіе и правильное сложеніе, то мы считаемъ необходимымъ остановить вниманіе читателя на наружныхъ особенностяхъ свиньи.




Рис. 1. Скелетъ свиньи.

У борова прежде всего долженъ быть благородный и мужественный видъ, что главнымъ образомъ выражается въ формѣ головы, которая должна быть легка, лобная часть длиннѣе носовой, нижняя челюсть широка и мясиста, горло широкое, рыло, примыкая прямой линіей къ широкому лбу, должно быть не слишкомъ длинно, не слишкомъ коротко и не имѣть складокъ. Черезъ чуръ малая голова, напоминающая голову мопса, есть при-

знакъ плохой плодовитости и слабаго тѣлеснаго развитія.

На прилагаемыхъ рисункахъ 1 и 2 читатель увидить скелетъ свиньи и ея черепъ и намъ остается только поименовать важнѣйшія кости, существенно вліяющія на наружный видъ, таковыя суть:




Рис. 2. Черепъ свиньи.

Затылочная	a	Ребра	o
Теменная	b	Грудная	p
Лобная	c	Лопатка	q
Носовая	d	Плечевая	r
Височная	α	Подплечная	s
Яремная	β	Локтевая	t
Слезная	γ	Кости передняго ко-	
Межчелюстная	δ	лѣна	u
Верхняя челюсть	e	Берцовая	v
Нижняя челюсть	f	Бабькова	w
Шейные позвонки	g	Вѣнечная	x
Спинные позвонки	h	Копытная	y
Поясничные позвонки	i	Бедро	z
Крестцовая	k	Колѣнная чашка	1
Хвостовые позвонки	l	Голень	2
Тазъ	m	Кости скакового су-	
Сѣдалищная	n	става	3
		Пяточная	4

Переходя къ разсмотрѣнію наружнаго вида свиньи, мы должны раздѣлить его на три части: голову, туловище и конечности (рис. 3).




Рис. 3. Наружный видъ свиньи.

Г о л о в а:

задняя часть надъ затылочной костью. . .	1	глаза и вѣки	6
передняя часть надъ теменною костью. . .	2	щеки.	7
лобъ	3	носъ.	8
уши	4	ноздри	9
виски	5	ротъ (съ хоботомъ или пятачкомъ)	10
		подгортанная промеж- ность.	11

Т у л о в и щ е:

затылокъ.	12	холка	16
гребень	13	грудь	17
бока шеи	14	спина	18
горло.	15	животъ или брюхо. . .	19

паха или подвздохи	20
поясница	21
крестецъ	22
моклы	23
хвостовой корень	24
хвостъ	25
задній проходъ	26
задне-проходная промежность	27

большія губы женскихъ дѣтородныхъ частей	28
петля	29
вымя (у борововъ мошна съ шулятами 30 и крайняя плотъ 32)	31

К о н е ч н о с т и :

плечо	33
подплечье	34
локоть	35
переднее колѣно	36
берцо	37
берцо-бабковый суставъ	38
бабка	39

вѣнчикъ	40
копыто	41
окорокъ	42
голень	43
колѣнный суставъ	44
скакательный суставъ	45
пятка	46



Рис. 4. Отбитый крестецъ.

Что касается туловища, то слѣдуетъ обращать особое вниманіе, чтобы грудь была широкая, спина прямая, крестецъ не былъ узокъ и свиселъ, наиболѣе цѣнное мясо находится именно на задней части туловища (рис. 4 и 5).

Замѣчено, что боровы со слабо развитой задней частью обыкновенно обладаютъ также слабою производительной способностью.

Конечности, прежде всего, должны быть широко разставлены и находиться въ надлежащемъ отношеніи къ




Рис. 5. Глубокая и широкая грудь.

тяжести тѣла (рис. 6, 7 и 8). Если на переднія ноги борова смотрѣть спереди, то отъ груди до земли



Рис. 6. Нормальное
подплечье.




Рис. 7. Нормальныя
переднія ноги.

онѣ должны имѣть вертикальный поставъ и отстоять одна отъ другой въ равномъ разстояніи на всемъ протяженіи,

сверху до низу. При осмотрѣ передней ноги сбоку, она точно также должна спускаться отвѣсно отъ верх-



Рис. 8. Нормальная переднія ноги.



Рис. 9. Переднія ноги съ вогнутыми внутрь колѣнами.

няго конца до бабки, такъ что отвѣсная линія, опущенная отъ плечевого сустава до земли, должна проходить по срединѣ подплечья, колѣна, бедра и щиколки.




Рис. 10. Широкая постановка ногъ въ нижней ихъ части.



Рис. 11. Заднія ноги подтянуты подъ брюхо.

Порочныя уклоненія отъ правильной постановки ногъ весьма разнообразны (рис. 9, 10 и 11).

Относительно свойствъ кожи можно повторить все извѣстное о другихъ домашнихъ животныхъ. Либихъ говоритъ: «кожа есть зеркало, отражающее внутреннія качества». Тонкая кожа справедливо цѣнится у свиней, но это свойство не должно, однако, доходить до крайности, такъ какъ слишкомъ тонкая кожа указываетъ на нѣжность сложенія, а слѣдовательно и на большую чувствительность къ внѣшнимъ вліяніямъ. Толстая кожа, покрытая густой щетиной, указываетъ на отсутствіе благородства породы.

У свиней о достоинствахъ кожи можно судить по ушамъ. Слишкомъ тонкія красноватыя уши являются признакомъ вырожденія и повышенной чувствительности къ измѣненіямъ погоды.

Что касается свињи-самки, то она во всей своей фигурѣ должна носить отпечатокъ женственности. Относительно головы и туловища можно повторить все, что было сказано выше о боровахъ, прибавивъ лишь, что туловище должно быть какъ можно длиннѣе, чтобы было мѣсто для размѣщенія 12 — 16 сосцовъ. У самокъ съ короткимъ туловищемъ бываетъ обыкновенно не больше 8—10 сосцовъ. Поэтому предназначенныхъ къ расплоду поросятъ слѣдуетъ выбирать отъ такихъ матерей, у которыхъ много сосцовъ и которыя отличаются плодовитостью и молочностью.

Если молодая свинья начинаетъ рано высказывать большую склонность къ ожирѣнію, то ее слѣдуетъ изъять изъ заводскаго состава, такъ какъ можно съ увѣренностью предсказать, что изъ нея никогда не выйдетъ хорошей матери.

Спариваніе.

Спариваніе свиней не должно имѣть мѣсто до наступленія половой зрѣлости, которая не у всѣхъ разновидностей наступаетъ въ одинаковое время; такъ, боровакъ

мелкой породы можетъ служить заводскимъ цѣлямъ уже въ возрастѣ 10 мѣсяцевъ, точно также и свинки. Менѣе быстро развивающіяся породы спариваются къ годовому возрасту.

Быстрое развитіе оказываетъ большое вліяніе на половыя отправления и совершенно несомнѣненъ фактъ, что женскія особи, быстро развившіяся обильнымъ кормленіемъ съ самаго ранняго возраста и происходящія отъ животныхъ такимъ-же образомъ воспитанныхъ, обнаруживаютъ половое влеченіе въ такомъ возрастѣ, въ которомъ еще не должно происходить соединенія половъ.

Племенныхъ свиней не слѣдуетъ обильно кормить, такъ какъ иначе вызывается сильное развитіе половыхъ железъ и наступаетъ преждевременное возбужденіе, напр. уже на 6-мъ мѣсяцѣ, что нежелательно, въ виду того, что если подобныхъ свиней не случать, то впослѣдствіи онѣ легко становятся бесплодными, а если случать, то онѣ будутъ бѣдны молокомъ и приносятъ слабое потомство; кромѣ того, ожирѣвшіе поросята часто не обнаруживаютъ ни малѣйшаго слѣда полового возбужденія и тогда они уже не могутъ зачать, несмотря даже на частую случку.

Удобоваримый кормъ, возбуждающій пищеварительныя органы и достаточно укрѣпляющій тѣло своимъ правильнымъ составомъ, побольше движенія — вотъ правила для племенныхъ животныхъ. Боровамъ, вслѣдствіе особенностей ихъ пищеваренія, нельзя обойтись безъ дачи корма, имѣющаго свойство увеличивать количество воды въ тканяхъ, а потому измельченныя зерна съ картофелемъ и остатками молочнаго производства въ умѣренномъ количествѣ, будутъ въ данномъ случаѣ наилучшимъ кормомъ.

Время течки у свиньи продолжается отъ 30 до 40 часовъ; животное въ это время держится неспокойно въ своемъ хлѣву, у рта появляется пѣна. Если оплодотворенія не послѣдуетъ, то состояніе это повторяется чрезъ

3 — 4 недѣли. Средняя продолжительность беременности равняется 116 днямъ, и обыкновенно въ году свинья приноситъ два поколѣнія. Одинъ боровъ можетъ оплодотворить отъ 40 до 50 самокъ.

Кормъ супоросныхъ свиней, поросятъ и уходъ за ними.

Кормленіе заводскихъ свиней требуетъ большого вниманія. Въ пищу оплодотворенныхъ свиней необходимо избѣгать раздражающихъ и раздувающихъ веществъ, къ каковымъ въ особенности принадлежатъ ржаныя и гороховыя отруби, тронутые морозомъ и проросшіе корнеплоды.

Наилучшимъ кормомъ для супоросныхъ свиней слѣдуетъ считать пареный картофель или другіе корнеплоды, съ прибавкою небольшого количества отрубей, ячменя и квашеныхъ молочныхъ отбросовъ. Всякіе же отбросы отъ стола и хозяйства, безъ разбора, безусловно вредны, ибо все это кисло и недоброкачественно; точно также необходимо избѣгать всякихъ расоловъ и мыльнаго щелока, отъ которыхъ животныя заболѣваютъ.

Супороснымъ свиньямъ необходимы движенія, и если пастбище не далеко отъ свинарника, то и ихъ слѣдуетъ выгонять наравнѣ съ другими свиньями; въ противномъ случаѣ, для удовлетворенія свойственной имъ склонности къ рытью земли, необходимо предоставить какое нибудь подходящее мѣсто.

Приблизительно за недѣлю до появленія на свѣтъ поросятъ, свинью надо отдѣлить. Приближеніе рѣшительнаго момента узнается по безпокойству животнаго, которое спѣшно устраиваетъ себѣ постель изъ соломы. Подстилку лучше всего рѣзать помельче, длинная солома можетъ повредить поросятамъ, которыхъ мы совѣтуемъ

сейчасъ-же по мѣрѣ рожденія укладывать въ корзину, выстланную соломой или сѣномъ, а зимой покрытую одѣяломъ и выносить; послѣ-же окончанія акта и очистки помѣщенія, поросятъ слѣдуетъ принести обратно и каждому указать его сосокъ, котораго онъ и будетъ затѣмъ всегда придерживаться. Въ случаѣ же если поросятъ больше, чѣмъ сосковъ, то или убиваютъ наиболѣе слабыхъ, или кладутъ ихъ къ другой свиньѣ, только что опоросившейся.

Послѣдъ необходимо немедленно удалить изъ свинарника, иначе онъ можетъ быть сѣденъ свиньею, которая, какъ это иногда случалось, свой аппетитъ можетъ распространить и на живыхъ поросятъ.

Если есть основаніе предполагать, что свинья пожрала свой приплодъ, то ей даютъ два раза въ теченіи одного часа слѣдующее средство: 3 гр. рвотнаго виннаго камня и 20 гр. рвотнаго корня въ полъ-бутылѣ молока. Послѣ приѣма этого лѣкарства обыкновенно слѣдуетъ рвота. Нѣкоторыми нѣмецкими хозяевами рекомендуется такимъ свиньямъ давать сырое сало и отбросы получаемые при раздѣлкѣ тушъ скота, но такой способъ намъ представляется совершенно несостоятельнымъ и можетъ только увеличить противоестественное влеченіе свиньи.

Если свинья во время сосанія ее поросятами стонетъ, то это означаетъ, что они причиняютъ ей боль острыми клыками, которые въ этомъ случаѣ должны быть удалены помощью щипчиковъ.

Для правильнаго развитія поросятъ необходимо, чтобы молоко матери было доброкачественно. Приводимъ тутъ составъ нормальнаго свиного молока:

Воды	87,17‰.
Азота и бѣлка	6,36‰.
Сахара	4,26‰.
Солей	1,18‰.
Жиры	1,03‰.