

М. А. Мензбир

**Охотничьи и промысловые птицы
европейской России и Кавказа**

Том 1

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
М11

М11 **М. А. Мензбир**
Охотничьи и промысловые птицы европейской России и Кавказа: Том 1 / М. А. Мензбир – М.: Книга по Требованию, 2024. – 348 с.

ISBN 978-5-458-12891-9

Охотничьи и промысловые птицы европейской России и Кавказа.

ISBN 978-5-458-12891-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

О г л а в л е н і е .

	Стр.
I. Гагаровыя	1
1. Поганка большая. (<i>Podiceps cristatus</i> , L.)	3
2. Поганка сѣрошекая. (<i>Podiceps griseigena</i> , Bodd.)	6
3. Поганка рогатая. (<i>Podiceps auritus</i> , L.)	8
4. Поганка ушастая. (<i>Podiceps nigricollis</i> , C. L. Brehm.)	10
5. Поганка малая. (<i>Podiceps minor</i> , Briss.)	12
6. Гагара полярная бѣлоклювая. (<i>Colymbus adamsi</i> , Gray.)	13
7. Гагара полярная. <i>Colymbus glacialis</i> , L.)	14
8. Гагара полосатая или чернозобая. (<i>Colymbus arcticus</i> , L.)	15
9. Гагара краснозобая. (<i>Colymbus septentrionalis</i> , L.)	17
Добываніе гагаръ и поганокъ	19
II. Кулики	21
10. Вальдшнепъ. (<i>Scolorax rusticola</i> , L.)	23
Весна, стр. 25.—Весенняя охота, стр. 46.—Лѣто и осень, стр. 56.	
11. Дупель. (<i>Scolorax major</i> , Gm.)	71
Весна, стр. 73.—Весенняя охота, стр. 88.—Лѣто и осень, стр. 94.— Лѣтняя охота, стр. 105.	
12. Бекасъ. (<i>Scolorax gallinago</i> , Briss.)	112
Весенній образъ жизни, стр. 114.—Лѣтній и осенній образъ жизни. Охота, стр. 126.	
13. Гаршнепъ. (<i>Scolorax gallinula</i> , L.)	137
14. Грязовикъ. (<i>Tringa platyrhyncha</i> , Temm.)	145
15. Песочникъ. (<i>Tringa minuta</i> , Leisl.)	147
16. Куличекъ-воробей. (<i>Tringa temmincki</i> , Leisl.)	150
17. Песчанка. (<i>Tringa arenaria</i> , L.)	152
18. Песочникъ морской. (<i>Tringa maritima</i> , Brünn.)	153
19. Чернозобикъ. (<i>Tringa alpina</i> , L.)	154
20. Песочникъ исландскій. (<i>Tringa canutus</i> , L.)	158
21. Краснозобикъ. (<i>Tringa subarquata</i> , Güld.)	160
22. Камнешарка. (<i>Strepsilas interpres</i> , L.)	162
23. Болотный куликъ, веретенникъ. (<i>Limosa melanura</i> , Leisl.)	164
24. Веретенникъ малый. (<i>Limosa rufa</i> , Briss.)	170
25. Турухтанъ. (<i>Totanus pugnax</i> , Briss.)	172
26. Перевозчикъ, зукъ. (<i>Totanus hypoleucos</i> , L.)	176
27. Мородунка. (<i>Totanus terekus</i> , Lath.)	178
28. Куликъ-чернышъ. (<i>Totanus ochropus</i> , L.)	180
29. Фифи. (<i>Totanus glareola</i> , L.)	182

	Стр.
30. Поручейникъ. (<i>Totanus stagnatilis</i> , Bechst.)	184
31. Улитъ большой. (<i>Totanus glottis</i> , L.)	186
32. Травникъ. (<i>Totanus calidris</i> , L.)	191
33. Щеголь. (<i>Totanus fuscus</i> , L.)	192
34. Улитъ длиннохвостый. (<i>Totanus bartrami</i> , Wils.)	194
35. Плавунчикъ круглоносый. (<i>Phalaropus hyperboreus</i> , L.)	195
36. Плавунчикъ плосконосый. (<i>Phalaropus fulicarius</i> , L.)	197
37. Кроншнепъ большой. (<i>Numenius arquatus</i> , L.)	199
38. Кроншнепъ малый. (<i>Numenius tenuirostris</i> , Vieill.)	201
39. Кроншнепъ средній. (<i>Numenius phaeopus</i> , L.)	202
Образъ жизни кроншнеповъ и охота за ними	204
40. Куликъ-сорока. (<i>Haematopus ostralegus</i> , Briss.)	217
41. Шилоклювка. (<i>Himantopus avocetta</i> , Briss.)	219
42. Ходулочникъ. (<i>Himantopus melanopterus</i> , Meyer.)	220
43 и 44. Тиркушка луговая (<i>Glareola pratincola</i> , L.) и степная (<i>Glareola melanoptera</i> , Nordm.)	221
45. Бѣгунокъ. (<i>Cursorius gallicus</i> , Gm.)	228
46. Пиголица бѣлохвостая. (<i>Vanellus leucurus</i> , Licht.)	229
47. Кречетка. (<i>Vanellus gregarius</i> Pall.)	230
48. Чибисъ. (<i>Vanellus cristatus</i> , Meyer.)	235
49. Зуекъ морской. (<i>Charadrius cantianus</i> , Lath.)	242
50. Зуекъ каспійскій. (<i>Charadrius asiaticus</i> , Pall.)	243
51. Зуекъ малый. (<i>Charadrius minor</i> , Meyer et Wolf.)	244
52. Зуекъ галстушникъ. (<i>Charadrius hiaticula</i> , L.)	247
53. Сивка глупая. (<i>Charadrius morinellus</i> , L.)	250
54. Сивка морская, тулесъ. (<i>Charadrius helveticus</i> , Briss.)	253
55. Сивка, ржанка. (<i>Charadrius pluvialis</i> , L.)	255
56. Авдотка. (<i>Oedicnemus crepitans</i> , Temm.)	260
 III. Пастушковыя	 263
57. Журавль малый, красавка. (<i>Grus virgo</i> , L.)	265
58. Журавль сѣрый. (<i>Grus cinerea</i> , Bechst.)	269
59. Стерхъ. (<i>Grus leucogeranus</i> , Pall.)	279
60. Джекъ, вихляй. (<i>Otis macqueeni</i> , Gray.)	281
61. Стрепетъ. (<i>Otis tetrah</i> , L.)	283
Распространеніе и образъ жизни стрепета, стр. 283.—Добы- ваніе стрепетовъ, стр. 290.	
Дрофа. (<i>Otis tarda</i> , L.)	299
Географическое распространеніе, стр. 299.—Образъ жизни, стр. 302.—Охота на дрофъ, стр. 311.	
63. Лысуха. (<i>Fulica atra</i> , L.)	324
64. Водяная курочка. (<i>Gallinula chloropus</i> , L.)	327
65. Султанская курица. (<i>Porphyrio poliocephalus</i> , Lath.)	330
66. Коростель. (<i>Crex pratensis</i> , Bechst.)	332
67. Курочка малая. (<i>Porzana parva</i> , Scop.)	336
68. Курочка крошка. (<i>Porzana bailloni</i> , Vieill.)	338
69. Погоньшъ. (<i>Porzana maruetta</i> , Leach.)	339
70. Пастушокъ. (<i>Rallus aquaticus</i> , Briss.)	341

I.

ГАГАРОВЫЯ.

1. Поганка большая.

Podiceps cristatus, L.

Табл. 1.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. 1, стр. 5.

Болѣе распротр. названія: *нырецъ чомга, хохлатый нырецъ, хохлатая гагара.*

Мѣстныя названія: *кикачъ* (Онежск оз.); *гагара* (Пермская, Оренбург., Воронежск. и др. губ.); *оклѣва* (Пермскій у.); *поганка, крохаль* (у оренбургск. казак.); *гагара хохлатая, поганка, нырокъ* (Астраханск. губ.); *большая гагара* (Казанск. губ.); *хохлатая гагара* (Петербургск. губ.); *кавра, каура* (Гдовск. у.); *гагара, норецъ, нырецъ, хохлуша* (Харьков.).

Польск.—*nierek szibaty, rogaty, perkoz dwuszybny*.—Эстл.—*tükerd, reimtird, püitt*.—Лат.—*pakkaļ kahjis*.—Фин.—*silkkiikkikka, valkokukkiikkikka*.

Тат.—*чомга*.—Киргиз.—*сунгуръ*.—Адж., гур.—*кокона*.—Монг.-бурят.—*амгату*.—Тунгуз.—*наабхана*.—Волгул.—*тахте*; Остяцк.—*тахтинъ*; на Ирг.—*лор-вой*; у Сургута—*лар-татанъ*.—Самоѣд.—*нюне*; у Нарыма—*ньенна*.—Кор.—*юваю*; камчад.—*ашоай*.—Тангут.—*чувша*.

Распространеніе большой поганки въ Европ. Россіи весьма обширно, но она вездѣ является перелетною птицей, ненадолго улетаю зимою даже изъ самыхъ южныхъ частей страны.

Особенной полнотой наши свѣдѣнія о распространеніи описываемой птицы не отличаются, такъ что мы не можемъ даже съ точностью опредѣлить ея сѣверную границу. Въ южной полосѣ Финляндіи, отъ Финскаго залива къ сѣверу до 61° с. ш., на Аландскихъ о-вахъ и въ губ. Абоской она обыкновенна, въ губ. Тавастгусской, С.-Михельской, Куопіоской и Вазаской рѣже. Найдена на Ладожскомъ озерѣ, довольно обыкновенна на Онежскомъ и, быть можетъ, окажется доходящей до Архангельска. У насъ нѣтъ свѣдѣній о распространеніи этого вида въ большей части Новгородской губ., въ губ. Костромской и Вологодской. Точно такъ же мы можемъ только предполагать, что она встрѣчается въ Вятской губ. Въ Пермской губ. большая поганка рѣдка въ сѣверныхъ ея частяхъ, по крайней мѣрѣ вблизи отъ хребта.

Въ Верхотурскомъ уѣздѣ она встрѣчается только на прудахъ и озерахъ, и то въ очень небольшомъ количествѣ. Далѣе на югъ, вмѣстѣ съ увеличеніемъ количества озеръ и камышей, эта птица становится все обыкновеннѣе, пока, наконецъ, на озерахъ черноземной полосы начинаетъ гнѣздиться большими колоніями. Таково, наприм., оз. Малый Аллакъ. Въ Уфимской и Оренбургской губ., а равно и въ Урало-казачьихъ владѣніяхъ весьма обыкновенна. Какъ особенно богатые этими птицами водоемы, надо указать оз. Аслы-куль для Уфимской, Сулюкъ-куль, Кось-куль и Чушкалы для Оренбургской губ. То же относится къ Астраханской губ., гдѣ большая поганка во множествѣ водится на нижней Волгѣ, на Сарпѣ и другихъ бассейнахъ. Болѣе или менѣе обыкновенна и по средней Волгѣ, къ сѣверу до Казанской губ. включительно. Здѣсь она гнѣздится по большимъ камышистымъ озерамъ въ долинѣ Волги, Камы, Вятки; рѣже встрѣчается по рр. Мешѣ, Черемшану, Сурѣ. Затѣмъ она является обычной жительницей большей части лѣсныхъ озеръ сѣверо-западной части губерніи, наприм., Таиръ, Лебяжье, Щучье, Цурканъ, Лужьяръ, Шуръ-ерь и др. Все это подтверждаетъ справедливость выше сдѣланнаго замѣчанія, что большая поганка встрѣчается въ Вятской губ., гдѣ находитъ сѣверный предѣлъ своего распространенія. Въ губ. Рязанской и Московской обыкновенна, особенно мѣстами, наприм., на Сенежскомъ озерѣ. Въ Тульской встрѣчается мѣстами и вообще не часто, въ Калужской также довольно рѣдка, въ Орловской, повидимому, еще рѣже, не можетъ назваться обыкновенной и для Воронежской губ. Къ сѣверу отъ Московской губ. большая поганка, по всей вѣроятности, гнѣздится въ Ярославской и Тверской губ., хотя прямыхъ свѣдѣній объ этомъ я не имѣю. Въ Петербургской губ. гнѣздится во многихъ мѣстахъ, наприм., въ густыхъ камышахъ по побережью, на полузатопленныхъ островахъ, покрытыхъ густымъ и высокимъ камышомъ, Чудскаго озера и т. д. Обыкновенная гнѣздящаяся птица въ области Ильменя, но, какъ выше замѣчено, о большей части Новгородской губ. свѣдѣній нѣтъ, въ Псковской же губ. описываемый видъ встрѣчается, кажется, не часто. Въ Прибалтійскихъ губерніяхъ гнѣздится какъ на большихъ озерахъ (наприм., Стинтское оз.), такъ и въ подходящихъ мѣстахъ морского побережья (бухта Мацаль).

Въ Польшѣ это повсемѣстно распространенная птица. Въ губерніяхъ Черниговской, Волынской, Подольской, Кіевской и Полтавской гнѣздится и мѣстами даже обыкновенна. Въ Харьковской губ. весьма обыкновенная гнѣздящаяся и пролетная птица, что надо сказать и о Новороссійскомъ краѣ, откуда эта поганка улетаетъ зимою только очень ненадолго.

До сихъ поръ вопросъ о распространеніи этого вида въ Крыму не можетъ считаться сколько-нибудь выясненнымъ. Что большая поганка встрѣчается тамъ зимою и иногда появляется уже въ августѣ, не подлежитъ сомнѣнію; но послѣднее еще не говоритъ о гнѣздованіи этой птицы въ Крыму, а замѣчаніе Калениченко относительно того,

что она обыкновенна близъ Θεодосіи, по всей вѣроятности, относится къ зимѣ. Что касается Кавказа, то тамъ большая поганка гнѣздится какъ въ бассейнахъ Терека и Кубани, такъ и въ Закавказьѣ, и во множествѣ встрѣчается на Черномъ и Каспійскомъ моряхъ зимою.

Осенній отлетъ большихъ поганокъ изъ сѣверныхъ частей гнѣздовой области этой птицы начинается во второй половинѣ августа, сильнѣе происходитъ въ сентябрѣ и тянется до самаго замерзанія рѣкъ. На югѣ отлетъ начинается гораздо позднѣе: такъ, наприм., изъ Харьковской губ. большія поганки начинаютъ отлетать съ начала октября и летятъ весь октябрь, иногда запаздывая до половины ноября. При этомъ птицы, пользуясь благопріятнымъ направлениемъ рѣкъ, часто проплываютъ большія пространства, слѣдуя къ югу. Въ началѣ зимы поганки въ большомъ количествѣ собираются у сѣверныхъ береговъ Чернаго моря, а также, вѣроятно, и Каспійскаго. Въ это время онѣ обыкновенны какъ на Сивашѣ, такъ и у южнаго берега Крыма, но позднѣе оставляютъ эти мѣста, направляясь къ малоазійскому побережью. Около Батума время появленія большихъ поганокъ осенью колеблется между половиной сентября и октября; въ небольшомъ количествѣ встрѣчаются здѣсь всю зиму; большинство же съ наступлениемъ холодовъ подвигается дальше къ югу. На Каспійскомъ морѣ поганки появляются около Баку въ концѣ октября, наибольшей пролетъ ихъ идетъ въ декабрѣ, январѣ, а потомъ онѣ пропадаютъ, улетающая еще далѣе къ югу, къ Ленкорани и южнѣе. Сюда же сваливаютъ на зимніе мѣсяцы и поганки, гнѣздившіяся въ непроходимыхъ камышахъ Акуши и низовьяхъ Куры. Около Ленкорани поганки появляются недѣли на три позднѣе сравнительно съ Баку, въ серединѣ ноября, и сначала немногочисленны, а съ декабря до половины февраля число ихъ здѣсь необычайно велико. Однако, въ началѣ марта большая часть ихъ отлетаетъ отсюда, такъ что въ это время здѣсь остаются только одиночныя особи. У Батума обратное весеннее движеніе большихъ поганокъ на сѣверъ начинается со второй трети февраля и длится до половины марта, при чемъ эти птицы большими массами плывутъ вмѣстѣ съ лутками, чернетью и другими меньшими видами поганокъ, приблизительно въ верстѣ отъ берега.

Указаніемъ относительно времени возвращенія къ намъ большой поганки могутъ служить слѣдующія свѣдѣнія. Въ Оренбургскомъ краѣ валовой пролетъ происходитъ большею частію въ первыхъ двухъ третяхъ апрѣля. Около 10-го числа того же мѣсяца появляется подъ Уфой. Въ Харьковской губ. прилетъ въ одиночку наблюдается съ половины марта, валовой пролетъ бываетъ въ послѣдней трети этого мѣсяца, а послѣднія пролетныя видны въ послѣднихъ числахъ этого мѣсяца или даже въ первыхъ числахъ апрѣля. Вообще, большая поганка появляется весною вскорѣ послѣ того, какъ пройдутъ рѣки, рѣже незадолго передъ этимъ. Въ Прибалтійскихъ губерніяхъ появляется въ серединѣ апрѣля.

2. Поганка сѣрошекая.

Podiceps griseigena, Bodd.

Табл. 2.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 13.

Болѣе распростр. названія: *сѣрошекій* или *красношейный нырокъ*.

Мѣстныя названія: *сѣрошекій нырокъ*, *сѣрошекая поганка*, *поганка красношейя* (Астрахан. губ.); *нырець*, *поганка* (Харьков.); *ревуня* (Боровичск. у.).
Польск.—*perkoz rdzawoszyjny*, *nurek wrótczuby*.—Финск.—*harmakukku-ikkki*.

Это широко, но спорадично распространенная перелетная птица нашей страны, пока весьма недостаточно изученная со стороны своего распространения. Лучше извѣстна въ западной части. Сѣверная граница распространения этого вида на Кольскомъ полуостровѣ проходитъ по р. Танеліо, въ Киттиля и Пудасъярви. Восточнѣе сѣрошекая поганка была найдена г. Плеске на о. Величаиха, къ югу отъ Кандалакши, и г. Лавровымъ на Оленьемъ о-вѣ, напротивъ Кандалакши. Однако иногда встрѣчается и сѣвернѣе, наприм., въ области Энаре. Въ сѣверной и средней Финляндіи рѣдка, но въ ея южной части, отъ 61° с. ш. до Финскаго залива, на Аландскихъ о-вахъ, въ области Ладожскаго озера, на Онежскомъ озерѣ и вообще въ озерной области отъ Ладожскаго озера до Бѣлаго моря обыкновенна. О распространении сѣрошекой поганки въ обширномъ районѣ между С. Двиной, Уральскимъ хребтомъ и Волгой мы ничего не знаемъ. Г. Рузскій говоритъ, что эта птица встрѣчается въ Казанской губ. на пролетѣ, но за скудостью свѣдѣній это нельзя считать рѣшеннымъ; быть можетъ, она сюда только залетаетъ. Восточнѣе найдена подъ Екатеринбургомъ. Въ Уфимской губ. найдена подъ Уфой и въ Белебеевскомъ у., но не сѣвернѣе. Въ Оренбургской обыкновенна, но рѣже большой поганки. Распространена въ Уралоказачьихъ владѣніяхъ и обыкновенна въ Астраханской губ., особенно на нижней Волгѣ и на Сарпинскихъ озерахъ. Вверхъ по Волгѣ прослѣжена почти до Сызрани и, кромѣ того,

наблюдалась на Иловлѣ, Медвѣдицѣ и Хопрѣ. Въ Московской очень рѣдка, какъ и въ Тульской. О распространеніи этого вида въ губерніяхъ Ярославской, Владимірской и Тверской свѣдѣній нѣтъ. Въ Петербургской губ., вообще говоря, должна быть рѣдка, но въ области Ильмена, быть можетъ, не такъ рѣдка, какъ можно думать. Въ Прибалтійскихъ губ. чаще встрѣчается на югѣ, чѣмъ на сѣверѣ. Въ Польшѣ въ періодъ гнѣздованья рѣдка; гнѣздится отдѣльными парами и то въ немногихъ мѣстахъ, наприм., на озерахъ люблинскаго Полѣся. Еще южнѣе гнѣздится въ губ. Черниговской, Кіевской, Подольской, Полтавской, Воронежской и Харьковской, но, за исключеніемъ послѣдней, будто бы вездѣ рѣдка. Однако, въ области бывшаго Новороссійскаго края, по свидѣтельству Нордманна, это очень обыкновенная птица.

Свѣдѣнія о распространеніи этой поганки въ Крыму весьма недостаточны. Но я не могу согласиться съ г. Никольскимъ, что она встрѣчается здѣсь только на пролетѣ. Напротивъ, я думаю, что сѣрошекая поганка и гнѣздится здѣсь (наприм., на Сивашѣ), и зимуетъ, и, конечно, бываетъ на пролетѣ.

Что касается Кавказа, то здѣсь описываемый видъ весьма обыкновененъ въ бассейнахъ Терека и Кубани, гдѣ несомнѣнно гнѣздится, а позднѣе осенью и зимою бываетъ въ Закавказьѣ и на Каспійскомъ морѣ.

Сѣрошекая поганка прилетаетъ весною нѣсколько позднѣе большой, а осенью улетаетъ замѣтно ранѣе.



3. Поганка рогатая.

Podiceps auritus, L.

Табл. 3.

Мензбиръ, Птицы Россіи, т. I, стр. 17.

Болѣе распростран. названія: *рогатый нырокъ, рогатая гагара.*

Мѣстные названія: *гагара малая* или *рогатая* (Петербург.); *гагара малая* (Казанск.); *жикачъ* (Онежск.); *поганка, нырецъ, норецъ* (Харьков.).

Польск.—*nurek, perkoz rogaty; perkoz uszaty.*—Финск.—*härkälintu, mustakulikki-ikkki.*—Лапланд.—*njinnalak.*

Рогатая поганка въ качествѣ гнѣздящейся птицы принадлежитъ сѣверной половинѣ Россіи, тогда какъ въ южной встрѣчается только на пролетѣ, зимую въ Крыму, на Черномъ и Каспійскомъ морѣ.

Какъ гнѣздящаяся птица въ Финляндіи не идетъ сѣвернѣе Пудасъярви (65¹/₂° с. ш.), но вообще распространена къ сѣверу гораздо далѣе, была найдена въ Куусамо (66° с. ш.) и области Энаре до Ледовитаго океана. Отъ этой сѣверной границы рогатая поганка гнѣздится во всей Финляндіи, но въ южной части страны рѣдка. Вѣроятно доходитъ до Архангельска, довольно обыкновенна на Онежскомъ озерѣ, но затѣмъ, что касается Вологодской, Костромской и Вятской губ., намъ ничего не извѣстно отсюда объ этой птицѣ, а между тѣмъ она, несомнѣнно, должна быть здѣсь. Что касается Пермской губерніи, то можетъ быть этотъ видъ гнѣздится еще въ Верхотурскомъ уѣздѣ и во всякомъ случаѣ многочисленъ на степныхъ озерахъ. Гнѣздится въ Уфимской губ., но рѣже другихъ поганокъ, и, повидимому, еще болѣе сокращаясь въ числѣ, распространенъ въ Оренбургской губ. Въ области средней Волги не гнѣздится южнѣ Симбирской губ., но въ Казанской еще довольно обыкновененъ. Какъ въ Астраханской губ., такъ и въ Уралоказачьихъ владѣніяхъ, повидимому, только случайно встрѣчается даже на пролетѣ, и это весьма затрудняетъ рѣшеніе вопроса, куда улетаетъ рогатая поганка на зиму изъ восточной Россіи. Въ центральныхъ губерніяхъ описываемая птица встрѣчается не часто, но въ