

Турнер Генрих Иванович

**Первая помощь в несчастных
случаях до прибытия врача**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Г34

Г34 **Генрих Иванович Т.**
Первая помощь в несчастных случаях до прибытия врача / Турнер Генрих
Иванович – М.: Книга по Требованию, 2022. – 58 с.

ISBN 978-5-519-78013-1

ISBN 978-5-519-78013-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

СОДЕРЖАНІЕ.

	стр.
Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ до прибытія	
врача	8
Таблица I. Пособія при ранахъ	8
„ II. Пособія при ранахъ (продолженіе) . . .	10
„ III. Пособія при кровотеченіи	12
„ IV. Пособія при кровотеченіи изъ руки и ноги.	14
„ V. Остановка кровотеченія изъ руки и ноги.	16
„ VI. Пособія при переломахъ и вывихахъ . .	18
„ VII. Пособія при переломахъ и вывихахъ (про-	
долженіе)	20
„ VIII. Пособія при переломахъ и вывихахъ (про-	
долженіе)	22
„ IX. Пособія при отравленныхъ ранахъ . .	24
„ X. Оживленіе утопленника	26
„ XI. Оживленіе утопленника, уторгъшаго и др.	28
„ XII. Переноска раненаго или больнаго . . .	30
„ XIII. Переноска раненаго или больнаго (про-	
долженіе)	32
„ XIV. Переноска на носилкахъ	34
„ XV. Снятіе раненаго съ лошади	36
„ XVI. Перевозка раненыхъ и больныхъ . . .	38
Пособія при ожогахъ	41
Пособія при отмораживаніяхъ	42
Пособія при обморокѣ, ударѣ и падучей болѣзни . .	42
Пособія при отравленіяхъ	43
Яды и противоядія	45
Первая помощь при острыхъ внутреннихъ заразныхъ	
болѣзняхъ	52

Таблица I.

Пособія при ранахъ.

Черезъ каждую рану въ тѣло человѣка могутъ попасть различныя вредныя вещества (гниль и др.), которыя, дѣйствуя ядовито, могутъ повести къ тяжелой болѣзни и даже къ смерти.

Поэтому удалить отъ раны загрязненную одежду, **не прикасаться къ ранѣ чѣмъ либо грязнымъ** и немедленно ее **закрыть**.

Передъ перевязкой свои руки вымыть теплой водой съ мыломъ.

Чистую рану ничѣмъ не обмывать. Если же въ рану попала грязь, песокъ и тому подобное, то обмыть водою кипяченою или ключевою.

Къ ранѣ **приложить** рыхло сложенный **комокъ чистой** стираной ветоши, полотна, марли и т. п.

Если рана **загрязнена** или нанесена печистымъ орудіемъ, то этотъ **комокъ** ветоши **смочить** чѣмъ либо дѣйствующимъ противъ гнили, какъ то: **водкой, растворомъ** (одна чайная ложка на стаканъ горячей воды) **карболовой кислоты**, креолина. Еще лучше взять въ аптекѣ сухую ткань (марлю), пропитанную противогнилостнымъ средствомъ (іодоформовая, карболовая, сулемовая марля), и большой комокъ ея въ сухомъ видѣ приложить къ ранѣ. Поверхъ этого положить слой очищенной ваты, или еще ветоши, и все закрѣпить.

Закрѣпить повязку удобнѣе всего при помощи **треугольной косынки**.

Двѣ большія косынки получаютъ, если **четыреугольный**, въ аршинъ, кусокъ полотна, холста, коленкора и т. п. **разрѣзать** наискось; двѣ малыхъ можно сдѣлать изъ куска въ три четверти аршина; вмѣсто косынки годенъ головной платокъ.

Въ косынкѣ имѣется середина, два конца и верхушка (рис. 1); повязывается она слѣдующимъ образомъ:

При ранѣ на кисти положить ладонь на средину косынки, верхушку отогнуть назадъ и **поверхъ** ея завязать концы (рис. 4, 5, 6, 7).

Рану на пальцѣ или на ладони можно также перевязать косынкой, сложенной въ видѣ галстука (рис. 8, 9).

Рану на ступнѣ перевязывать такъ же, какъ на кисти (рис. 10, 11).

Раненую ногу или руку послѣ перевязки **уложить выше**; при ходьбѣ **руку подвѣсить** при помощи косынки (рис. 12, 14) или приподнятой полы сюртука (рис. 13), рубахи и пр.

Чтобы узлы косынки **не развязывались**, связывать ихъ какъ показано на рисунокѣ (рис. 2, 3).




Таблица II.

Пособія при ранахъ.

При ранѣ на головѣ выстричь волосы около раны (рис. 15); рану перевязать чѣмъ либо чистымъ и повязку закрѣпить косынкой такъ, чтобы середина ея пришлась на темени, а верхушка свѣшивалась на затылокъ (или на лобъ); концы обвести вокругъ головы и связать поверхъ верхушки, которую отогнуть кверху и пришить (рис. 16).

При ранахъ на шеѣ или на лицѣ косынку повязать сложенною галстукѣмъ (рис. 17).

Рану на плечѣ повязать двумя косынками: одна (вспомогательная) повязывается галстукѣмъ вокругъ шеи; другая помѣщается серединой на плечѣ, концы ея идутъ въ подмышку, вокругъ руки, и связываются; верхушка подводится подъ шейную косынку, отгибается назадъ и пришивается (рис. 18).

Рану на груди перевязать одной косынкой, середина которой помѣщается надъ раной, а всѣ три конца связываются вмѣстѣ на спинѣ (рис. 19).

Рану на спинѣ перевязать точно такъ же, одной косынкой; концы связать на груди.



Рану на животѣ перевязать одной косынкой; всѣ три конца связать сзади (рис. 20).

Рану на поясницѣ и ниже перевязать такъ же, одной косынкой; концы связать впереди (рис. 21).

Рану въ паху перевязать двумя косынками: одна помѣщается серединой надъ раной; концы идутъ вокругъ бедра и связываются; верхушка подводится подъ другую косынку, повязанную въ видѣ пояса, и отгибается (рис. 22).

Рану на колѣнѣ, локтѣ повязать косынкой, сложенной въ видѣ широкаго галстука (рис. 23).

При полномъ отрывѣ руки или ноги рану закрыть серединой косынки, концы связать вокругъ руки (или ноги) верхушку отогнуть и пришить (рис. 24).



— 111 —

Таблица III.

Пособія при кровотеченіи.

При кровотеченіи не загрязнять рану паутиной, тряпкой, желѣзной ватой, каплями и другими вредными вещами.

Прежде всего **распустить одежду**, стягивающую тѣло на пути между раной и сердцемъ.

Раненую часть тѣла по возможности приподнять и дать ей покой.

Въ рану плотно вложить комокъ чистой ветоши, или иного перевязочнаго матеріала, и туго закрѣпить косынкой или бинтомъ.

Если кровь брызжетъ струею изъ перерѣзанной бьющей жилы, то быстро ввести палецъ (чистый) въ глубину раны и надавливать на то мѣсто, откуда бьетъ кровь. Еще лучше, не трогая раны, **зажать эту жилу** на пути между раной и сердцемъ.

При кровотеченіи на черепѣ (на лбу, на затылкѣ) вложить въ рану комокъ чистой ветоши и т. п., и крѣпко нажимать ладонью, пока кровь не остановится (рис. 25); затѣмъ положить повязку потуже.

При кровотеченіи на вискѣ прижать бьющую жилу между раной и ухомъ (рис. 26); рану туго завязать (рис. 27).

При кровотеченіи изъ губы, щеки прижать жилу къ краю нижней челюсти (рис. 28); рану завязать (рис. 29).

При кровотеченіи изъ носа разстегнуть воротъ, посадить больного, пустить въ носъ струю холодной воды, прикладывать къ носу холодныя примочки; ввести глубоко въ ноздрю длинный кусочекъ ваты такъ, чтобы конецъ его оставался снаружи.

При сильномъ кровотеченіи изъ носа, глаза, вообще изъ какой-либо половины головы, зажать одну изъ двухъ бьющихъ жилъ, приносящихъ кровь къ головѣ (сонныхъ артерій).

Сонную артерію прижимаютъ сбоку дыхательнаго горла или четырьмя пальцами, стоя позади раненаго (рис. 30), или однимъ большимъ пальцемъ, стоя впереди (рис. 31).

Нельзя прижимать обѣ сонныя артеріи одновременно.

При кровотеченіи на спинѣ рану крѣпко зажать, пока не остановится кровь; затѣмъ перевязать.

III




Таблица IV.

Пособія при кровотеченіи изъ руки и ноги.

При сильномъ, бьющемъ кровотеченіи изъ подмышки зажать пальцемъ то мѣсто, откуда бьетъ кровь; затѣмъ надавливать въ глубину позади ключицы или четырьмя пальцами, стоя позади раненаго (рис. 33), или однимъ большимъ, стоя впереди (рис. 34); въ подмышку заложить большой комъ ветоши и туго прибинтовать руку къ туловищу.

Сильное кровотеченіе на ладони, предплечіи или впереди локтевого сустава можно остановить, придавивъ бьющую жилу (плечевую артерію), идущую отъ подмышки къ локтю (на той сторонѣ, гдѣ находится шовъ рубахи или скюртука).

Прижать эту жилу можно или четырьмя пальцами (рис. 36), или однимъ большимъ (рис. 35).

При кровотеченіи изъ пальцевъ руки рану завязать потуже, руку поднять прямо вверхъ.

При бьющемъ кровотеченіи изъ раны въ паху надавливать въ глубину раны пальцемъ или вложить комокъ ветоши и надавливать ладонью.

При сильномъ кровотеченіи на бедрѣ, подъ колѣномъ или гдѣ либо ниже зажать приносящую кровь жилу (бедренную артерію) въ срединѣ паха.

Прижимать жилу или большимъ (рис. 38), или четырьмя другими пальцами (рис. 37).

При кровотеченіи изъ пальцевъ ноги поднять ногу прямо вверхъ, рану завязать потуже.




Таблица V.

Остановка кровотока изъ руки и ноги.

Если кровотечение изъ руки или ноги такъ сильно, что съ нимъ трудно справиться и раненый истекаетъ кровью, то можно туго перетянуть раненую часть выше раны.

Удобнѣе всего для перетягиванія резиновый бинтъ (рис. 39, 40) или резиновая трубка, которые обводятся нѣсколько разъ, туго, вокругъ руки (рис. 39), или ноги, и закрѣпляются (рис. 40).

Вмѣсто резинового бинта пригодны подтяжки, подвязки, ремень и т. п., или вмѣсто этого дѣлается **перекручиваніе** при помощи платка, косынки и т. п.

Для этого косынка, сложенная галстукомъ, слабо повязывается вокругъ руки; подъ узелъ вставляется палочка, ложка и т. п. и закручивается (рис. 41); перекрутивъ палку нѣсколько разъ, ее закрѣпляютъ другой косынкой (рис. 42).

При кровотеченіи на рукѣ закручиваніе надо производить выше локтя, при кровотеченіи на ногѣ — закручивать выше колѣна.

Закручивать туго, пока кровь совсѣмъ не остановится.

Закручиваніе есть средство вѣрное, но и опасное.

Долго перекрученная рука или нога можетъ омертвѣть. Поэтому не оставлять руку или ногу перетянутыми больше часа. Если къ тому времени не прибудетъ врачъ, то снять на время перетяжку и прижимать бьющую жилу пальцемъ.

При отправленіи раненаго въ дорогу посмотрѣть, крѣпко ли держится перетяжка; по прибытіи на мѣсто, немедленно сообщить врачу, что раненая часть перетянута.
