

С. А. Бутурлин, Б.М. Житков

**Материалы для орнитофауны
Симбирской губерний**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
С11

С11 **С. А. Бутурлин**
Материалы для орнитофауны Симбирской губерний / С. А. Бутурлин, Б.М.
Житков – М.: Книга по Требованию, 2021. – 282 с.

ISBN 978-5-517-96275-1

ISBN 978-5-517-96275-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ВВЕДЕНИЕ.

Настоящая работа представляет собою сводку наблюдений пады фауною птицъ Симбирской губерніи, сдѣланныхъ обоими авторами за довольно продолжительный періодъ послѣднихъ пятнадцати лѣтъ въ теченіе неоднократныхъ, но въ общемъ, къ сожалѣнію, непродолжительныхъ наѣздовъ въ предѣлы описываемой мѣстности. Болѣе подробно имѣли мы возможность изучать Ардатовскій, Алатырскій, Карсунскій и Курмышскій уѣзды и отчасти лишь другія мѣстности губерніи и ближайшіе уѣзды Нижегородской и Пензенской губерній. Самая южная часть Симбирской губерніи не была нами посѣщаема. Законченная теперь первая часть нашихъ наблюдений заключаетъ описаніе группъ *Pygopodes*, *Longipennes*, *Limicolae*, *Alectorides*, *Gallinae*, *Columbae*, *Lamellirostres*, *Herodiones* и *Rapaces*.

Многія лица оказали намъ свое содѣйствіе указаніями по вопросамъ о распространеніи отдѣльныхъ видовъ птицъ, присылкою шкурокъ и т. под. Особенно благодарны мы А. Т. Евреинову, собравшему для насъ интересную коллекцію птицъ въ окрестностяхъ Симбирска, и графу Г. И. Рибопьеру, который любезно разрѣшилъ намъ коллектировать въ лѣсахъ и поймѣ своего обширнаго Промзинскаго имѣнья.

Такъ какъ между окончаніемъ этой части нашей работы и началомъ ея печатанія, по различнымъ причинамъ, прошло около четырехъ лѣтъ, то мы, не измѣняя текста, внесли нѣкоторыя дополненія, помѣстивъ ихъ въ примѣчаніяхъ.

8-го ноября 1904 года.

ГЛАВА I.

Орографическое описание Симбирской губернии и общій взгляд на ея фауну. Западная половина губернии и сосѣдніе уѣзды Нижегородской и Пензенской губернии. Сѣверный степной районъ и его станціи. Южный степной районъ. Долина и пойма рѣки Алатыря. Флора и фауна поймы. Восточная половина губернии и долина Волги. Правобережье Суры, поймы Суры и Барыша и ихъ фауна. Измѣненія въ орнитофаунѣ бассейна Суры подлѣ вліяніемъ засухъ 90-хъ годовъ.

Составъ орнитофауны отдѣльныхъ мѣстностей въ Симбирской губернии, какъ и всюду, стоитъ прежде всего въ самой тѣсной зависимости отъ станціи. Сплошные лѣса, хвойные или лиственные, небольшие, отдѣльно стоящіе рощи степныхъ пространствъ, рѣчные долины съ ихъ тучными лугами и обиліемъ текучихъ и стоячихъ водъ, однообразныя распаханныя поля — всѣ эти станціи характеризуются опредѣленною фауною птицъ. По отношенію къ разнообразію станцій Симбирская губернія, особенно ея западная и центральныя части, намъ по преимуществу изслѣдованныя, находится въ весьма благопріятномъ положеніи. Долина текущей съ Ю. на С. рѣки Суры вмѣстѣ съ обширною лѣсною областью, занимающей правобережье Суры и извѣстною подъ названіемъ Сурской дачи ¹⁾, раздѣляютъ губернію на восточный и западный степные районы, изъ которыхъ первый (уѣзды Буинскій, Симбирскій, сѣверо-западная часть Карсунскаго и Сызранскій) по составу своей фауны вообще носятъ нѣсколько болѣе

¹⁾ О лѣсахъ Сурской дачи см. М. Ружскаго, Орнит. набл. въ Симбирской губ. (Прил. къ прот. Каз. Общ. Ест., № 142).

рѣзко выраженный степной характер¹⁾. Что касается до западной половины губерніи, — въ составѣ уѣздовъ западной части Курмышскаго, Ардатовскаго, Алатырскаго и уѣздовъ сосѣднихъ губерній — Саранскаго, Лукояновскаго, Сергачскаго, Княгининскаго, Васильсурскаго, — то эта часть области представляетъ собою обширный степной районъ, весь, конечно, распаханный, съ волнистой, изрѣзанной многочисленными оврагами поверхностью и немногими островными лѣсами, распространенными къ тому же въ болѣе южной части области.

Этотъ западный районъ перерѣзывается съ запада на востокъ впадающей слѣва въ Суру рѣкою Алатыремъ, по лѣвому берегу которой тянется довольно широкая полоса частью хвойныхъ, частью лиственныхъ лѣсовъ, доходящихъ около устья Алатыря до лѣсовъ праваго берега Суры и представляющихъ собою узкій полуостровъ тайги²⁾, вдающийся отъ таежной области Засурья въ западную степную область, раздѣляя эту послѣднюю на сѣверный и южный степной районы.

Первый изъ нихъ, обнимающій части Ардатовскаго и Курмышскаго уѣздовъ и юго-восточные уѣзды Нижегородской губерніи, на всемъ пространствѣ своемъ представляетъ собою однообразное распаханное поле. Районъ этотъ ограниченъ съ сѣвера рѣкой Волгой, за которою начинается типичная таежная область, обнимающая Макарьевскій и Семеновскій уѣзды Нижегородской губерніи, рѣзко отличающіеся по составу фауны и флоры отъ перечисленныхъ нами выше юго-восточныхъ уѣздовъ Нижегородской губерніи, являющихся какъ въ орографическомъ, такъ и въ фаунистическомъ и флористическомъ

¹⁾ См. Б. Житковъ. Матеріалы по фаунѣ млекопитающихъ Симбирской губ., стр. 26. (Дневникъ Зоологич. отд. Общ. Люб. Ест., т. II, № 8).

²⁾ См. объ этомъ: Г. И. Талфильевъ. Предѣлы лѣсовъ на югѣ Россіи. Петербургъ 1894 (съ картою лѣсовъ) и Фито-Географическія области Европейской Россіи (съ картою областей). Тр. Им. В. Э. Общ. 1897 г.

отношеніяхъ непосредственнымъ продолженіемъ западнаго степнаго района Сибирской губерніи.

Эти однообразныя распаханныя степныя пространства на всемъ протяженіи своемъ характеризуются фауной, свойственной хлѣбнымъ полямъ сѣверныхъ частей степной области. Изъ млекопитающихъ болѣе типичными являются хомякъ (*Cricetus frumentarius* Pall.), полевая мышь (*Mus agrarius* Pall.), русакъ (*Lepus europaeus* Pall.) и нѣсколько рѣже встрѣчающіеся суслики (*Spermophilus guttatus* pall.), тушканчики (*Alactaga saliens* Gm.) и кроты (*Talpa europaea* L.). Изъ птицъ для открытыхъ частей этой полосы болѣе типичны глѣздящіяся: *Alauda arvensis*, *Saricola oenante*, *Anthus campestris*, *Circus cyaneus*, *C. macrurus*, *Coturnix coturnix* и кочующія дрофы (*Otis tarda*).

Однообразіе этихъ распаханныхъ полей прерывается оазисами съ совсѣмъ иною фауною, свойственною станціямъ различнаго характера, изъ которыхъ должны быть отмѣчены: 1) небольшія лѣственные рощи, разбросанныя въ различныхъ мѣстахъ по открытымъ полямъ описываемаго района; 2) сохранившіеся въ очень немногихъ мѣстахъ, обыкновенно ничтожныя по размѣрамъ, участки дѣвственныхъ ковыльныхъ степей (напр., Кочетовская степь близъ с. Теплаго Стана Курмышскаго уѣзда); 3) поймы менѣе и болѣе значительныхъ рѣчекъ, перерѣзывающихъ районъ, съ болѣе значительною артеріей — рѣкой Пьяной — во главѣ; 4) полевая травянистая болота, не слишкомъ рѣдкія въ описываемой области, но во многихъ мѣстахъ вовсе пересохшія въ послѣднее время или же совершенно высыхающія уже въ началѣ лѣта; 5) болѣе или менѣе значительныя водоемы въ видѣ стѣнныхъ прудовъ или болѣе крупныхъ озеръ (напр., озера близъ села Чамбилей Курмышскаго уѣзда). Эти лѣсные, травянистыя или обильныя водою оазисы привлекаютъ къ себѣ соответствующее животное населеніе, состоящее изъ тѣхъ формъ, жизнь которыхъ тѣсно связана съ лѣсомъ или водою.

Для лиственныхъ рощъ области лѣваго берега Суры характерно обычное лѣсное населеніе, за исключеніемъ формъ, наиболѣе типичныхъ для тайги. Вмѣстѣ съ отсутствіемъ куницы, бѣлки, лося и медвѣдя, здѣсь вовсе нѣтъ соекъ, сорокъ, глухарей, рябчиковъ и въ качествѣ правильно гнѣздящейся птицы также и вальдшнепа. Тетерева встрѣчаются здѣсь sporadически, обыкновенно гнѣздясь въ какой-нибудь болѣе значительной рощѣ въ теченіе года-двухъ и потомъ снова изъ нея исчезая. Постоянно держатся они въ большихъ по размѣрамъ участкахъ смѣшаннаго лѣса въ долинѣ Пьяны. Изъ другихъ формъ лѣсныхъ птицъ болѣе обыкновенными здѣсь являются сарычи, дятлы (особенно *Picus major*), кукушки, поползны, дрозды, иволги, различные вьюрки (особенно обыкновененъ *Fringilla coelebs*), славки, соловьи, нѣкоторыя совы и др. Довольно многочисленны въ этой части Поволжья очень маленькія рошцы обыкновенно старыхъ и высокыхъ деревьевъ — чаще всего дубовъ, — представляющія собою остатки вырубленныхъ болѣезначительныхъ площадей лѣса. Такіе возвышающіеся въ открытой степи островки высокыхъ деревьевъ въ качествѣ удобнаго мѣста гнѣздованія привлекаютъ нѣкоторыя формы, въ особенности гнѣздящихся многочисленными колоніями грачей (*Corvus frugilegus*) и кобчиковъ (*Cerchneis vespertinus*). Если высокоствольные дубы, какъ это часто бываетъ, сопровождается подбѣгъ изъ осинъ и различныхъ кустарниковъ, — рошца населена разнообразными пѣвчими птицами. Въ противномъ случаѣ она является пріютомъ лишь немногихъ гнѣздящихся видовъ (рядомъ съ грачами и кобчиками, въ толщѣ ихъ гнѣздъ, обыкновенно селится полевой воробей (*Passer montanus*); на сосѣднихъ незанятыхъ деревьяхъ иногда *Corvus cornix* и *Tinnunculus tinnunculus*).

Немпогіе сохранившіеся до настоящаго времени участки ковыльныхъ степей этого района содержатъ обыкновенно полевую фауну. Если степь перерѣзана сырыми балками, часто содержащими ручьи, мѣстами кочкарники съ осоками, чеме-

рикой (*Veratrum*) и т. под., то обычнымъ на такихъ мѣстахъ бываетъ гнѣздованіе чибиновъ (*Vanellus vanellus*); въ упомянутой мною Кочетовской степи ежегодно токують душеля. Обыкновенны въ такихъ мѣстахъ также перепелъ и коростель. Въ началѣ лѣта здѣсь охотно пасутся и лежатъ среди дня дрофы; очень рѣдко залетающіе въ эту мѣстность стрепета также держатся временно на такихъ степныхъ участкахъ. Во время полета это—довольно обычныя мѣста остановки журавлей и многочисленныхъ стай турухтановъ.

Травянистыя кочкарныя болота открытыхъ полей, въ особенности въ томъ случаѣ, если они заключаютъ въ своемъ районѣ еще отдѣльные стоячіе водоемы, характеризуются въ общемъ фауной, близкою къ фаунѣ рѣчныхъ поймъ. *Scolopax major*, *Sc. gallinago*, представители рода *Totanus*, *Crex crex*, *Porzana porzana*, *Anas boschas*, *A. crecca*, *A. circia*, *A. acuta*, *Circus aeruginosus*, *Motacilla flava*—являются здѣсь болѣе или менѣе обыкновенными. Изъ этихъ формъ нѣкоторыя утки—именно *A. boschas* и *A. crecca*—перѣдки и въ рощахъ, гдѣ существуютъ хотя мелкія и временныя болота, равно какъ и на степныхъ прудахъ и озерахъ. Эти послѣднія, привлекая въ качествѣ гнѣздящихся формъ утокъ, камышевыхъ луней, нѣкоторыхъ куликовъ и т. д., играютъ особенно значительную роль, какъ пункты остановки перелетныхъ птицъ весною и осенью. Около такихъ озеръ пристають многочисленныя стада различныхъ нырковыхъ утокъ, журавли, турухтаны, и на болѣе продолжительное время останавливаются осенью такія бродячія формы, какъ *Tringa subarquata*, *Tringa minuta*, *Phalaropus lobatus* и др.

Что касается до поемныхъ долинъ рѣчекъ, перерѣзывающихъ въ различныхъ направленіяхъ степной районъ, ограниченный лѣвымъ берегомъ рѣки Суры, то наиболѣе типичною поймою среди нихъ обладаетъ довольно значительная по длинѣ теченія, ширинѣ и глубинѣ рѣка Пьяна. Къ долинѣ этой рѣки примѣнимо почти во всемъ, что касается различныхъ

водоемовъ, уремъ, луговой флоры и фауны, тѣ замѣчанія, которыя мы сдѣлаемъ ниже относительно поймы рѣки Алатыря. Нужно замѣтить лишь, что между тѣмъ какъ пойма Алатыря ограничена лѣсами, имѣющими частью характеръ тайги, кладущей, конечно, свой отпечатокъ и на самую луговую долину рѣки, значительно меньшіе по размѣрамъ своимъ лѣса, окаймляющіе пойму Пьяны, по фаунѣ своей стоятъ ближе къ описаннымъ нами выше небольшимъ листовнымъ рощамъ западнаго степнаго района.

Что касается до рѣчекъ меньшаго размѣра, какъ Кыша, Мѣдянка и др., то нужно прежде всего замѣтить, что большинство ихъ находится въ настоящее время въ періодѣ все большаго и большаго усыхания, отзывающагося, конечно, очень рѣзко на составѣ фауны сопровождающихъ ихъ теченіе поемныхъ луговъ, раньше мѣстами обильныхъ болотами, теперь сухихъ. Въ зависимости отъ этого изъ ихъ долины почти всюду исчезли или встрѣчаются лишь спорадически такія формы, какъ *Scolopax major*, *Sc. gallinago*, *Anas crecca*, многіе кулики и др. Болѣе неприхотливыя курочки (*Porzana porzana*) находятъ еще мѣстами условія гнѣздованія здѣсь для себя благоприятными. Попадаютъ также по теченію этихъ рѣчекъ *Totanus glareola* и *T. hypoleucos*, изъ которыхъ второй въ довольно замѣтномъ числѣ населяетъ также степные съ глинистыми обнаженными берегами овраги, по дну которыхъ бѣгутъ ручьи.

Степной районъ, лежащій къ югу отъ теченія рѣки Алатыря и сопровождающей его лѣвобережье лѣсной области, и состоящій изъ частей Ардатоваго, Алатырскаго, Лукьяновскаго и Саранскаго уѣздовъ, въ общихъ чертахъ чрезвычайно походитъ на только что описанную нами сѣверную часть западнаго степнаго района. Мѣстами лишь эти открытыя поля прерываются сравнительно болѣе значительными, нежели въ лежащихъ къ сѣверу отъ Алатыря степяхъ, лѣсными участками; таковы, напр., удѣльные лѣсныя дачи близъ

сель Мачкасъ и Сырятна Ардатовскаго уѣзда. Въ эти лѣса заходятъ иногда медвѣди, гнѣзятся въ значительномъ числѣ тетерева и вальдшнепы и не слишкомъ давно гнѣздились еще глухари, исчезнувшіе здѣсь лишь въ послѣдніе двадцать лѣтъ. Въ нѣсколько меньшемъ по пространству участкѣ лѣсовъ близъ сель Турдаковъ и Параней глухари держались еще въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ.

Небольшія рѣчки этого района, впадающія въ Алатырь, — Нуя, Инсарь, Рудня; и въ Суру, — Большая и Малая Сарки, Чеберчинка, Штырма — въ общемъ богаче водой, чѣмъ упомянутыя мною рѣчки сѣвернаго района; болѣе обильныя водою въ видѣ болотъ и стоячихъ водоемовъ поймы ихъ заключаютъ и болѣе богатую сравнительно фауну плавающихъ и болотныхъ птицъ. Надо, впрочемъ, замѣтить, что эти рѣчки только мѣстами, а не по всему своему теченію, образуютъ поймы, мѣстами же широкіе увалы пахотныхъ полей какъ бы сдвигаются и стѣспяютъ ихъ теченіе.

Перейдемъ теперь къ долинѣ рѣки Алатыря ¹⁾. Довольно значительная рѣка эта, начинаясь въ лѣсахъ Ардатовскаго уѣзда Нижегородской губерніи, течетъ на востокъ, перерѣзывая Лукояновскій уѣздъ Нижегородской и Ардатовскій и Алатырскій уѣзды Симбирской губерніи, и впадаетъ слѣва въ рѣку Суру около города Алатыря. Очень глубокая мѣстами, рѣка перегорожена плотинами многихъ расположенныхъ по ея теченію водяныхъ мельницъ, поддерживающихъ на значительной высотѣ ея воду. Поэтому Алатырь въ общемъ богатъ водою и даже въ концѣ лѣта не представляетъ картины того мелководья — суженныхъ плесовъ, обширныхъ отмелей и т. под., — которое такъ характерно для всего теченія Суры.

На бѣльшей части протяженія Алатыря правый берегъ рѣки крутъ и возвышенъ; лѣвый берегъ, напротивъ, пред-

¹⁾ Подробнѣе о долинѣ Алатыря и фаунѣ позвоночныхъ, населяющихъ долину, см. В. Житковъ. Очерки природы средняго Поволжья. Пойма рѣки Алатыря. Естествознание и Географія, 1900, Ноябрь.

ставляет собою мѣстами довольно широкую наносную долину, понимаемую полой водой и покрытую тучными лугами. Эта пойма очень обильна стоячими водами, — озерами, мелкими лужами, образованными застаивающеюся въ котловинахъ весенней водой, и старицами, образовавшимися вслѣдствіе отступанія русла рѣки отъ наносной долины въ сторону крутого праваго берега, лѣтомъ подрываемаго слабо вслѣдствіе тихаго теченія запруженной рѣки, но въ половодье мѣстами очень сильно. Многіе изъ бассейновъ поймы — озеръ и стариць — являются проточными, или будучи соединены истоками съ Алатыремъ, или представляя собою такъ называемыя „рѣчныя озера“, — входя въ составъ теченія какой-нибудь маленькой рѣчки, пересѣкающей луга и впадающей въ озеро, чтобы выйти снова изъ другого конца его и впасть въ Алатырь.

Большинство стоячихъ водоемовъ поймы Алатыря богаты водной растительностью, которая въ нѣкоторыхъ озерахъ и старицахъ развивается съ такой силой, что вызываетъ довольно быстрое заболачиванье отдѣльныхъ частей старицы или озера. Мелкія остающіяся отъ водополя лужи, пересыхающія обыкновенно уже въ началѣ лѣта, въ маѣ бывають совершенно покрыты растущими и по берегамъ, и въ водѣ калужницами (*Caltha palustris*) и окружены по сырмъ берегамъ другими желто-цвѣтущими лютиковыми растеніями (*Trollius europaeus*, виды *Ranunculus* и др.); въ болѣе постоянныхъ водоемахъ, не слишкомъ глубокихъ, обыкновенны — одни формы у береговъ, другія и на болѣе значительной глубинѣ — *Typha*, *Scirpus*, *Rumex maritimus*, *Ceratophyllum*, многіе виды *Potamogeton*, *Acorus*, *Hydrocharis*, *Sparganium*, виды *Juncus* и др. Болѣе глубокія озера обыкновенно чисты посрединѣ, и на значительную глубину въ такихъ водоемахъ забираются только кубышки (*Nymphaea*, *Nuphar*). На нѣкоторыхъ старицахъ и озерахъ различныя злаки, осоки и камыши прибрежной зоны, ложась осевью въ воду, обра-