

Амурско-Приморский золотоносный район

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
А62

А62 Амурско-Приморский золотоносный район / – М.: Книга по Требованию,
2014. – 108 с.

ISBN 978-5-517-96541-7

ISBN 978-5-517-96541-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2014

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2014

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

ДВА ПЕРЕСЪЧЕНІЯ
СТАНОВОГО (ЯБЛОНОВАГО) ХРЕБТА.

Э. Э. Анертъ.

DEUX TRAVERSÉES
DE LA CHAÎNE DES MONTS STANOVOÏ (JABLONOVY).

Par E. Ahnert.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТРАН
Орографическій очеркъ	1
Описаніе обнаженій	8
Бассейнъ рѣки Дѣсъ	8
Рѣчка Тексиха	8
Рѣка Дѣсъ	15
Часть „Алданской“ тропы В. А. К°, пересѣкающая верховья лѣвыхъ притоковъ верхняго те- ченія рѣки Дѣсъ	16
Обнаженія вдоль „Ниманской зимней“ тропы, выше рѣчки Тексихи	24
Переваль черезъ Становой (Яблоновый) хребетъ изъ басс. Дѣса въ басс. прав. Джелинды	26
Пересѣченіе Станового хребта между верховьемъ р. Сутамъ и р. Оллоты	36
Бассейнъ рѣки Унахи	40
Ручей Оллоты	40
Отъ р. Унахи до верховья правой Дивтянгры	45
Унаха	47
Маршрутъ сѣвернѣе Станового хребта въ бассейнѣ рѣки Сутамъ	47
Лѣвая Джелинда	47
Джелиндаканъ или Малая Джелинда	51
Бассейнъ Большой Джелинды	55

	СТРАН.
Мелкіе притоки рѣки Сутамъ	61
Рѣка Сыгонда (Сынангра)	63
Перевалы черезъ водораздѣлы Сыгонды, Джени- вана и верхняго теченія Сутама .	80
Геологическій очеркъ.	84
Résumé.	91

ОРОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Обнаженія, къ описанію которыхъ мы приступаемъ, расположены вдоль маршрутовъ, пройденныхъ въ 1902 году и охватывающихъ кольцомъ пространство длиною (по діагонали отъ N къ S) до 66 верстъ и шириною (отъ O къ W) 53 версты, по срединѣ котораго остается неизслѣдованной площадь величиною до 2500 кв. верстъ. Эта площадь раздѣляется протянувшимся вдоль $55^{\circ} 36' - 40'$ сѣв. широты Становымъ (Яблоновымъ) хребтомъ на двѣ части, — крайняя точка сѣверной части лежитъ въ 30—31 в. отъ хребта, — южной въ 35—36 верстахъ отъ него. Къ этой площади съ S примыкаетъ районъ сплошныхъ изслѣдованій 2-го листа III ряда, а на ONO листъ „Алданскихъ“ присковъ. Къ югу текутъ рѣчки Дѣсь и Унаха съ ихъ притоками, принадлежащія къ бассейну Брянты; въ сѣверу отъ хребта всѣ воды собираются многочисленными ключами, ручьями и рѣчками въ Сутамъ (или Утамъ), принадлежащій къ бассейну Алдана.

Дѣсь, Тексиха, Унаха, Оллоти и нѣкоторые болѣе значительные притоки Дѣса текутъ почти въ меридіональномъ направленіи, только нижнее теченіе Тексихи и теченіе нѣкоторыхъ болѣе значительныхъ верхнихъ лѣвыхъ притоковъ

Дёса придерживаются почти широтнаго направленія. Даурка, Желинда, а также Малая и Большая Желинда текутъ въ NO; а верхняя часть Даурки и нижняя правой Желинды, также Тарынакъ и нѣкоторые другіе ручьи текутъ подь прямымъ угломъ къ этому направленію, т.-е. къ NW. Направленіе теченья верховья Сутама, Дженерикана и Сутама ниже впаденія Сыгонды — близко къ широтному; лишь Сыгонда и, должно быть, часть верхняго теченья Сутама текутъ почти въ меридіональномъ направленіи.

Такимъ образомъ въ направленіи теченья водныхъ потоковъ къ югу отъ Становика наблюдается большая правильность, чѣмъ къ сѣверу отъ него. Насколько можно судить по впечатлѣнію одного лѣта, ключи и рѣчки бассейна Алдана многоводнѣе чѣмъ бассейна Брянты, т.-е. вѣроятно на сѣверномъ склонѣ Становика выпадаетъ больше осадковъ чѣмъ на южномъ.

Къ югу отъ хребта почти вездѣ были видны слѣды бывшихъ лѣсныхъ пожаровъ, мѣстами совершенно уничтожившихъ тундровый слой, благодаря чему тамъ, гдѣ было моховое болото, появилась мѣстами рѣдкая травянистая растительность или же вочковатое болото непосредственно на разрушенной скалѣ, на сохранившихся же моховыхъ болотахъ уже почти не видно исландскаго моха, этого главнаго условія оленеводства Ороченъ. Сѣвернѣе хребта, напротивъ, нигдѣ по нашему пути не было замѣчено слѣдовъ пожаращъ, моховыя болота обширны, моховой слой образуетъ поверхъ тундроваго слоя толстый, мягкій слой, въ который погружены упавшіе деревья и сучья, что сильно затрудняетъ передвиженіе; а исландскій мохъ еще занимаетъ мѣстами обширныя площади.

Въ южной половинѣ изслѣдованнаго района всѣ почти вершины покрыты лѣсной растительностью (хотя обыкновенно и не густой), а середины долинъ часто безлѣсны (вочковатыя

болота—мари); напротивъ, въ сѣверной половинѣ въ долинахъ чаще виденъ лѣсъ и мшарникъ, а вершины и горные края почти всегда оголены и покрыты каменными россыпями или утесистыми выходами горныхъ породъ; это послѣднее обстоятельство дѣлаетъ „Алданскій“ районъ гораздо болѣе удобнымъ для геологическихъ изслѣдованій, въ смыслѣ продуктивности этихъ работъ, чѣмъ Дѣсь-Унахинскій, гдѣ хорошіе выходы породъ случайность, исключая береговъ главныхъ рѣчекъ. Рельефъ страны къ сѣверу отъ Яблоноваго (Становаго) хребта также имѣетъ иной характеръ, чѣмъ къ югу отъ него. Хребетъ имѣетъ весьма крутой, короткій южный склонъ и часто пологій, также короткій сѣверный. Хребетъ протянулся не по прямой, а по волнистой линіи между параллелями $55^{\circ} 34'$ и $55^{\circ} 43'$ сѣверной широты. Къ югу отъ хребта верховья рѣчекъ текутъ на небольшомъ протяженіи въ очень глубокихъ узкихъ ущельяхъ (Бранта на протяженіи около 14 верстъ, Малый Дѣсь—8 в., Дѣсь должно быть—12 в., Олоти—около 18 в.); затѣмъ, эти рѣчки выходятъ въ пологохолмистую полосу, съ отдѣльными болѣе высокими вершинами, среди которой спокойно текутъ въ широкихъ, довольно прямыхъ долинахъ; наконецъ, уже въ предѣлахъ площади, святой сплошной съемкою (черезъ 30—25 верстъ), вступаютъ въ полосу съ болѣе узкими и глубокими долинами, бѣльшаго наденія.

Къ сѣверу отъ хребта такой правильности въ смѣнѣ полосъ рельефа разнаго характера не замѣтно. Въ сѣверной части изслѣдованнаго района нѣтъ полосы глубокихъ ущелій, хотя мѣстами, какъ около хребта, такъ и вдали отъ него, такія ущелья наблюдаются; здѣсь по Джелиндѣ, также должно быть по Малой и Большой Джелиндѣ горная страна простирается на 25—30 верстъ къ сѣверу отъ хребта; къ сѣверу же отъ хребта по пути съ Сыгонды къ верховью Олоти

встрѣчена только узкая горная полоса (10—12 в.) въ верхней половинѣ бассейна Сыгонды, а затѣмъ высокое плато съ продольными долинами Дженеривана и верховья Сутама. Сѣвернѣе только что описанной полосы, отъ нея до Сутама и на небольшомъ пространствѣ за этимъ послѣднимъ наблюдаются высоты, хотя часто и значительныя, но съ болѣе пологими склонами, и болѣе широкія и прямыя долины; далѣе же къ сѣверу опять всюду видны горы съ болѣе или менѣе рѣзкими профилями.

Независимо отъ этого характера мѣстности для „Алданскихъ“ пикетовъ характерны отдѣльныя гольцовыя группы или одинокіе гольцы, значительно возвышающіеся надъ всей страной и надъ прочими горами и часто обладающіе весьма красивыми рѣзкими формами. Эти гольцы показаны на нашей картѣ.

Самъ же Яблоновый хребетъ, на болѣе части своего протяженія между 126° и 128° восточной долготы,—гольцовый, причемъ въ гребнѣ его болѣе высокія и болѣе пониженныя вершины смѣняются безъ особенно рѣзкихъ переходовъ; вершины по болѣе части не заостренныя, а куполообразной формы. По распроснымъ свѣдѣніямъ, хребетъ между верховьями Лѣвой Джелинды и Тексики сильно пониженъ и представляетъ болотистую равнину съ озерками; въ этой части приурочены отдѣльные гольцы — Кучума и Чурика.

Въ заключеніе настоящаго очерка разсмотримъ подробнѣе паденіе рѣчекъ, а также разность высотъ къ сѣверу и къ югу отъ Становика. Мы имѣемъ только возможность сдѣлать этотъ обзоръ по маршруту вдоль „Алданской“ тропы, т. е. по Дѣсу и правой Джелиндѣ, такъ какъ только для этого маршрута имѣется инструментальная съемка (2 вер. въ $1''$, горизонтали черезъ 10 саж.). При внимательной провѣркѣ горизонталей карты пришлось замѣтить, что количество ихъ

Сравнительная таблица уклоновъ долинъ по объ (593 саж.) ¹⁾.

№ № ²⁾ точекъ	Названія примѣчательныхъ точекъ и характеръ долинъ.	Повышеніе мѣстности междуособо примѣчательными точками въ саж. на 1 в.	По въ с на точки и про стн	№ № точекъ
БАССЕЙНЪ ДѢСА.				
0		113,00 с.		0
1			11	2
3		30,00 с.	7	4
5			5	6
7	Ключъ впадаетъ въ Мал. Дѣсъ.	8,33 с.	4	8
11			Зпія дн.	10
13			2	
15	Мало-Дѣсское зимовье.			12
17		3,46 с.		14
19	Впаденіе М. Дѣса въ Дѣсъ.		1	16
21			1	18
23	Устье Туголана		1	
25		0,91 с.		20
27	Устье Дальбирги	1,54 с.		22
				24
29		1,00 с.	е-	26
31	Устье Тевсихи.			28
33	Граница Л. III—2	2,60 с.	ро-	30
				32
35		0,50 с.		34

¹⁾ Отмѣтки высотъ бассейна Джелинды въ нашемъ
²⁾ Точки въ долинѣ Дѣса обозначаютъ печетными