

Спасский В.Н.

**Вишня, разведение и уход за
ней, сбор, употребление и
хранение ягод**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
В11

В11 **В.Н. С.**
Вишня, разведение и уход за ней, сбор, употребление и хранение ягод /
Спасский В.Н. – М.: Книга по Требованию, 2025. – 36 с.

ISBN 978-5-519-75057-8

ISBN 978-5-519-75057-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

I. Вишня, ея виды и сорта для сѣверной и средней Россіи.

Послѣ яблони вишня наиболѣе распространенное плодовое дерево. Вишни встрѣчаются почти въ каждомъ саду. Границы разведенія вишни не только совпадаютъ съ границами распространенія яблони, но на сѣверѣ ее можно найти даже тамъ, гдѣ яблоню уже не разводятъ (Рис. 1).

Въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ изъ видовъ вишенъ наиболѣе извѣстны: кислая, сладкая и дикая или кустовая.

Вишня кислая или обыкновенная (*Prunus Cerasus* h.) растетъ у насъ очень хорошо на рыхлыхъ, суховатыхъ почвахъ и на возвышенныхъ мѣстахъ. Она составляетъ почти единственное плодовое растеніе, которое почти безъ всякаго ухода даетъ плоды въ крестьянскихъ садахъ. Тамъ-же, гдѣ за ней внимательно ухаживаютъ, она отплачиваетъ прекрасными плодами и ихъ урожаями. Эта вишня растетъ невысокимъ деревомъ; листья ея продолговато-овальные, зазубренные съ переди, и съ зади заостренные, голые, гладкіе, нѣсколько кожистые, съ лоскомъ; цвѣты бѣлые, распускаются въ апрѣлѣ и въ маѣ; плоды круглые, черные или темнокрасные, созрѣваютъ въ іюлѣ и имѣютъ пріятный сладко-кислый вкусъ; косточки въ плодахъ круглыя, твердыя и со-

храняють всхожесть только одинъ годъ и то въ томъ случаѣ, если сберегаются въ сыромъ пескѣ. Сучья распростертыя, нѣсколько повислые; молодые побѣги выбѣгаютъ въ лѣто отъ полутора до трехъ вершковъ. Бу-



Рис. 1.
Цвѣты и
плоды
вишни.

дучи нѣжны и гибки, они обвисаютъ, какъ у плакучей ивы или березы, сгибая нѣсколько и самые сучья.

Изъ этого вида наибаче разводится, считаясь лучшимъ сортомъ, вишня владимірская, называемая также вязниковской. Владимірская вишня вынослива къ морозамъ, особенно на легкой почвѣ, и плодородна. Плоды ея небольшіе, вкусные, годные на всякое употребленіе.

Во владимірскихъ садахъ издавна выведенъ другой сортъ вишни—родителевой

или муромской, одинаково выносливый и плодородный, но дающій болѣе крупные и лучшіе по качеству плоды. Родителя вишня рѣдко вырастаетъ деревомъ и во владимірскихъ садахъ чаще встрѣчается кустами изъ нѣсколькихъ тонкихъ отдѣльныхъ стволовъ, которые на видъ нѣжнѣе и свѣжѣе всѣхъ прочихъ вишенъ. Молодые побѣги этой вишни длинны и гибки, причемъ кора ихъ усажена рѣдкими чечевичками, буроватаго цвѣта, а на не молодыхъ желтовато-бурая, лоснящаяся. Листья сверху желтовато-зеленые, снизу блѣдно-зеленые, сидятъ рѣдко на широкихъ и мясистыхъ ножкахъ. Плодъ крупный, мясистый, сочный, черный, съ двухъ противоположныхъ боковъ сплюснутый; но ко времени полного созрѣванія, къ половинѣ іюля, насв. Владимира, дѣлается круглымъ, причемъ поперечникъ его отъ вершины къ ножкѣ короче поперечника отъ одного бока къ другому; сидитъ на короткой ножкѣ слабо; вкусъ сладкій, слегка кисловатый, съ пріятнымъ запахомъ. Это растеніе даетъ столько корневыхъ отпрысковъ, что отъ 100 его кустовъ въ 4 года можно развести садъ на цѣлой десятинѣ. У составителя этой книжки въ г. Орлѣ были посажены двѣ вишни въ палисадникѣ. Черезъ нѣсколько лѣтъ у сосѣда, по другую сторону изгороди, на пустырѣ появилась вишня и настолько раз-

множилась, что образовала чашу. Родителева вишня даетъ урожай плодовъ съ 10 до 30 лѣтъ. Средній сборъ вишенъ съ десятины около 100 пудовъ, а высшій доходитъ до 200 пудовъ.

Третій извѣстный владимірскій сортъ— вишня левинская растетъ шаровиднымъ высокимъ деревомъ; листья свѣтло-зеленые; кора бѣлесоватая; плодъ крупный, мясистый, сочный, красноватый, съ легкой кислотой, на одномъ боку съ лункой, а на другомъ съ брюшкомъ, къ вѣткѣ расширенный, отъ вершины яйцевидно-заостренный, округленный, продолговатый, вообще болѣе длинный, чѣмъ широкій, виситъ на длинной вѣткѣ; общіе черешки, на которыхъ висятъ плоды съ вѣтками, выбѣгаютъ близко одинъ отъ другого, чаще на концѣ прошлогоднихъ вѣтокъ, при основаніи новыхъ побѣговъ, отчего вишни свисаютъ, наклоняя съ собою вѣтвь, образуя красивыя грозди. Левинскія вишни поспѣваютъ къ 20 іюля, очень увѣсисты, плодовые и выносливы. Плодоношеніе продолжается съ 20 до 40 лѣтъ.

Сладкая вишня или птичья черешня (*Prunus avium* h.) Изъ сладкихъ вишенъ въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ наиболѣе разводятъ сортъ, называемый в а с и л ь е в с к о й вишней, но по чувствительности къ климатическимъ невздамъ встрѣчается рѣдко. Плоды отличаются сладкимъ вку-

сомъ, душисты и нѣжны, тающіе во рту, но плохо переносятъ перевозку на дальнее разстояніе, отчего мало извѣстны на рынкахъ. Сладкая вишня чаще служитъ украшеніемъ садовъ богатыхъ любителей.

Вишня кустовая дикая (*Prunus chamaecerasum* h.). Ростъ кустарниковый, высотой отъ полутора до пяти аршинъ. Листья обратно-яйцевидные, продолговато-заостренные, тупо и мелко-зубчатые, голые, сине-зеленые, лоснящіеся. Вѣтви слабыя, тонкія, отчасти свѣшивающіяся, съ корою пепельнаго цвѣта. Цвѣты бѣлые, въ зонтичныхъ кистяхъ, распускаются въ апрѣлѣ и маѣ. Плоды мелкіе, круглые, красные, кислые. Эта вишня представляетъ одинъ изъ надежнѣйшихъ кустарниковъ для сухихъ, возвышенныхъ мѣстностей. Изъ разводимыхъ сортовъ этой вишни извѣстны: скороспѣлка красная, съ плодами темнокрасными, довольно крупными, но кислыми; разводится на солнечномъ припекѣ и созрѣваетъ ранѣе прочихъ вишенъ, напримѣръ, во владимірскихъ садахъ — въ началѣ іюля. Скороспѣлка бѣлая, съ плодами изъ-бѣла-красными, нѣсколько мельче, чѣмъ у предыдущаго сорта; листья блѣдные, курчавые, часто сидящіе, отчего все растеніе кажется курчавымъ.

Плоды обѣихъ скороспѣлокъ, особенно бѣлой, долѣе и лучше другихъ вишенъ со-

храняются свѣжими, чѣмъ и заслуживаютъ вниманіе хозяевъ, хотя цѣнятся на рынкахъ дешевле другихъ сортовъ. Урожайность постоянная и обильная.

II. Условія разведенія.

Вишни въ садахъ образуютъ купы изъ маленькихъ деревьевъ или кустовъ. Это отъ того, что вблизи растущихъ вишенъ появляется множество отпрысковъ различной вышины, а вдали отъ нихъ появляются всходы отъ случайно упавшихъ или склеванныхъ птицами плодовъ и косточекъ. На почву вишня неприхотлива, особенно кислая. Но наиболѣе пригодными почвами для нея будутъ суглинистыя, не очень плотныя, супесчаныя и черноземныя на подпочвахъ изъ мергелистыхъ глинъ. Кислыя вишни переносятъ самые большіе морозы, лишь бы только морозы не были во время цвѣтенія. Сладкія вишни требуютъ болѣе лучшихъ почвъ — глубоко разрыхленныхъ и плодородныхъ. Онѣ чувствительны также къ морозамъ и не переносятъ безъ защиты болѣе 15 градусовъ. Въ среднихъ губерніяхъ вишневые сады могутъ съ выгодой расти на южныхъ, западныхъ и юго-западныхъ покатостяхъ и тѣмъ самымъ предупредить на склонахъ образованіе овраговъ. На южномъ склонѣ они страдаютъ отъ засухи. При раннемъ цвѣтеніи отъ весеннихъ заморозковъ

погибаетъ урожай, а кора растрескивается, если ее не смазывать известковымъ молокомъ. На южныхъ же склонахъ для вишневыхъ садовъ особенно вредны рѣзкіе переходы отъ ночного холода къ полуденному зною. Поэтому для нихъ наиболѣе пригодны склоны юго-западные; а съ востока, сѣверо-востока и сѣвера нужна защита отъ холодовъ.—Съ юга, юго-запада и запада вишневый садъ въ свою очередь можетъ служить защитнымъ насажденіемъ для садовъ яблоневыхъ и грушевыхъ отъ знойныхъ вѣтровъ.

III. Разведеніе вишенъ постѣвомъ.

Размножаются вишни сѣменами, корневыми отпрысками и прививкою.

Сѣянцы часто даютъ хорошіе плоды, очень сходные съ плодами материнскаго дерева и на подходящей почвѣ быстро вырастаютъ въ очень хорошія плодовые деревья. Обыкновенно же простые любители садоводства вишневые сады разводятъ корневыми отпрысками, которые при благоприятныхъ условіяхъ скоро принимаются и рано даютъ плоды, ничѣмъ не уступающіе по качеству материнскимъ. Въ болѣе хорошо поставленныхъ промышленныхъ вишневыхъ садахъ для полученія лучшихъ по качествамъ плодовъ производятъ прививку къ дичкамъ. При разведеніи вишневыхъ са-

довъ посѣвомъ, для полученія простыхъ саженцевъ, собираются косточки отъ употребленныхъ въ пищу плодовъ. Косточекъ можно такъ получить вполне достаточное количество, чтобы ими производить и значительные по обширности посѣвы. Въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ отбираютъ для этого вишни, негодныя для домашняго употребленія: червивыя, гнилыя и нечистыя, если не хватаетъ хорошихъ ягодъ. Владимірскіе садоводы поступаютъ не рѣдко и такъ: кладутъ вишни въ кадочку, толкутъ ихъ и даютъ мякоти гнить. Потомъ къ забродившей гнилой кашицѣ приливаютъ воду и мѣшаютъ, отъ чего косточки отдѣляются отъ мякоти и осѣдаютъ на дно. Затѣмъ ихъ промываютъ и высушиваютъ въ тѣни на открытомъ сухомъ воздухѣ, сыпаютъ въ ящики или кожаные мѣшки, въ которыхъ и сохраняютъ до употребленія. Если посѣвъ производится для полученія не привитыхъ саженцевъ, то слѣдуетъ на сѣмена выбирать лучшіе плоды изъ ранѣ вызрѣвшихъ, а не брать какіе попало.

Косточки вишенъ высѣваются весною или осенью. При весеннемъ посѣвѣ сѣмена вишенъ легко проростаютъ, если ихъ сохранять зимою такъ, какъ будетъ указано ниже. Помѣщенные въ кожаные мѣшки косточки зарываютъ на полъаршина въ землю, или же кладутъ ихъ

въ горшокъ или ящикъ съ землею или сырымъ пескомъ. Въ послѣднемъ случаѣ внизъ, на дно посуды, насыпаютъ земли или песку; затѣмъ кладутъ слой косточекъ въ вершокъ и снова насыпаютъ земли, на нее опять слой косточекъ и такъ далѣе, пока посуда не наполнится. Наконецъ, сверху послѣдній слой косточекъ покрываютъ землей; и зарываютъ въ землю въ саду или близъ дома, гдѣ удобнѣе. Сохраненіе такимъ способомъ вишневыхъ косточекъ въ землѣ необходимо для того, чтобы удержатъ влагу въ ядрахъ косточекъ. Въ сухомъ же мѣстѣ влага изъ ядра испаряется, оно сморщивается, дѣлается жесткимъ, сухимъ и мало способнымъ къ проростанію.

Весною, какъ только сойдетъ снѣгъ и отойдетъ земля, гряды готовятъ для посѣва, удобряются и перекапываются, а потомъ вскорѣ и засѣваются. Для удобренія свѣжаго навоза употреблять не слѣдуетъ, а лучше старый, да и тотъ за годъ или за два до посѣва.

Для осенняго посѣва косточки, ради предохраненія ихъ отъ вымерзанія, предварительно намачиваютъ въ прѣсномъ молокѣ или медовой сытѣ. При этомъ изъ молока на поверхность косточекъ осаждаются сливки, которыя и защищаютъ ихъ отъ замерзанія. Нѣчто подобное дѣлается и отъ сыты. На зиму осенній посѣвъ прикрываютъ на-

возомъ или ельникомъ, которые съ наступленіемъ весны бережно убираютъ. Осенніе посѣвы имѣютъ то преимущество, что сѣмяна весной всходятъ раньше и къ слѣдующей зимѣ вырастаютъ уже деревцами до 4 вершковъ вышины. Иногда осенній посѣвъ косточекъ прикрывается на грядахъ соломой, а сверхъ ея досками. И этотъ способъ посѣва даетъ весною хорошіе и ранніе всходы.

При выборѣ мѣста подъ сѣянцы вишни наблюдается, чтобы оно не было сырымъ, низменнымъ или вблизи воды. На такихъ мѣстахъ молодая деревца вырастаютъ, какъ говорятъ, слишкомъ водянистыми и легко вымерзаютъ.

Длина грядъ можетъ быть по усмотрѣнію или по мѣстнымъ условіямъ различна, но ширину ихъ для болѣе удобнаго ухода лучше дѣлать въ 1 аршинъ. Высоту грядъ слѣдуетъ дѣлать въ зависимости отъ мѣстоположенія: чѣмъ суше оно, тѣмъ высота ниже, а на сухихъ мѣстахъ гряды и совсѣмъ не слѣдуетъ поднимать надъ общею поверхностью обработанной почвы; на сырыхъ же почвахъ гряды поднимаются отъ четверти до полуаршина въ вышину.

Лучшій способъ посѣва рядовой,—въ бороздки, проведенныя поперекъ грядъ. Бороздки эти проводятся на разстояніи 5 вершковъ другъ отъ друга глубиною въ вер-