

Георгий Николаевич Шульгин

**Розы, годные для содержания в
комнатах, и их культура**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
Ш95

Ш95 **Шульгин Г.**
Розы, годные для содержания в комнатах, и их культура / Георгий Николаевич Шульгин –
М.: Книга по Требованию, 2023. – 118 с.

ISBN 978-5-521-38705-2

ISBN 978-5-521-38705-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Предисловіе	VII
I. Части и органы розы	1
II. Классификація розъ	4
III. Условія комнатной культуры розъ	9
IV. Размноженіе розъ отводками	30
V. Подрѣзка розъ	32
VI. Враги розъ	44
VII. Антипаразитныя жидкости	53
Списокъ нѣкоторыхъ изъ лучшихъ розъ, пригодныхъ для содержанія въ комнатахъ:	
I. Розы мѣсячныя или бенгальскія	59
II. Чайныя розы	62
III. Розы чайныя—гибриды	77
IV. Розы бурбонскія	90
V. Розы бурбонскія гибриднаыя	96
VI. Розы нуазеттныя	—
VII. Розы нуазеттныя—гибриды	99
VIII. Розы поліантовыя	101
IX. Розы поліантовыя ползучія	106

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Литература о розахъ и ихъ культурѣ весьма богата, особенно на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Имѣется даже специальное повременное изданіе, посвященное розамъ, это—„Deutsche Rosenzeitung“. На русскомъ языкѣ можно отмѣтить четыре специальныхъ сочиненія по культурѣ розъ, а именно: И. А. Штегмана—„Практическое руководство къ культурѣ розъ“, Н. И. Кичунова—„Культура розы въ открытомъ грунту и подъ стекломъ“, Андресена—„Культура розъ“ и д-ра Н. В. Рунова—„Руководство къ культурѣ розана“. Кромѣ того, у насъ можно найти болѣе или менѣе обстоятельныя статьи, посвященныя этому чудному растенію въ такихъ журналахъ, какъ „Вѣстникъ Садоводства“ и „Садъ и Огородъ“, а равно и въ извѣстномъ трудѣ Р. И. Шредера—„Русскій огородъ, питомникъ и плодовый садъ“. Но всѣ вышеупомянутыя сочиненія и статьи трактуютъ исключительно о культурѣ розъ въ открытомъ грунту и о выгонкѣ ихъ въ оранжереяхъ; о содержаніи же ихъ въ комнатахъ въ этихъ сочиненіяхъ ничего не говорится. Правда, объ этомъ послѣднемъ трактуется, и подчасъ даже довольно пространно, въ специальныхъ руководствахъ по комнатному

цвѣтоводству; но, къ сожалѣнію, даже въ лучшихъ изъ нихъ, какъ Г. А. Яценко („Растенія для жилыхъ комнатъ и уходъ за ними“. Изд. 1892 г., стр. 233—247), или приводятся невѣрные основныя положенія по культурѣ розъ въ комнатахъ, или многое существенное, какъ, напримѣръ; обрѣзка, черенкованіе и т. п., изложено неполно, неясно, или совсѣмъ выпущено.

Все вышеприведенное подало мнѣ мысль настоящей брошюрой, по возможности, пополнить этотъ досадный пробѣлъ въ садовой литературѣ. Весьма возможно, что мнѣ далеко не удалось разрѣшить эту задачу; не мнѣ объ этомъ судить, но я буду радъ даже и въ томъ случаѣ, если моя брошюра дастъ поводъ людямъ, болѣе опытнымъ, чѣмъ я, въ дѣлѣ содержанія розъ въ комнатахъ, а потому и болѣе компетентнымъ, выступить со своими трудами по интересующему всѣхъ любителей комнатнаго цвѣтоводства вопросу—вопросу о содержаніи розъ въ комнатахъ, и тѣмъ исправить мои ошибки, а главное—существенно пополнить пробѣлъ въ литературѣ по комнатному цвѣтоводству.

Г. Шульгинъ.

I.

Части и органы розы.

Извѣстный ученый систематикъ растений, д-ръ Вармингъ, подраздѣляетъ семейство Rosaceae—розовыхъ—на пять группъ, одна изъ которыхъ, а именно Roseae—розъ, обращаетъ на себя особенное вниманіе, такъ какъ содержитъ въ себѣ растенія, въ большинствѣ случаевъ выдѣляющіяся по красотѣ своего цвѣтенія.

Я не стану здѣсь описывать отличительныхъ ботаническихъ признаковъ этой группы, такъ какъ растенія, къ ней принадлежащія, очень хорошо извѣстны всѣмъ, но я считаю вполне цѣлесообразнымъ остановиться здѣсь на описаніи нѣкоторыхъ ихъ частей и органовъ, а также на классификаціи самихъ розъ встрѣчающихся въ садахъ. Первое послужитъ для ознакомленія читателя съ тѣми названіями частей и органовъ розъ, которыя мною будутъ иногда приводиться въ настоящей статьѣ, а вторая можетъ служить весьма цѣннымъ руководствомъ при выборѣ розъ для содержанія въ комнатахъ.

Итакъ, начну съ описанія нѣкоторыхъ частей и органовъ розъ.

Всѣ розы, по характеру своего роста,—кустарники (рис. 1), а потому ствола у нихъ не бываетъ, но отъ земли, какъ и у другихъ кустарныхъ растеній, идутъ вверхъ прямые, иногда сразу развѣтвленные *побѣги* или *вѣтви*; у нѣкоторыхъ же видовъ идутъ еще кор-

необразные подземные побѣги, которые на нѣкоторомъ разстояніи отъ материнскаго растенія пробиваются вверхъ надъ землею въ видѣ новаго растенія, чѣмъ и обусловливаютъ разрастаніе куста. Такіе подземные побѣги называ-



Рис. 1. Кустъ розана европейской группы съ главными вѣтвями: а—молодая древесная вѣтвь, б—маточная вѣтвь, в—первичная цвѣтоносная вѣтвь, г—вторичная, д—холостая и е—отпрыскъ (по Н. В. Рунову).

ются *отпрысками* (рис. 1 е). Та часть растенія, гдѣ корень отдѣляется отъ надземной его части, называется *корневой шейкой*. Отъ нея внизъ идетъ плотный, болѣе или менѣе толстый, всегда развѣтвленный корень, на концахъ этихъ развѣтвлений переходящій въ многочисленныя тонкія, нитевидныя мочки. Вверхъ отъ этой корневой шейки отдѣляются побѣги, а въ стороны, у нѣкоторыхъ видовъ,—отпрыски.

Побѣгъ или вѣтвь, несущая на себѣ цвѣты или молодыя вѣтви, называется *маточною вѣтвью* (рис. 1 б), а молодой побѣгъ, идущій отъ корневой шейки или отъ основанія маточной вѣтви, носить на-

званіе *молодой древесной вѣтви* (рис. 1 а). Эти послѣднія всегда бывають, соотвѣтственно данному виду и его возрасту, у здороваго растенія болѣе или менѣе плотныя и длинныя. У нѣкоторыхъ видовъ онѣ на своемъ концѣ несутъ цвѣты и, слѣдовательно, цвѣтутъ въ первое же лѣто. У другихъ же видовъ этого явленія не бываетъ; у нихъ молодая древесная вѣтвь къ осени дозрѣваетъ и, если перезимуетъ, получаетъ названіе *вызрѣвшей древесной вѣтви*. У этихъ видовъ только на такой, перезимовавшей вѣтви появляются боковыя вѣтви съ цвѣтками. Съ появленіемъ боковыхъ вѣтвей, вызрѣвшая древесная вѣтвь пріобрѣтаетъ названіе *маточной вѣтви*. Боковая или непосредственно на себѣ несущая цвѣты вѣтвь называется вообще *цвѣтоносною*; но къ этому названію прибавляется еще другое—*первичная* (рис. 1 в), если, по отцвѣтеніи ея, на ней появится новая цвѣтоносная вѣтвь, получающая названіе *вторичной* или *ремонтантной цвѣтоносной вѣтви* (рис. 1 г). Это бываетъ обыкновенно у *ремонтантныхъ* розъ, т.-е. цвѣтущихъ въ теченіе лѣта болѣе одного раза. Такая же боковая вѣтвь, которая не несетъ на себѣ цвѣтовъ, называется *холостою* (рис. 1 д).

На каждой вѣтви, въ пазухѣ листа, т.-е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ послѣдній прикрѣпленъ къ вѣтви, всегда формируется небольшой бугорокъ, который есть не что иное, какъ почка, называемая обыкновенно *глазкомъ*. Эти глазки у однихъ видовъ розъ бывають *чешуйчатыми*, т.-е. ясно покрытые отдѣльными чешуйками, представляющими изъ себя не что иное, какъ недоразвитые листочки, у другихъ же эти глазки совершенно гладкіе—чешуекъ у нихъ не замѣтно, но они покрыты сплошною кожицею. Изъ глазковъ въ послѣдствіи обыкновенно выходятъ вѣтви. Если глазокъ ши-

рокій и закругленно-выпуклый, то можно разсчитывать, что, при нормальныхъ условіяхъ, изъ него выйдетъ *цвѣтоносная вѣтвь*; если же онъ не широкій, маленький и заостренный, то почти навѣрно онъ дастъ *холостую вѣтвь*. Кромѣ того, въ углахъ листьевъ, расположенныхъ въ нижней части вѣтвей и вблизи ея основанія, можно разглядѣть едва замѣтныя выпуклости, а иногда только рубчики отъ опавшихъ листьевъ или чешуекъ; это—плохо развитыя глазки, называемыя *скрытыми*. При нѣкоторыхъ условіяхъ и изъ нихъ могутъ развиться вѣтви, но обыкновенно или холостыя (у основанія первичныхъ цвѣтоносныхъ вѣтвей), или молодая древесная (при короткой рѣзкѣ *) маточной вѣтви).

Та конечная часть вѣтки, которая не имѣетъ ни листьевъ, ни глазковъ, но которая несетъ на своемъ концѣ цвѣтокъ, называется *цвѣтоножкой*. У однихъ видовъ розъ эта цвѣтоножка незамѣтно сливается съ вѣткою, ее несущею, у другихъ же—мѣсто соединенія ясно видно, и у такихъ видовъ, по отцвѣтеніи, часто случается, что въ этомъ мѣстѣ цвѣтоножка отдѣляется отъ несущаго ее стебля и отпадаетъ. Это мѣсто соединенія называется *сочлененіемъ*.

II.

Классификація розъ.

Нѣмецкій классификаторъ розъ, Нитнеръ (Th. Nietner. „Die Rose, ihre Geschichte, Arten, Kultur und Verwendung etc.“), всѣ виды розъ подраздѣляетъ на 8 группъ, французскій же—Форней (E. Forney) дѣлитъ ихъ только на три группы. Принимая въ соображеніе

*) Что называется короткой рѣзкою—будетъ объяснено ниже, въ главѣ о подрѣзкѣ розъ.

тѣ особенности каждаго вида, которыя являются результатомъ вліянія климата ихъ родины, онъ составляетъ первыя двѣ группы: 1) *европейскую*, къ которой причисляетъ розы, произрастающія въ умѣренномъ и умѣренно-жаркомъ климатѣ, и 2) *индійскую*, къ которой имъ отнесены розы тропическаго климата; въ третью же группу онъ отнесъ исключительно вьющіяся или ползучія розы, какъ рѣзко отличающіяся отъ другихъ видовъ характеромъ своего роста. Есть, наконецъ, авторы руководствъ по культурѣ розъ, которые дѣлятъ послѣднія по степени выносливости въ отношеніи холода на шесть группъ *). Но для опредѣленія условій культуры розъ, въ особенности комнатной, правильнѣе будетъ ограничиться подраздѣленіемъ всѣхъ видовъ розъ только на двѣ группы—европейскую и индійскую, какъ это дѣлаетъ д-ръ Н. В. Руновъ въ своемъ „Руководствѣ къ культурѣ розана“ (Спб. 1899 г., стр. 15), измѣняя систему классификаціи Форнея тѣмъ, что розы, выдѣляемые послѣднимъ въ третью группу—группу вьющихся или ползучихъ розъ, онъ, по мѣсту ихъ происхожденія, относитъ или къ первой, или ко второй группѣ.

Въ виду вышеприведеннаго перваго принципа Форнея раздѣленія розъ по группамъ, т.-е. группированія ихъ въ зависимости отъ тѣхъ особенностей, которыя образовались подъ вліяніемъ климата ихъ родины, эти двѣ группы составятся слѣдующимъ образомъ:

I. Европейская группа будетъ заключать въ себѣ такіе отдѣлы, какъ 1) шиповники, 2) бедренцовыя, 3) желтыя

*) Н. И. Кичуновъ. „Культура розы въ открытомъ грунтѣ и подъ стекломъ“. Спб. 1895 г., стр. 62. Впрочемъ, въ началѣ своего сочиненія (стр. 1—25), авторъ придерживается системы Нитнера.

капуцинскія (lutea, Persians Jellow, punicea, sulfurea), 4) французскія (центифольныя, миниатюрныя—Province rompon, моховыя, провансальскія — Gallica - Province, франкфуртскія, дамаскскія, портландскія и монатскія), 5) вьющіяся (arvensis, айрширскія, мускусныя, semper-virens, multiflora или polyantha (не всѣ разновидности ползучія), Brunonii, Boursaultii, Setigera и abyssinica), 6) гибриды не ремонтирующіе, происшедшіе отъ перекрестнаго опыленія съ одной стороны французской — gallica, центифольной и другихъ видовъ европейской группы, а съ другой—бурбонской и нуазетной. Къ этой же европейской группѣ должны быть отнесены и такія розы, какъ *Rosa platyacantha* Schrenk., встрѣчающаяся въ средней Азіи и на Алтаѣ.

II. Индійская группа составитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ розъ: 1) чайныхъ—*Rosa indica odoratissima* Swt. (синонимы: *R. indica fragrans* Red. и *R. thea* hort.), 2) бурбонскихъ—*R. indica burbonica* Red., 3) бенгальскихъ—*R. indica semperflorens* Curt. (син.: *R. bengalensis* Pers., *R. semperflorens carnea* или *R. semp. pallida* Rössig) или мѣсячныхъ розъ, 4) нуазетныхъ—*R. indica Noisetteana* (син.: *R. paniculata*), 5) лилипутовыхъ—*R. indica Lawrenceana* hort. (син.: *R. minima* Curt. и *R. indica minor*), 6) вьющихся: а) банковыхъ—*R. Banksiae* R. Brw., б) *R. microcarpa* Lindl., в) *R. sinica* Murr. (син.: *R. laevigata* Mchx., *R. ternata* Poir. и *R. nivea* D. C.) и г) *R. Macartnea* Dum. (син.: *R. bracteata* Wendl.) и 7) изъ гибридовъ: чайныхъ, бурбонскихъ, бенгальскихъ и нуазетовыхъ.

Эти двѣ группы розъ весьма значительно отличаются одна отъ другой. Уже одно географическое положеніе мѣстъ родины основныхъ отдѣловъ каждой группы должно вызвать у насъ представленіе о раз-