

Рытов Михаил Васильевич

**Обрезка плодовых деревьев и
ягодных кустарников: Когда
и как производить их обрезку
и формирование**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
М69

М69 **Михаил Васильевич Р.**
Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников: Когда и как производить их обрезку и формирование / Рытов Михаил Васильевич – М.: Книга по Требованию, 2022. – 104 с.

ISBN 978-5-519-84223-5

ISBN 978-5-519-84223-5

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Обрѣзка плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ.

Начальная стадія плодоваго растенія для его формировапія. Первообразомъ для всякой формировки плодовыхъ деревцовъ служить однолѣтка, съ которою мы должны ознакомиться возможно подробнѣе, такъ какъ формовка и дальнѣйшій ростъ зависятъ, кромѣ свойствъ сорта однолѣтки, отъ разныхъ способовъ ея выращиванія. О свойствахъ сорта мы будемъ говорить позже, а здѣсь прежде всего рассмотримъ качества однолѣтокъ въ зависимости отъ способовъ ихъ культуры.

Раздѣленіе однолѣтокъ по способамъ ихъ выращиванія.
Посѣвныя однолѣтки. Однолѣтніе сѣянцы выращиваются изъ сѣмянъ и косточекъ плодовыхъ растеній съ цѣлью полученія новыхъ сортовъ, наиболѣе пригодныхъ для извѣстной мѣстности, а также съ цѣлью размноженія константныхъ при посѣвѣ сортовъ; первымъ дѣломъ болѣе занимаются разные оригинаторы, вторымъ народъ.

Это выращиваніе дѣлается точно такъ же, какъ и дичковъ, и мы о немъ распространяться не будемъ; отмѣтимъ лишь то, что сѣменные однолѣтки, выращенныя въ плодовой школѣ, требуютъ пересадки ихъ въ питомникъ, вслѣдствіе чего ихъ корневая система и послѣдующій ростъ могутъ страдать до потери цѣлаго года. Поэтому, выгоднѣе въ такомъ случаѣ дѣлать посѣвъ широкими рядами не въ плодовой школѣ, а прямо въ питомникѣ, выбравъ для этой цѣли куртину съ хорошею почвою, или хорошенъко удобривши почву компостомъ, перепрѣлымъ навозомъ, употребляя также жидкое удобреніе или поливку растворомъ чилийской селитры. Посѣвъ необходимо дѣлать гуще, чѣмъ разстояніе въ ряду между будущими деревцами, съ тѣмъ, чтобы потомъ болѣе худшія однолѣтки или двулѣтки высадить на другія куртины для прививки.

Для выбора посѣвныхъ сортовъ вообще руководствуются различными признаками, но для выращиванія хорошихъ однолѣтокъ наиболѣе важенъ только одинъ признакъ — сила роста деревьевъ, которая отразится и на ростѣ однолѣтокъ. Наибольшую силу роста изъ яблонь отличаются: апортъ шло

пакъ, осенняя полосатка, бѣлый наливъ, розовое, бѣлое сладкое, сѣверные кальвилы (бѣлый и красный—лѣтніе), изъ грушъ: фунтовая, изъ сливъ: Герцогъ Эдинбургскій, изъ вишенъ—лотовая морель и всякія древовидныя вишни, также черешни. Однако, въ нѣкоторыхъ случаяхъ слабый ростъ соединяется съ полезными свойствами сорта (апортъ гетмановка, разные ренеты), и въ такомъ случаѣ необходимо особенно хорошо улучшить почву и дать ей хорошее удобреніе. Превосходная почва для такого выращиванія—черноземный суглинокъ, а для косточковыхъ тучные мергели.

Вообще посѣвныя однолѣтки слабѣе, чѣмъ прививаемыя на 2-лѣтнихъ дичкахъ. Сильныя изъ нихъ отличаются огромными листьями, у яблонь густо снабженными на нижней сторонѣ пушистыми волосками; стебель достигаетъ внизу толщины пальца и въ первый же годъ начинаетъ пускать здѣсь боковыя вѣтки, достигая вышины 1½ арш. Въ неблагоприятное дождливое и прохладное лѣто ростъ сѣянцевъ ничтожный, до ½ и даже ¼ аршина, и такіе сѣянцы недостойны дѣла оригинатора.

Въ обиходной практикѣ русскаго плодоводства сѣменное размноженіе однолѣтокъ касается лишь родителевой вишни и малороссійскихъ сливъ-угорокъ. Для нихъ, а также для оригинаторскихъ трудовъ въ питомникѣ весьма благоприятна куртина съ ручнымъ переваломъ и воздушнымъ дренированіемъ—послѣ вскапыванія дно устилается хворостомъ; при воздушной дренѣ на такой куртинѣ даже на подзолистыхъ суглинкахъ съ посредственнымъ удобреніемъ получается необычайно сильный ростъ.

Однако, начавши такъ изложеніе обрѣзки, я покажусь страннымъ для начинающихъ плодоводовъ, и они могутъ меня спросить: почему я сейчасъ же не берусь за ножъ и не показываю, какъ нужно рѣзать однолѣтку для формовки деревца? На это отвѣчаю, что рѣзать ее очень недолго, но толку отъ дурной однолѣтки никогда нельзя получить, и формовщикъ долженъ прежде всякой обрѣзки позаботиться сначала о ростѣ растенія.

Корневья однолѣтки. Корневая поросль нѣкоторыхъ сливъ, вишенъ и черешенъ, размножающихся такимъ путемъ константно, отличается плохою корневою системою и поэтому слабымъ ростомъ. Ее нужно садить въ питомникѣ на хорошую почву, лучше всего рано весною, и верхушекъ при этомъ не обрѣзывать. Еще хуже по корневой системѣ ростки, получаемые изъ частей корней, о которыхъ писала г-жа Е. Аверкіева въ своемъ сочиненіи „Яблоня“; я видѣлъ эти ростки въ опилкахъ на харьковской выставкѣ, а одругихъ опытахъ

этого рода свѣдѣній не имѣю. Опыты эти имѣютъ значеніе лишь при корнесобственныхъ деревьяхъ, и во всякомъ случаѣ такіе ростки надо хорошо выращивать сначала въ плодовой школѣ, чтобы придать имъ силу роста.

Корнесобственные однолѣтки. Кромѣ естественныхъ (вишни, сливы), выводятся искусственныя двумя способами: по нѣмецкому — отводками, послѣ чего пересаживаются на гряды плодовой школы, и по американскому, который горячо пропагандировалъ А. Грелль. Сюда же относится выведение однолѣтокъ изъ черенковъ — способъ, остановившійся въ своемъ улучшеніи, несмотря на огромную важность его для плодводства. Всѣ такого рода однолѣтки, насколько я могъ ихъ видѣть у Грелля, крайне тощи, слабы и требуютъ особой заботы для приданія имъ силы роста.

Прививныя однолѣтки. Это самая распространенная въ настоящее время однолѣтки, различающіяся двухъ родовъ: черенковые и окулировочныя; послѣднимъ отдается предпочтеніе не по силѣ роста, которая зависитъ отъ дичка, а по крѣпкому прирастанію къ дичку и вслѣдствіе этого большому сопротивленію поломкѣ отъ разныхъ причинъ. На этихъ однолѣткахъ нѣсколько остановимся.

Черенковые однолѣтки. Первые приемы формировація. Черенковая однолѣтка (рис. 1) получается изъ привитаго черенка съ двумя, а по старому приему, съ тремя почками, изъ которыхъ верхняя обыкновенно пускаетъ наиболѣе сильный побѣгъ, оставляемый въ ростъ, побѣги же изъ остальныхъ почекъ прищипываются (пинцируются) такъ, чтобы




Рис. 1. Черенковая однолѣтка айонки; обвязанная въ сантиметръ вверху на шпиль и еще весною привязанная къ тычинѣ ш въ двухъ мѣстахъ—внизу дичкоюю частью д и около конца тычинки: ч—привитой черенокъ, который изъ верхней почки развилъ однолѣтку, а изъ нижней побѣгъ утолщенія н. у. м. пинцированный въ маѣ. Уменьшено въ 6 разъ.



Рис. 2. Способы подвязки ростового побѣга:
I. Крѣпкая подвязка въ одинъ пруть; при толстыхъ побѣгахъ и штамбахъ берется нѣсколько прутьевъ, складываемыхъ концами обратно.—II. Легкая подвязка тонкимъ прутикомъ; концы остаются прижатыми къ опорѣ или продвѣаются въ кольцо между опорой и побѣгомъ. Чтобы оборотъ $\times$ крѣпко держался, и концы прижимался къ опорѣ и не развертывались, этотъ оборотъ подтягиваютъ вверхъ вмѣстѣ съ концомъ. Нат. вел.

на нихъ было нѣсколько листьевъ—они представляютъ собою такъ называемые побѣги утолщенія, потому что вырабатываемый ихъ листьями сокъ идетъ на ростъ черенка и главнаго побѣга; первый растетъ въ толщину, а второй въ длину и въ толщину. Когда сильный побѣгъ развивается не изъ верхней почки черенка, а изъ нижней, то онъ пускается въ ростъ, а слабый верхній побѣгъ линцируется. Одновременно съ выростаніемъ побѣговъ дѣлается ослабленіе повязки, для чего концомъ большого садоваго ножа повязка надрѣзывается снизу вверхъ и такъ оставляется на нѣкоторое время, пока отъ роста дичка и черенка ея края не отворотятся сами собою, послѣ чего она спадаетъ или легко отлущивается. Тогда же, ниже мѣста прививки, дичковая часть крѣпко привязывается къ воткнутой короткой тычинѣ лозою въ восьмерку, протягивая оба закрученные ея конца подъ оборотъ около тычины; кромѣ того, побѣгъ подвигивается еще къ верхней части тычины, но слабо и свободно тонкою лозою кольцомъ, продвѣвая конецъ лозы между побѣгомъ и тычиною (рис. 2). Такъ растетъ однолѣтка цѣлое лѣто, требуя послѣ этого только постояннаго выщипыванія почекъ на дичкѣ, дающихъ волчки; эти почки надо уничтожать при первомъ ихъ появленіи.

Въ концѣ лѣта черенковая однолѣтка чеканится, т. е. рѣжется на шипъ. Эта чеканка состоитъ въ томъ, что верх-

няя часть однолѣтки срѣзается, и близъ обрѣзаннаго ея конца наголо рѣжутся почки, такъ что получается небольшой, вершка въ два, шпенекъ или шинъ, къ которому потомъ на слѣдующій годъ привязывается побѣгъ удлинненія, о чемъ рѣчь будетъ впереди.

Обрѣзку на шинъ предлагаютъ дѣлать послѣ окончанія роста побѣга, что бываетъ въ концѣ сентября или въ началѣ октября, еще при зеленыхъ листьяхъ. Можно дать совѣтъ отнюдь не снѣзнить такую обрѣзкою, чтобы довести однолѣтку до полнаго роста; лучше, поэтому, дѣлать обрѣзку поздно осенью послѣ опаденія листьевъ, а еще лучше слѣдующею весною. Совѣтъ этотъ основывается на томъ, что обыкновенно подъ окончаніемъ роста разумѣютъ прекращеніе роста въ длину, между тѣмъ какъ однолѣтка, какъ и всякій вырастающій побѣгъ, растетъ также въ толщину, укрѣпляетъ въ себѣ древесину и развиваетъ свои почки, что происходитъ не только позднею осенью, но иногда даже зимою.

Въ нѣкоторыхъ питомникахъ ради простоты и однообразія работы принята шаблонная обрѣзка на шинъ всякихъ однолѣтокъ по одной мѣркѣ, прикладывая которую, рабочий рѣжетъ всѣ растенія на одинаковой высотѣ. Отъ такой шаблонной обрѣзки слѣдуетъ отказаться: при ней, когда однолѣтка слаба, рѣжется недостаточная ея часть, отчего потомъ получается тощее растеніе, или, наоборотъ, рѣжется излишняя часть, которая сама собою составила бы увеличеніе длины.

Въ руководствахъ также предлагается дѣлать обрѣзку этого




Рис. 3. I. Средняя часть однолѣтного годичнаго для формовки побѣга заготовки для показанія отгибъ корки почки: зора гладкая, блестящая, съ ясно выдѣляющимися чечевичками; почки члѣдкіи. Нат. вел. — II. Верхняя тонкая часть того же побѣга, годичная для формовки, покрытая сѣроватымъ налетомъ, безъ чечевичекъ, на верхнемъ еще не одеревенѣвшемъ осеннемъ концѣ густо волосистая; всѣ почки голой. Нат. вел.

однолѣтка (рис. 4) состоитъ изъ дичковой части и выросшаго изъ привитаго глазка побѣга; дичекъ надъ мѣстомъ выхода побѣга продолжается въ длинный шипъ, замѣняющій собою тычину и служащій для привязыванія побѣга въ двухъ мѣстахъ. Ослабленіе и снятіе повязки стоитъ въ связи съ климатическими условіями: въ южной полосѣ плодородства (на югъ отъ линіи винограда) принявшіеся при окулировкѣ почки въ концѣ лѣта и осенью утолщаются болѣе и болѣе, щитокъ не только прирастаетъ къ дичку, но и растетъ вмѣстѣ съ нимъ, врѣзываясь въ повязку, которую по необходимости приходится ослабить, а когда рана прививки совсѣмъ зарубцется, то и совсѣмъ удалить. Въ сѣверной полосѣ, кромѣ случаевъ теплаго лѣта и теплой осени, принявшіеся при окулировкѣ почки утолщаются весьма мало, щитокъ, хотя и прирастаетъ, но не крѣпко, и рана его не зарубцовывается такъ прочно, чтобы онъ могъ выдержать вредное дѣйствіе намачиванія водою и замерзанія, особенно въ гололедицу, когда всѣ обнаженные щитки отмираютъ вмѣстѣ съ почками и весною отлущиваются, какъ сухія чешуи. Поэтому, въ сѣверной полосѣ только при благоприятной погодѣ можно допустить ослабленіе повязки, но ни въ какомъ случаѣ не полное ея удаленіе, которое надо дѣлать только весною, разрѣзая повязку ножомъ снизу вверхъ точно такъ же, какъ и повязку при черепковой прививкѣ. Даже при такой предосторожности въ этой полосѣ, при гололедицѣ и суровой зимѣ съ малымъ снѣжнымъ покровомъ окулировочные щитки подвергаются разрушенію, преимущественно у косточковыхъ растений.

Еще вопросъ для разрѣшенія: слѣдуетъ ли на шипѣ дичка пускать въ ростъ нѣсколько почекъ и пицировать вырастающіе изъ нихъ побѣги, съ тою цѣлью, чтобы не умертвить дичекъ? Мѣра эта, хотя благоразумная, но излишняя, потому что даже въ томъ случаѣ, когда шипъ, въ короткій срокъ своего существованія, по какой-либо причинѣ безъ такихъ побѣговъ омертвѣлъ и засохъ, нижняя его часть пользуется достаточнымъ для нея притокомъ сока, текущимъ широко въ однолѣтку, и въ этомъ мѣстѣ омертвѣлости шипа не происходитъ; кромѣ того, самъ шипъ содержитъ въ себѣ вещества, достаточныя для его недолгаго существованія. Если такое отмираніе шипа происходитъ, то, вѣроятно, въ южныхъ мѣстностяхъ при сильномъ зноѣ. Гораздо важнѣе опредѣлить время обрѣзки шипа: на югѣ шипъ можно рѣзать въ іюль и въ августъ, и рана его успѣваетъ зарости; на сѣверѣ такая обрѣзка опасна для зимы, въ которую незажившая рана можетъ подмерзнуть, и лучшее время обрѣзки здѣсь

слѣдующая весна, вмѣстѣ съ чеканкою однолѣтки. Послѣ обрѣзки шипа дѣлается обмазка раны садовою замазкою, или

на югѣ окраска раны
густою масляною кра-
скою (вареная олифа
и оура или мумія).

Формовка съменныхъ и корневыхъ однолѣтнъ въ значительпо упрощается противъ прививныхъ и состоитъ изъ одной чеканки, въ рѣдкихъ случаяхъ съ прибавленіемъ пинцированія боковыхъ побѣговъ. Отсюда ясно, что плодородъ избавилъ бы себя отъ излишняго труда, если бы сталъ размножать плодовые растенія съменами и корневою порослью.

Когда не рѣжутся однолѣтки. Иногда можно обойтись безъ чеканки однолѣтки, не подтрогиваясь до нея ножомъ. Есть такіе превосходные для выращивания деревцовъ сорта, ростъ которыхъ отличается необыкновенною силою. Изумительной толщины и длины на сильныхъ дичкахъ достигаютъ огнолѣтнія окулировки канадскихъ сортовъ яблокъ Baxter и Winter Bough. На рисункѣ 5 для примѣра представлены концы толстыхъ однолѣтнихъ побѣговъ груши фунтовки. Одинъ




Рис. 5. Концы толстых побегов груши фунтовки: 1 — необбачено толстый побег в в. натур. вел. от оплодотворенной на грушевидной дичке одностопки; 3 — зеленое травянистое колышко; в. окислял еще неуспешно одревеснел; в. — травянистый кончик, покрытый рыхлыми волосками; вся эта травянистая часть была чечевичками; б. б. — бурная одревеснявшая часть с чечевичками. Длина этой одностопки 2 арш. 2 в., толщина у основания с большой палец. — III. Побег с большого дерева. Толство порхующая почка покрыта рыхлыми волосками. Остаточная часть бурая, одревесневшая с чечевичками. Уменьшено в полтора раза.

побѣгъ, толстый, какъ спаржа, срѣзанъ съ однолѣтней окулировки на сильномъ грушевомъ дичкѣ; значительная его часть бурая, одеревянѣвшая, съ рѣзко выдѣляющимися чечевичками, и только на концѣ небольшая зеленая и травянистая часть, которая деревянѣетъ въ ноябрѣ и около верхушки покрыта рыжими волосками—вся эта травянистая часть безъ чечевичекъ можетъ вызывать охоту подѣйствовать ножомъ, чтобы сдѣлать ненужный здѣсь шипъ. Длина этой спаржевидной однолѣтки $2\frac{1}{4}$ арш., толщина у основанія съ большой палецъ. Второй побѣгъ, срѣзанный съ большого 20-лѣтняго дерева, хотя менѣе толстъ, но показываетъ собою буйную силу прироста у этого сорта, а также объясняетъ намъ, почему у однолѣтки верхушку рѣзать не слѣдуетъ: почти весь этотъ побѣгъ бурый и одеревянѣвшій, съ чечевичками, и только макушка его съ верхушечною почкою покрыта рыжими волосками, но уже окончательно сформировалась въ тупое окончаніе, что мы можемъ ожидать и на однолѣткѣ, ростъ которой осенью заканчивается поздное, чѣмъ побѣговъ на деревѣ. Впрочемъ, груша фунтовка—сортъ яблкій, нерѣдко вымерзающій въ приростѣ, поэтому, весною у насъ все-таки приходится рѣзать толстыя обмерзшія на концахъ однолѣтки, но на югѣ въ этомъ нѣтъ никакой надобности.

Условія для выращиванія хорошихъ однолѣтокъ. Чтобы достигнуть хорошаго роста однолѣтокъ, отъ которыхъ зависитъ все качество формируемыхъ деревцовъ, нужно соблюдать слѣдующія условія:

1) Дѣлать прививку только на сильныхъ 2-лѣтнихъ дичкахъ съ обильною корневою системою, откѣзавшись для яблонь отъ дичковъ лѣсной яблони и предпочитая ей китайку и сибирку, для грушъ пользуясь сидровыми сортами и айвою, для вишенъ антипкою и малороссійскою вишнею и для сливъ терномъ и сѣянцами акклиматизированныхъ сортовъ.

2) Куртины питомника надо различно приспособлять для разнаго рода плодовыхъ растений. Для яблонь, особенно слабаго роста, слѣдуетъ вводить въ суглинокъ или въ супесь возможно большее количество перегноя въ видѣ перепрѣлаго навоза, компоста, листы, лѣсного сгребя, вывѣтрившейся торфянистой земли и пр. Для грушъ перегноя нужно меньше, кладя его въ верхній слой, гдѣ лучше могли бы развиваться боковые корни. Для вишенъ и сливъ суглинки должны быть известкованы, по крайней мѣрѣ, по 2—4 фунта негашеной извести на 1 кв. саж.

3) При слабомъ ростѣ большую пользу оказываетъ поливка жидкимъ удобреніемъ, жидкостью изъ помойныхъ ямъ, послѣ дождя, и чилійскою селитрою.

Не соблюдая этихъ условій, напрасно думать, что формовкою всегда можно исправить ростъ, заставляя однѣ части расти сильнѣе, другія слабѣе и, если это иногда достигается, то въ ущербъ времени, требуя лишняго труда и заботъ.

Что должно разумѣть подъ естественными формами. Изъ выращенной однолѣтки можно выводить какія угодно формы деревцовъ, до пѣтуха и слона включительно. Принято эти формы раздѣлять на естественныя, подражающія природѣ, и искусственныя въ видѣ пирамиды, шнура, канделябра, колецъ, спиралей и пр. Такое раздѣленіе скорѣе вычурное, не соотвѣтствующее дѣйствительности. На самомъ дѣлѣ, въ настоящее время всѣ выращиваемыя деревца въ каждой своей части подвергаются обрѣзкѣ для полученія искусственныхъ формъ, наиболѣе пригодныхъ и общепотребительныхъ при плодовыхъ насажденіяхъ.

Вычурность тутъ видна изъ слѣдующихъ простыхъ соображеній. Всѣ питомники стремятся теперь подъ видомъ такъ называемыхъ естественныхъ формъ выращивать деревца въ однообразной формовкѣ по способу Дитриха, съ нѣкоторыми его измѣненіями, и это прилагается не только къ разнообразнымъ сортамъ одного и того же вида, но безразлично къ разнаго рода всякимъ плодовымъ растеніямъ, будутъ ли это яблони, груши, вишни или сливы. Неужели всѣ эти деревья въ молодости и въ своемъ естественномъ состояніи растутъ по способу Дитриха? Конечно, нѣтъ. Потому: кто когда-либо видѣлъ, какую естественную форму принимаетъ антоновка, апортъ, титовка и пр.? Выращиваніе плодовыхъ растеній въ ихъ настоящей естественной формѣ до сихъ поръ преслѣдуется правилами плодоводства, и если по какой-либо случайной причинѣ такая форма образуется, то ее спѣшатъ обратить въ мнимо-естественную, подвергая разной обрѣзкѣ; изслѣдованій, какъ и опытовъ выращиванія настоящихъ естественныхъ формъ, не существуетъ, хотя это было бы не только весьма любопытно, но дало бы огромный толчекъ для правильной постановки формированія деревцовъ разныхъ сортовъ, видовъ и родовъ и въ будущемъ открыло бы болѣе цѣлесообразные способы формировки. До сихъ поръ, однако, намъ извѣстно по этой части очень немногое: груши, нѣкоторыя яблони и древесныя вишни обладаютъ склонностью къ такъ называемому пирамидальному росту, многія яблони и сливы—къ развѣстному; затѣмъ извѣстно, что немногіе сорта яблонь и грунь выпускаютъ длинныя голенастыя сучья, какъ бы выражая особую склонность къ плакучести и, можетъ быть, такая склонность при болѣе своемъ развитіи (теперь она тоже преслѣдуется