

Рот Отто

Клиническая терминология

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 61
ББК 5
О-87

О-87 **Отто Р.**
Клиническая терминология / Рот Отто – М.: Книга по Требованию, 2024. – 664 с.

ISBN 978-5-519-83636-4

ISBN 978-5-519-83636-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

А

АА (aa): на рецепте означает апа = равные части.

АБАДИ (Ch. Jean Marie Abadie) СИМПТОМ: нечувствительность Ахиллова сухожилия к давлению (при спинной сухотке).

АБАДИ (Ch. Abadie) СИМПТОМ: спазм m. levator palpebrae sup. при болезни Базедова.

АБАЗИН: ацетилдидиэтилбромацетилкарбамид. Препарат мочевины в лепешках. Успокаивающее и снотворное.

АБАЗИЯ: неспособность ходить, большую частью частичное явление истерии, обычно наблюдается с астазией (см.).

АББЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ: конденсор (несколько сложенных чечевиц), который направляет световые лучи на микроскопически исследуемый предмет.

АБДЕРГАЛЬДЕНА РЕАКЦИЯ: обнаружение т. наз. защитных ферментов (см.). *Диллизионный метод:* при наличии в сыворотке указанных ферментов они расщепляют помещенный в специальную гильзу субстрат (приготовленный из соответствующего органа); продукты расщепления диффундируют сквозь стенки гильзы и обнаруживаются в окружающей жидкости при помощи цветной реакции или иными способами (микрорельдаль). *Поляризационный и интерферометрический методы* основаны на изменении оптических свойств смеси сыворотки с субстратом вследствие действия ферментов. Видоизменением Р. А. является *алкогольносубстратная* и *алкогольносубстрактная р. Люттге и Мерца*, при которых продукты расщепления белка отделяются от оставшегося неизмененным белка путем осаждения последнего при помощи спирта. Р. А. и ее видоизменения предложены для распознавания беременности, пола плода, поражения эндокрин-

ных желез, злокачественных новообразований. Теоретические обоснования и практическое значение этих реакций не вполне установлены.

АБДУКТОР: мышца, удаляющая данную часть тела от средней линии.

АБДУКЦИЯ (отведение): движение члена кнаружи от средней линии тела.

АБИЕТИН: см. Кониферин.

АВІЮ: новое обозначение офтальмозана (см.).

АБИОГЕНЕЗ: самопроизвольное зарождение (син. Архигония, Generatio aequivoca).

АБИОЗ или **АБИОТРОФИЯ:** постепенное ослабление функции под влиянием жизненных процессов на почве врожденной слабости.

АБЛАКТАЦИЯ: отнятие ребенка от груди матери.

АБЛЕПСИЯ: неспособность видеть, слепота.

АБЛЕФАРИЯ: отсутствие век.

АБОЛИЦИОНИЗМ: первоначально — принципиальное устранение рабства, а затем возникшее в Англии течение, которое отвергает санитарно-полицейский надзор за проституцией.

АБОРТ: см. Выкидыш.

АБОРТИВНОЕ ТЕЧЕНИЕ: сокращенное течение болезни без полного развития всех симптомов. См. Тиф, Пневмония.

АБОРТИВНЫЕ СРЕДСТВА: 1) вызывающие выкидыш; 2) сокращающие течение болезни (син. Pellentina).

АБРАЗИЯ (Abrasio): выскабливание острой ложечкой. *A. dentium* изнашивание зубов. *A. uteri* выскабливание матки.

АБРАСТОЛ (Calcium naphthol-sulfuricum): антисептическое (для полоскания рта) и антиревматическое средство (син. Асапрол).

АБРАХИЙ: индивидуум с врожденным отсутствием обеих верхних конечностей.

АБРАХИОЦЕФАЛ: врожденное отсутствие головы и рук.

АБРИН: ядовитое вещество, добываемое из семян Джеквирити (*Jequirity*) от *abrus precatorius*; применяется при помутнении роговицы (сип. Джеквиритол — *Jequiritol*).

АБСАНС (*Absence*): скоропроходящая потеря сознания, особенно при падучей.

АБСИНТИЗМ: отравление полынью.

АБСОЛЮТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: количество воды в виде пара в одном куб. см воздуха.

АБСОЛЮТНАЯ ДИЭТА: лечение голоданием.

АБСОЛЮТНАЯ ТУПОСТЬ: см. Сердце.

АБСОРБЦИОННЫЙ ОПЫТ КАСТЕЛЛАНИ: см. Кастеллани.

АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТР: спектр света, прошедшего через какое-либо тело, задержавшее лучи определенной длины волны (абсорбционная полоса).

АБСОРБЦИЯ: 1) в физике — поглощение газов твердыми и жидкими телами, также поглощение света и определенных лучей; 2) в физиологии — поглощение веществ тканями. См. А д с о р б ц и я и Р е з о р б ц и я.

АБСТРАКЦИИ ДЕФЕКТ: неспособность получить общие представления и представление о взаимоотношениях (Циген).

АБСЦЕСС (*Abscessus*) или *нарыв*: ограниченное скопление гноя с разрушением ткани. *Горячий А.* (*A. calidus*) развивается быстро с явлениями острого воспаления. *Холодный А.* (*A. frigidus*) медленно развивается (часто туберкулезный). *Затечный А.* (*A. congestionis*) происходит, когда гной на месте своего образования вследствие препятствия (фасции) не скапливается, а появляется в другом месте; чаще всего затечный А. появляется в области поясничной мышцы (*A. psoadicus*). *Фолликулярный А.* (*A. follicularis*) — нагноение отдельных фолликулов слизистой оболочки (сип. *Apostema*). *Околопочечный А.* (*A. pararenalis*) — скопление гноя в жировой капсуле вокруг

почки; большею частью метастатического происхождения. *Предпозвоночный А.* (*A. praevertebralis*) — скопление гноя впереди позвоночника при туберкулезном спондилите. *Заглоточный А.* (*A. retropharyngealis*) — скопление гноя между позвоночником и задней стенкой глотки, либо первичное вследствие флегмонозного воспаления, либо же затечное при костоеде шейных позвонков или основания мозга (*malum suboccipitale* — подзатылочная болезнь, см.). *Каловый А.* (*A. stercoralis*) содержит кал, возникает при прободении кишек. *Поддиафрагмальный А.* (*A. subphrenicus*) — скопление гноя между грудобрюшной преградой и печенью или желудком; содержит газ, т. к. большею частью возникает при прободении содержащих воздух органов (желудок, червеобразный отросток); возникает также при нагноении в полости плевры. *А. потовых желез* (*A. sudoriparus*) — см. Гидраденит.

АБСЦЕСС ПЕЧЕНИ (*hepatitis suppurativa*, или *purulenta*, или *apostematosa*): гнойник в печени, б. ч. в заднем отделе правой доли. Наиболее частая причина — гнойные процессы в кишечнике. См. Д и з е н т е р и я.

АБУЛИЯ: болезненный недостаток центральных волевых импульсов, напр. при некоторых душевных болезнях, при истерии; недостаток воли (*Abulische Insuffizienz*, О. Розенбах); слабость воли.

АБЭ (*Abée Ernst*): немецкий врач; им предложен целот на область сердца для облегчения сердцебиения.

АБЭРРАЦИЯ (*Aberratio*): частичное умственное расстройство. *А. testis*: непорядочное положение яичка (сип. *Ectopia* или *Dystopia testis*).

АВЕЛЛИСА (*Avellis*) **СИМПТОМОКОМПЛЕКС** односторонний паралич мышц гортани, сочетающийся с параличем мягкого неба и других мышечных групп на той же стороне (глаза, грудноключично-сосковая мышца, плечевые м.), вследствие поражения внутренней ветви п. *accessorii*.

АВЕНОЛИТЫ: кишечные конкременты у детей, вскармливаемых овсяным хлебом и крупой; состоят из растительных волокон, сгущенных каловых масс и земельных фосфатов.

АВЕРТИН (Дунсберг и Вильштеттер): CBr_3CH_2OH , сильное анестетическое средство (ректальный наркоз).

AVIDITAS: влечение (жадность) к определенному веществу (А. клетки к яду, антитоксина к токсину).

АВИТАМИНОЗЫ: болезни, обусловливаемые недостатком витаминов в пище.

АВРАН АПТЕЧНЫЙ (*Gratiola officinalis*): экстракт из травы, действует как слабительное.

АВТОГАМИЯ: самооплодотворение; образование гаметов и слияние их в оплодотворенное ядро внутри клетки (протозои, напр. амёбы).

АВТОКЛАВ: паровой прибор для стерилизации.

АВТОМАТИЗМ АМБУЛАТОРНЫЙ (*Automatismus ambulatorius*): у душевнобольных, при истерии и эпилепсии, автоматический позыв на передвижение. См. **П о р н о м а н и я**.

АВТОМАТИЯ: а) в физиологии — самостоятельно совершающаяся функция без влияния центра, напр. движение сердца, зависящее от особых сердечных ганглиев; б) действия, совершающиеся без влияния воли, благодаря внушению, увещанию, приказу или благодаря другим причинам — имитационная автоматия с гипнозом или без него. *Атриовентрикулярная А.*: усиленная автоматия узла Ашофа (см.) влечет за собою диссоциацию между желудочками и предсердиями, причем желудочки сокращаются чаще, нежели предсердия. См. **Б л о к с е р д ц а**.

АВТОНОМНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА: под этим термином раньше разумели систему блуждающего нерва; в настоящее время симпатическая и парасимпатическая нервные системы обозначаются общим термином автономная, или вегетативная, или висцеральная (обслуживающая внутренние органы) Н. С. Вегетативная (или А-ая) Н. С. подразделяется на систему симпатического нерва — симпатическую систему, и на систему блуждающего нерва — парасимпатическую. См. **П а р а с и м п а т и ч е с к а я с и с т е м а**.

АВТОНОМНЫЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАЧАТКИ: наследственные зачатки, которые не принадлежат к одной

паре наследственных зачатков (см.) и не имеют склонности к слиянию.

АГАЛАКТИЯ, АГАЛАКТОЗ (*Iporia lactis*): отсутствие выделения молока у рожениц.

АГАМЕТЫ: те особи из простейших, которые не предназначены для копуляции (вегетативные особи).

АГАМОГЕНЕЗ: бесполое размножение.

АГАР - АГАР: желеобразное вещество, добываемое из различных азиатских морских водорослей, растворяется в горячей воде и застывает по охлаждению в прозрачную массу, применяемую в качестве питательной среды для бактерий; применяется также как слабительное.

АГАРИКАЛ: лепешки, содержат 0,0075 агарицина, 0,1 Доверова порошка и органический препарат фосфорнокислого кальция; действует как агарцин.

АГАРИЦИН: агарициновая кислота, действующее начало листовничной губки; средство против потов чахоточных.

АГАРОМА, АГАРУЛИН: препараты агара против запора.

АГАСТРИЯ: врожденное отсутствие желудка.

АГАТИН: салицилалдегидметил - фенилгидразон. Антиневралгическое.

АГГЛОМЕРАТ, АГГЛОМЕРАЦИЯ: образование групп, напр. трипанозом, с обращенными кнаружи жгутиками, при прибавлении соответствующей сыворотки.

АГГЛЮТИНАЦИЯ: приклепание, склеивание, — 1) метод удаления инородных тел из уха и других органов; 2) склеивание кровяных шариков в капилляры при застое их; 3) кровяная сыворотка организма, подвергшегося действию к.-л. микробов, действует на те же микробы, вызывая их (скупивание, склеивание. См. **Г р у б е р - В и д а л е в с к а я р е а к ц и я**, **С е р о д и а г н о с т и к а**. **А г г л ю т и н а ц и о н н ы й т и т р**: наименьшее количество сыворотки, которое, будучи прибавлено к 1 куб. см физиологического раствора поваренной соли, достаточно еще для того, чтобы агглютинировать платиновую петлю (= 2 мг) суточной агаровой разводки соответствующего вида бактерий.

АГГЛЮТИНИНЫ: вещества, склеивающие (сгущивающие) бактерии, принадлежат к группе антител, содержатся и в нормальной сыворотке; при не слишком большом разведении сыворотка действует на различные бактерии, но не специфически; но сыворотка человека, перенесшего заразную болезнь, или животного, которому впрыснута разводка к.-л. бактерий, агглютинирует в гораздо большем разведении, притом специфически, т. е. только данную бактерию.

АГГЛЮТИНОГЕНЫ: вещества бактериального тела, вызывающие образование агглютининов в организме, антиген.

АГГЛЮТИНОИД: см. А г г л ю т и н о ф о р м а я г р у п п а. Э р г о ф о р м а я г р у п п а.

АГГЛЮТИНОСКОП: прибор, основанный на феномене Тиндаля (см.) для лучшего распознавания склеивания бактерий.

АГГЛЮТИНОФОРНАЯ ГРУППА (Эрлих): часть молекулы агглютинина, которая производит видимую реакцию (в отличие от гаптофорной группы): если эта группа разрушена, то остается *агглютиноид*, который тормозит реакцию, т. к. он связывает рецепторы бактерий.

АГГРАВАЦИЯ: преувеличение болезненного состояния, ухудшение.

АГГРЕССИВЫ [Бэйль (Bail)]: продукты выделения патогенных бактерий, оттапливающие лейкоциты, ослабляющие специфические защитные силы организма. См. А п т и о п с о н н и.

АГЕЙЗИЯ: *anaesthesia gustatoria*, потеря вкуса.

АГЕНЕЗИЯ: недостающее зародышевое развитие органов или части тела.

АГЕНИТАЛИЗМ: отсутствие половых желез. См. Е в н у х о и д и з м.

АГЛОБУЛИЯ: уменьшение количества красных кровяных шариков.

АГЛОССИЯ: отсутствие языка.

АГНАТИЯ: врожденное отсутствие нижней челюсти, вызываемое зародышевым дефектом нижнечелюстных отростков первой жаберной дуги. Височные кости настолько приближены к средней линии, что и паружные слуховые ходы тоже приближены друг к другу. См. С и н о т и я, Ц и к л о т и я.

АГНОЗИЯ: расстройство узнавания. *Акустическая А.* — душевная глухота, неспособность понимать звуки речи и другие слуховые раздражения вследствие повреждения височной доли. *Оптическая А.:* душевная слепота, неспособность узнавать показанные предметы, хотя форму и цвет больной правильно отмечает; наблюдается при поражении затылочных долей. *Тактильная А.:* неспособность узнавать предметы при ощупывании их, хотя чувствительность не нарушена.

АГОБИЛИН: желчегонное средство; таблетки содержат 0,2 холевой кислоты, салициловокислый стронций и фенолфталеиндиацетат.

АГОЛЕУМ (Agoleum): раствор коллоидного серебра в масле, содержит 1% серебра, применяется против болезней пузыря.

АГОМЕНСИН: препарат, добываемый из желтых тел яичника (*corpora lutea*), применяется против аменоррей.

АГОНИЯ: борьба со смертью.

АГОРАФОБИЯ: боязнь открытой площади, опасение, что появится головокружение. См. Т о п о ф о б и я.

АГРАММАТИЗМ: неспособность грамматически образовать слова, вид афазии (смп. Акатаграфия, Акатафазия).

АГРАНУЛОЦИТОЗ: вызванное своеобразной инфекцией глубокое повреждение костного мозга в области гранулоцитной системы, характеризующееся резким уменьшением количества гранулоцитов в крови. См. Г р а н у л о ц и т ы.

АГРАФИЯ: потеря способности писать слова при нормальном состоянии умственных способностей и отсутствии механических препятствий.

АГРИПНИЯ (Agyrpnia, Insomnia, Pervigilium): бессонница (смп. Асомния).

АГУРИН: *theobrominnatrium aceticum*: мочегонное.

АГУТТАН: оксигинолиновый эфир салициловой кислоты, противоподагрическое средство.

АДАКТИЛИЯ: врожденное отсутствие пальцев. *Adaktylus*: урод без пальцев.

АДАЛИН: бромдиэтилацетилмочевина, $\text{NH}_2\text{CONHCOC}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Br}$; спазмолитическое и успокаивающее.

АДАМАНТИН: зубная эмаль.

АДАМАНТИНОМА: опухоль внутри челюсти или на ней; развивается из зубообразующего эпителия.

АДАМКЕВИЧА РЕАКЦИЯ: фиолетовая окраска растворенных в уксусной кислоте белковых веществ от прибавления концентрированной серной кислоты. Раствор дает черную полосу поглощения в спектре между зеленым и синим.

АДАМОВО ЯБЛОКО (*Potum Adami*): выступ гортани, особенно у мужчин, легко прощупываемый через кожу и даже видимый.

АДАМОН: борнеоловый эфир дибромдигидрокоричной кислоты: успокаивающее.

АДАМС - СТОКСА БОЛЕЗНЬ [Гюшар (Huchard)]: перманентно замедленный и также неправильный пульс вследствие блока сердца (см.) с приступами слабости сердца и апопектиформными или эпилептиформными припадками. Сомптомокомплекс описан Adams'ом (Дублин, 1791—1875) в 1827 г. и Stokes'ом в 1846 г.

АДАПТАЦИЯ: приспособление глаза к свету различной силы, благодаря изменению чувствительности сетчатки и ширины зрачка. Термин, применяющийся вместо аккомодации.

АДВЕНТИЦИЯ (*Tunica adventitia*): наружная соединительнотканная оболочка органов, лишенная серозного покрова, напр. мочеиспускательного канала; наружный слой сосудов.

АДГЕЗИЯ (*Adhaesio*): в патологии — слипание двух поверхностей. *Адгезивное воспаление:* слипчивое воспаление двух соприкасающихся поверхностей.

АДДЕ (лат.): прибавь (в рецептах).

АДДИСОНА (1793—1860) БОЛЕЗНЬ: смертельная болезнь, характеризуется малокровием, истощением, первыми явлениями и грязнобурой крупнопятнистой кожей; обуславливается перерождением (туберкулезным) надпочечных желез, м. б. также поражением соседнего симпатического нервного сплетения (*Plexus solaris*) (син. *Melasma supragenale*, бронзовая болезнь).

АДДУКТОР: мышца, приводящая конечность к средней линии.

АДДУКЦИЯ: приведение конечности к средней линии.

АДЕЛОМОРФНЫЕ КЛЕТКИ: главные клетки пейсеровых желез, менее явственные, чем обкладочные клетки.

АДЕНИН: 6-аминопурин; одно из пуриновых оснований (см. Пурины). Впервые найден в поджелудочной железе; в обильном количестве также в выточковой железе и в семени карпов. Фермент аденаза превращает его в гипоксантин.

АДЕНИТ: воспаление железы.

АДЕНИЯ: псевдолейкемия.

АДЕНОГИПОФИЗ: железистая часть (передняя доля) гипофиза (см.), состоит из эпителиальных трубочек, содержит действующее начало.

АДЕНОИДНЫЕ РАЗРАЩЕНИЯ: см. Вегетация. *Аденоидная ткань:* фиброзная соединительная ткань с лимфатическими клетками.

АДЕНОКАРЦИНОМА: форма рака, содержащего аденоматозные части с железистыми полостями (см. Рак).

АДЕНОКИСТОМА: образование кист в аденоме вследствие расширения железистых ходов секретом.

АДЕНОЛИМФОЦЕЛЕ: опухоль в паховой области вследствие выпячивания железистой опухоли (лимфангиомы) с выделением лимфы.

АДЕНОЛИПОМАТОЗ СИММЕТРИЧЕСКИЙ: жирная шея Маделунга, диффузное симметрическое образование жира на шее и затылке.

АДЕНОМА (*Adenoma*): узловые опухоли, развиваются из железистого эпителия, гл. о. в печени, грудных железах, яичниках, потовых и слюнных железах и в кишках, построены по типу желез, но отличаются от железистой гиперплазии тем, что эманицированы от материнской почвы. *А. волокнистая:* См. Рак. *А. полипозная:* полипозные образования, состоящие главным образом из разросшихся желез. *А. пупочная* (*A. umbilicale*): опухоль у пупка благодаря сращению *diverticulum Meckel* (см.) с пупочным кольцом; вследствие этого обнажается слизистая оболочка кишок (син. *Ectopia intestini*). *А. себаци:* многочисленные опухоли, величиною от булавочной головки до голубиног яйца, развившиеся из саленных желез, особенно на лице, волосяной

части головы и затылка (син. *Naevus multiplex*, *Naevus sebaceus*). **А. sudoriferum**: развившаяся из потовых желез аденома, похожа на предыдущую форму.

АДЕНОМАЛАЦИЯ: размягчение желез.

АДЕНОМИКСОСАРКОМА: первичная аденома с последовательным саркоматозным и миксоматозным перерождением стромы.

АДЕНОМИОМА ТРУБ (v. *Recklinghausen*): *salpingitis isthmica nodosa* (син. Аденомиометрит).

АДЕНОМИОСАЛЬПИНГИТ: хроническое воспаление труб с ограниченной гиперплазией соединительной ткани, мышц и с разрастанием желез, особенно у маточного конца трубы.

АДЕНОПАТИЯ: заболевание желез.

АДЕНОСАРКОМА: саркома плюс аденома, т. е. содержит железистые трубки; если содержит еще мышечные волокна, то получается *аденомиосаркома*.

АДЕНОСКЛЕРОЗ (син. Склерадент. Уплотнение железы).

АДЕНОТОМИЯ: вырезывание аденоидных разрастаний. *Аденотом*: кольцевидный нож для аденотомии.

АДЕПС (*Adeps*): жир, сало. **А. benzoatus**, 2 ч. бензоэ, 100 частей свиного сала. **А. lanae anhydricus**: безводный ланолин, свободная от воды очищенная овечья шерсть. **А. lanae c. aqua**, ланолин, содержащий воду (25 — 30%) жир из овечьей шерсти. **А. ovillus**, овечье сало. **А. suillus**, свиное сало (син. *Axungia porci*).

АДЕСМОЗ (Аушпиц): болезнь кожи, характеризующаяся врожденным недостаточным развитием соединительной ткани или исчезанием ее (син. Лиодермия эссенциальная (см.) и *striae atrophicae cutis* (см.)).

АДЕФАГИЯ: см. Булимия.

АДИАДОХОКИНЕЗ: неспособность быстро и последовательно производить простые антагонистические движения, напр. пронацию и супинацию рук, сгибание и разгибание колена. Симптом болезни мозжечка и патологического процесса в чечевичном ядре.

АДИГАН: жидкий препарат наперстянки. 1 куб. см = 0,1 листьев. Внутрь, подкожно и внутривенно.

АДИНАМИЯ: астения, потеря сил. *Адинамическое, астеническое течение*: течение лихорадочных болезней с крайне тяжелыми общими явлениями (слабость сердца, упадок сил, бред).

АДИПИНОВАЯ КИСЛОТА: $C_4H_8(OOH)_2$, получается путем окисления жира.

АДИПОЗУРИЯ: линнурия.

АДИПОМА: липома.

АДИПОСИР: трупный воск; образуется при разложении трупов в сырой почве, при недостатке кислорода, благодаря окислению жиров и образованию известкового, калиевого, натриевого и аммиачного мыла.

АДИПОЦЕЛЕ: жировая грыжа; мешок содержит только жировую ткань (син. Липароцеле, *Hernia adiposa*).

АДИПСИЯ: отсутствие жажды.

АДИЭМОРРИЗИС (*Adiaemorrhysis*): недостаточное снабжение кровью (мозга) (Р. Гейгель).

АДМИНИКУЛУМ БЕЛОЙ ЛИНИИ (*Adminiculum l. a.*): трехугольный волокнистый тяж на задней поверхности белой линии.

АДОВЕРН: препарат *adonis vernalis*, содержащий в стандартизированной форме глюкозиды последнего, действующие на сердце. Внутрь: 3 × 10 капель в день. Можно применять также *per rectum*.

АДОНИДИН и **АДОНИГЕН**: глюкозиды горичвета весеннего (*adonis vernalis*); сердечное средство.

АДОРИН: соединение формальдегида с салициловой кислотой; присыпка при потении ног.

АДРЕНАЛИН (син. Супраренин, Эпинефрин, Эпиренан, Паранефрин), *о-диоксифенилэтанолметиламин*: действующая составная часть надпочечной железы, получается также синтетически; белый кристаллический порошок, почти нерастворимый в воде. Суживает сосуды. Солянокислая соль применяется для усиления местной анестезии и остановки кровотечения. Употребляется готовый раствор 1:1000 в физиологическом растворе поваренной соли. *А-овая флокуририя*: появление сахара в моче при впрыскивании А. *А-овая проба*: 1) по Фрею — подкожное впрыскивание адре-

налина вызывает у здорового лейкоцитоз (15 — 20 тысяч), при белокровии — больший лейкоцитоз (до 100 000). При болезни Бапти (фиброадения селезенки) картина крови после впрыскивания не изменяется. По Шитенгельму и Шлехту адрепалиновая проба надежное средство для обнаружения скрытой малярии, так как появляются лихорадочные пароксизмы и плазмодии в крови. 2) По Леву — при недостаточности поджелудочной железы и болезни Базедова введение в глаз раствора А. (1 : 1000 — 1 : 10000) вызывает расширение зрачка, у здоровых эта реакция не получается.

АДСОРБЦИЯ: рыхлое механическое, не химическое связывание газа или растворенного вещества другим веществом, находящимся в жидкости в крайне раздробленном состоянии, напр. раствора краски взвешенным в жидкости угольным порошком. См. Абсорбция.

АДЪЮВАН: ртутный препарат для смазывания; содержит 33 $\frac{1}{3}$ % ртути.

АДЕКВАТНОЕ РАЗДРАЖЕНИЕ: раздражение, приравненное к организации воспринимающего органа.

АЗИАТСКИЕ ПИЛЮЛИ (Pil. asiaticae): содержат 0,001 мышьяковистой кислоты и черный перец.

АЗОДЕРМИН: лишенный ядовитости амидоазотолуол или ацетиламидоазотолуол, светло - желто - красный порошок, нерастворимый в воде; способствует росту эпителия.

АЗОДОЛЕН: смесь равных частей пеллидола и иодолена, желтый порошок. Применяется при ранах как средство, способствующее росту эпителия.

АЗООСПЕРМАТОРРЕЯ: семятечение при наличии азооспермина.

АЗООСПЕРМИЯ: отсутствие семенных нитей в семенной жидкости.

АЗОТ ОСТАТОЧНЫЙ: азот, остающийся в сыворотке крови после удаления белков; О. А. составляется из азота мочевины, мочевой кислоты, индикана, экстрактивных веществ и др.: в норме О. А. составляет около 35 мг N в 100 см³ крови. При недостаточности почек О. А. повышается и может достигнуть до 400 мг.

АЗОТА МИНИМУМ: минимальное количество израсходованного азота (Abnutzungsquote); наименьшее количество

выделяемого азота при безазотистой или почти безазотистой и богатой углеводами пище. Азот — эндогенного происхождения.

АЗОТЕМИЯ (Видадь): частичное явление уремии — увеличение количества остаточного азота в крови при недостаточном выделении азота почками.

АЗОТИСТОЕ РАВНОВЕСИЕ: состояние, при котором организм столько же выделяет азота (с мочой и калом), сколько и потребляет (в виде белков пищи).

АЗОТНОКИСЛОЕ СЕРЕБРО (Argentum nitricum) (син. Ляпис): AgNO₃. A. n. c. kalio nitrico = Lapis mitigatus, прижигающее.

АЗОТОРРЕЯ: ненормальное количество азота (переваренное мясо) в кале при болезнях поджелудочной железы.

АЗОТУРИЯ: чрезмерное содержание азота в моче.

А-ЗУБЕЦ: см. Электрoкардиограмма и Венный пульс.

АЗУРОЛ: двойная соль салициловой кислоты ртути и амидооксимаслянокислого натрия; 40% ртути. Против сифилиса.

АЗУРОФИЛИЯ: способность некоторых клеточных элементов (ядер, зерен) окрашиваться в ярко красный цвет при применении смесей азура и эозина; появление большого числа азурофильных зернышек в лимфоцитах при лимфоцитозе, сопутствующем заразным болезням.

АЗУРОФИЛЬНЫЕ ЗЕРНЫШКИ (Azurgranula): см. Азурофилия.

АИ КРЕПИТИРУЮЩИЙ (Ai crepitant): болезненная крепитация сухожилий, особенно Ахиллова, при воспалении их.

АИДОИОМАНИЯ (Aidoiomania): болезненно повышенный половой инстинкт.

АИЕРЦА (Ayerza) **БОЛЕЗНЬ:** cardiopathia nigra, цианоз лица и конечностей. Полиглобулия, отеки, асистолия правого сердца. Анатомически: склероз легких, расширение бронхов, гипертрофия правого сердца. В основе болезни (описана в 1901 г.) по Айерца. поражение легочной артерии; по Эскудеро — поражение легких первично, а асистолия вторично. Причина: наследственный или приобретенный сифилис.

АИКМОФОБИЯ (Aichmophobia): боязнь причинить себе вред острым режущим предметом (Циген).

АИНГУМ (Ainhum): свойственная неграм болезнь, которая состоит в утолщении и постепенном отпадении 4-го или 5-го пальца стопы.

АИОДИН (анодин): препарат щитовидной железы, содержит 0,4% пода.

АИРОГЕН: галлусовокислый висмут-оксинодид. Применяется как аироформ.

АИРОЛ: bismuthum oxyjodatum subgallicum; антисептическая присыпка. *Аириловая паста Бруна*: Aiol 5,0, mucilago gummi arab., glycerini aa 10,0; bolus alba 20,0. Антисептическое средство для ран.

АИРОФОРМ: галлусовокислый висмут-оксинодид. Антисептическое и высушивающее средство.

АЙВА: Cydonia vulgaris.

АКАЛЬКУЛИЯ: потеря способности считать при повреждении левого полушария мозга.

АКАНТОЗ (Akanthosis) (Аушниц): кожная болезнь, суть которой сводится к аномалии роста зубчатого слоя кожицы. Различные формы: *Гиперкантоз* — ненормальное разрастание зубчатого слоя, тип: бородавки, кондиломы. *Акантолиз или анакантоз*: атрофия зубчатого слоя; тип: пузырьный лишай (pemphigus), см. *Эпидермолиз*. *Паракантоз*, паратипический рост зубчатого слоя, тип: альвеолярная акантома, кожный рак. *A. nigricans*: серобурая пигментированная гипертрофия кожных сосочков, находящаяся в связи с раком подчревной области и ведущая либо к шероховатости кожи, либо к складкам (сип. Дистрофия сосочковая и пигментная — Kerato-sisnigricans).

AKANTHOSIS VERRUCOSA SEBORRHOICA = verruca senilis (см.).

АКАНТОЛИЗ (Akantholysis): см. Акантоз. *A. bullosa*: см. *Эпидермолиз*.

АКАНТОМА АЛЬВЕОЛЯРНАЯ (Akanthoma alveolare) (Аушниц): различные формы кожной эпителиомы. *A. стафилогенная* (*A. staphylogenes*) (Герцог) = molluscum contagiosum.

АКАНТОПЕЛИС: шипообразный таз (Г. Ф. Кисинал), благодаря острым краям

и зубцам на лопном гребешке, промонтории, крестцово-подвздошном сочленении и foramina obturatoria.

АКАПНИЯ (А. Моссо): уменьшенное количество углекислоты в крови; повидимому, причина горной болезни (см.).

ACARDIACUS: лишенный сердца, уродство. *A. akormus*, голова сформирована, грудь и живот отсутствуют или рудиментарны.: *A. acerphalus*, отсутствует голова, грудь рудиментарна, таз и прилегающие части развиты. *A. amorphus*, безформенная масса с рудиментами органов. *A. anceps*, туловище развито, голова и конечности также, сердце рудиментарно.

АКАРОФОБИЯ: боязнь чесотки.

АКАТАГРАФИЯ: см. А г р а м м а т и з м.

АКАТАФАЗИЯ: см. А г р а м м а т и з м.

АКАТЕКТИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА: см. Ж е л т у х а.

АКАТИЗИЯ (Haskover): неспособность долгое время сидеть, при истерии и неврастении.

АКАЦИЯ КАТЕХУ: см. К а т е х у.

АКАЦИЯ СУМА: см. К а т е х у.

АКЕСТОМА: грануляционная ткань, из которой впоследствии образуется рубец.

АКИДОПЕЙРАСТИКА: вкалывали иглолки в верхушку сердца и в более глубокие части с диагностической целью при сомнительной смерти.

AKINESIA ALGERA (Mochins): неподвижность вследствие психически обусловленной боли при движении (сип. Атретизия).

АКИНЕЗИС: неподвижность, паралич.

АКИНЕТИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ: см. А м и т о з.

АКИНЕТОН: натриевая или кальциевая соль фталевокислого монобензиламида.

АКИУРГИЯ: область хирургии, обнимающая кровавые операции с помощью режущих и колющих инструментов.

АКИЭЗИС (Akyesis): 1) отсутствие беременности; 2) невозможность беременности; 3) бесплодие.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ: приспособление к данному климату.

АККОМОДАЦИОННАЯ ШИРИНА: расстояние между ближайшей и дальнейшей точкой ясного зрения.

АККОМОДАЦИОННЫЙ СПАЗМ ИЛИ ПАРАЛИЧ: судорога или паралич ресничной мышцы (глазодвигательный нерв).

АККОМОДАЦИЯ: приспособление, установка глаза для близкого и далекого расстояния.

АККУМУЛЯТОР: прибор для скопления электрической энергии.

АКМЕ: высшая точка (напряжения) болезни или лихорадки. (Син. Fastigium)

АКНЕ (Acne): воспаление волосного и сального фолликула и окружающей ткани. Фолликулит (см.). *A. artificialis*: фолликулит, вызванный внешним раздражением, напр. дегтем или лекарствами (йод, бром). *A. cachecticum*: вялые пустулезные узелки на спине и животе у истощенных субъектов. *A. ciliaris*: острое ограниченное воспаление одной или нескольких ресниц в виде мелких, большей частью нагнаивающихся узелков. См. Ячмень (hordeolum). *A. confluens*: отдельные узелки сливаются в большие гнезда (син. *A. conglobata*). *A. cornea*, *s. keratosa*: узелки не нагнаиваются, а сильно ороговели (см. Кератоз). *A. disseminata*: на коже лица, груди и спины у молодых людей находят отдельные красные, величиною от просынного зерна до боба, конические возвышенные узелки. *A. frontalis* = *A. varioliformis*. *A. lupus* = *A. teleangiectodes*. *A. mentagra*: сикоз (син. Mentagra, Folliculitis barbae). *A. sicca* (дегтярная акне) = *A. artificialis*. *A. rosacea*: развивается только на лице, связано с расстройствами в женской половой сфере или в пищеварительных органах. Первая степень состоит в интенсивном покраснении, вследствие значительной васкуляризации и развития телеангиэктазий. На этой почве частым осложнением является *A. pustulosa* и *indurata*. Вторая и третья степень характеризуется развитием соединительно тканых шарообразных опухолей различной величины (ринофима, см.) и сильным обезображиванием носа и других частей лица (син. Gutta rosacea). *A. scrophulosorum*: акне-подобная разновидность lichen scrophulo-

sorum (см.), встречающаяся преимущественно на ягодицах. *A. sebacea*: себоррея (см.). *A. simplex s. vulgaris*: обычная связанная с образованием угрей (comedo) сыпь в виде мелких, рассеянных красных узелков (*A. punctata*) или в виде больших нагнаивающихся узелков (*A. pustulosa*), или же, если нет нагноения, в виде более твердых возвышений (*A. indurata*). *A. syphilitica*: пустулезный сифилис. *A. teleangiectodes* = lupus follicularis disseminatus, см. Волчанка. *A. urticata*: разновидность *A. varioliformis*, в виде остро появляющихся зудящих волдырей. *A. varioliformis*, *A. frontalis* (Гебра): плоские узелки, величиною с конопляное зерно, или сразу пустулы, не сопровождаются развитием угрей (comedones). На верхушке узелка появляется плоский струнник (*A. necrotica*), который позже опускается ниже уровня остальной поверхности тела и заживает, образуя слегка углубленный рубец.

АКНЕКЕЛОИД: dermatitis papularis capillitii Kaposi-folliculitis nuchae scleroticans.

АКНИТ (Aknitis (Бартеlemi): акне-подобное рассеянное заболевание кожи (фолликулит), связанное с малокровием; большей частью сопровождается нагноением лежащих под кожей узелков и образованием рубцов. Повидимому, в происхождении болезни играет роль инфекция.

АКОАСМА: галлюцинация слуха — сильный шум, гром и т. п. См. Фонема.

АКОИН: патентованное название ряда средств из группы «алкилоксифенилгуанидин». Акоин обладает анестетическими и дезинфицирующими свойствами и заменяет кокаин.

АКОКАНТЕРА (Acocanthera Schimper): африканское растение из сем. аросунасеae, из которого добывается убаин, тождественный с строфантинном.

АКОМАТОЛ: немецкий инсулин.

АКОНИТИН: $C_{34}H_{47}O_{11}N$, алкалоид из корня Aconitum napellus (сем. ranunculaceae); антиневралгическое и антиревматическое. Сильный яд.

АКОПИРИН: см. Ацетопирин.

АКОРИЯ: врожденный недостаток зрачка; также отсутствие чувства сытости (Син. Аппетестия).

АКОРМУС (Akormus): уродство, отсутствие туловища. Урод состоит из черепа и лица с прикрепленной к шее пуповиной. См. *Ascardiasus*, *Anideus*.

АКРАНИЯ: врожденное отсутствие черепа.

АКРАТОПЕГИ: бедные минеральными составными частями индифферентные холодные источники.

АКРАТОТЕРМЫ: теплые источники (выше 20°), отличающиеся малым содержанием минеральных составных частей (меньше 0,6 на 1 л) и газов, чистотой и мягкостью воды.

АКРИДИН: дибензопиридин, $C_{18}H_9N$; производное антрацена.

АКРИМОНИЯ: острота. По воззрениям старой гуморальной патологии — гипотетическое болезнетворное вещество в крови.

АКРОАСФИКСИЯ *A. атрофическая*: перманентный цианоз рук и пальцев, трофическое расстройство. *A. гипертрофическая*: цианоз и гипертрофия мягких частей рук и пальцев (при незначительных парестезиях).

АКРОДЕРМАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ АТРОФИЧЕСКИЙ: прогрессирующая атрофия кожи, начинающаяся на периферических частях. *Акродерматит хронический гнойный* [*A. continua suppurativa* (Галлопо) (Hallerseau)]: хроническое образование фликтен на руках и ногах.

АКРОДИНИЯ: отравление спорыньей, похожа на пеллагру, наблюдалась эпидемически в Париже в 1828 и 29 гг., позже также в других местах. Болезнь начинается желудочным расстройством, за которым следует эритема на конечностях, которая нередко распространяется на туловище, лицо и все тело и сопровождается сильными болями в конечностях, ощущением ползания мурашек, онемения (син. Эпидемическая эритема).

АКРОЛЕИН: аллилальдегид; образуется при неполном окислении жиров и глицерина; жидкость крайне неприятного запаха.

АКРОМЕГАЛИЯ: увеличение конечностей тела (П. Мари, 1885), обычно появляющееся в молодом возрасте и медленно развивающееся расстройство роста: ноги и руки увеличиваются, становятся неуклюжими, «лапообразными», увели-

чиваются также нос, губы, язык; нижняя челюсть выступает вперед. Анатомически находят гипертрофию мозгового придатка, иной раз с коллоидным перерождением, аденому или саркому его. См. *Пахиакрыя*. **Остеоартропатия гипертрофическая**. **Мокросомия**.

АКРОМЕЛАЛГИЯ: см. **Эритромелалгия**: покраснение, припухание, болезненность пальцев рук и ног с головной болью и рвотой. Ангioneвроз, наблюдающийся чаще у мужчин [Герард (Gerhardt)].

АКРОМИКРИЯ: предложенное Стембо название для похожего на склеродактилию страдания, при котором вслед за образованием язв наступает укорочение рук и ног.

АКРОМИОН: плечевой отросток, наружное продолжение *spina scapulae*.

АКРОПАРЭСТЕЗИЯ (*Akroparaesthesia*) (Ф. Шульце, 1893): болезненные ощущения, жжение, онемение в руках и пальцах, реже в ногах. Встречается преимущественно у женщин, особенно у старцев, в климактерическом периоде.

АКРОТИЗМ: отсутствие пульса.

АКРОТИМИОН (*Akrothymion*): см. **Паннелома**.

АКРОФОБИЯ: чувство страха на возвышенных местах.

АКРОХОРДОН (Гален): небольшой, часто на длинной ножке, висячий полип кожи, особенно век. См. **Бородавка**.

АКРОЦИАНОЗ ХРОНИЧЕСКИЙ-АНЭСТЕТИЧЕСКИЙ (Кассирер): постепенное посинение пальцев рук и ног с потерей всех видов чувствительности, кольцеобразно отграничиваемой от нормальных частей. Типичный акроцианоз [Крок (Crocq)] не сопровождается расстройством чувствительности. См. **Болезнь Репо**.

АКСЕНФЕЛЬД-МОРАКСА ДИПЛОБАЦИЛЛ: см. **Диплобацилл**.

АКСОН: см. **Отросток осевого цилиндра**.

АКТИВАТОР: средство для активирования.

АКТИВИРОВАНИЕ: приведение тела или вещества в деятельное состояние. *A. протоплазмы*: повышение деятель-