

В.Н. Каверзнев

Охота на кабанов

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 796
ББК 75.5
В11

В11 **В.Н. Каверзнев**
Охота на кабанов / В.Н. Каверзнев – М.: Книга по Требованию, 2013. – 58 с.

ISBN 978-5-458-40822-6

Всё о кабанах и охоте на них.

ISBN 978-5-458-40822-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

О КАБАНАХ И ИХ ЖИЗНИ

В отряде парнокопытных (Ordo Artiodactyla) кабаны представляют особый род (Genus sus) в семействе свиней (familia suidae). Жвачки они не жуют.

Кабанов фауны СССР делили до сих пор на два вида: 1) *Sus scrofa* L. и 2) *Sus leucomystax* Temm.

Первый вид отличается одноцветной, без светлой полосы, головой и обитает в европейских странах, а также в ближайшей части Азии.

Второй вид имеет светлую полосу по бокам головы и принадлежит к фауне восточной Азии.

Первую форму подразделяют в свою очередь на три подвида: 1) *Sus scrofa atilla* Thomas, 2) *Sus scrofa lybicus* Grau и 3) *Sus scrofa nigripes* Blanf.

Первый из этих трех подвидов представляет очень крупного зверя и относится к западно-европейской фауне. Он держится в СССР только у западной границы страны. Второй подвид является мелкой формой и обитает в Закавказье. А третий, светлый с черными ногами, крупный кабан держится в северо-восточном углу Туркестана.

Остальные формы весьма мало изучены. Это больше всего относится к формам восточным.

В 1930 году в докладах Академии наук СССР появилась на английском языке небольшая работа Г. П. Адлерберга: „Предварительный обзор русских и монгольских кабанов“.

Этот зоолог подразделяет кабанов фауны СССР на пять подвидов.

1. *Sus scrofa scrofa* Linn.

Этот черновато-бурый с переходом к рыжеватым оттенкам на голове и пахах кабан отличается тем, что голова у него светлеет по направлению к щекам, горлу и концу морды. Уши у него темные в общем, у основания более светлобурые и почти черные к концу. Хвост его того же окраса, как и спина, и заканчивается совершенно черными волосами. Подшерсток рыжевато-красно-бурый.



Рис. 1 Голова кабана

Обитает в Западной Европе и доходит в распространении на восток до Беловежа. Южные и восточные границы распространения его, говорит этот автор, не вполне выяснены. Эта форма проникает в западные районы СССР, заходя иногда за пределы б. Смоленской губернии.

2. *Sus scrofa atilla* Thomas.

Шкура у этого кабана темная, но светлее, чем у типичной формы. Черные пятна перемежаются на ней с желтовато-серыми или

серовато-желтыми, происходящими от светлых вершин волос.

Область распространения в СССР этого подвида чрезвычайно обширна.

Переходит он из южной Европы у румынской границы и распространяется севернее в Белоруссии до верховьев Немана, где встречается с первой формой,

переходящей от Беловежа. Описываемая форма обитает также на Кавказе и в Закавказье. Весьма вероятно, что к ней же относятся волжские кабаны.

Что касается кабанов Закавказья, то Г. П. Адлерберг считает возможным, что кабаны, встречающиеся к югу от главного Кавказского хребта, будут при большем накоплении материалов выделены в особое племя (*natio*),

На основании просмотренных материалов натуралист этот не усматривает оснований согласиться с отнесением закавказского кабана к описанному Греем подвиду (*Sus scrofa lybicus* Gray), о котором упомянуто выше.

3. *Sus scrofa nigripes* Blanford. Распространен по Туркестану, Семиречью и Тянь-Шаню.

Шкура у этого зверя светлее, чем у других форм, и изменяется в окраске, особенно по временам года, от светлосерого или светлобурого до соломисто-желтого. Последняя окраска характерна для зимних шкур.

Ноги у этих кабанов темнобурые, чаще с красновато-рыжим оттенком или черные. Уши рыжие или рыжевато-бурые. Хвост светлый, одного цвета со спиной, с рыжевато-бурыми или бурыми волосами на конце. Подшерсток на спине и боках немного светлее, чем у типичной формы, достигая к хвосту бледно-желтоватого цвета.

Лишенные подшерстка летние линючие шкуры— буровато-песочные или бледносерые.

4. *Sus scrofa raddeanus* subsp. nova. Распространен по южному Забайкалью к востоку от гор Большого Хингана.

Спина у этого кабана оливково-буроватая, довольно светлая, но темнеющая к бокам и на плечах. Также окрашены уши. Окраска темнеет на отдельных участках головы, вследствие примеси темнобурых и черных волос.

Горло и паха серебристо-серые. Ноги темнобурые. Хвост окрашен одинаково со спиной, но оканчивается темнобурыми волосами. Подшерсток довольно светлый

Описание это сделано Г. П. Адлербергом по одному экземпляру самки из Кантея.

5. *Sus scrofa continentalis* Nehring. Обитает в бассейне Амура от гор Большого Хингана к востоку до береговой полосы, а также к югу по Уссури до района Владивостока.

Окраска этого кабана крайне изменчива и потому не приводится.

Эта интересная работа, повидимому, еще не закончена и может быть дополнена новыми формами или понести другие изменения, если автору удастся разрешить некоторые дополнительные вопросы на основании более обширных материалов.

Являясь предком домашней свиньи, кабан очень близок к ней по внешности, особенно к ее малокультурным разновидностям. Отличается он от домашней свиньи несколько иными пропорциями. Так, он более высок на ногах и несколько укорочен по сравнению с нею.

Впрочем встречались свиньи у смоленских крестьян в семидесятых годах прошлого века, которые были вздернуты на ногах, коротки и лещеваты, отличаясь от диких главным образом по окрасу.

Лещеватость, то-есть сплюснутость в длинных и плоских ребрах, составляет типичную особенность дикого кабана. Грудь у него глубока по направлению вниз от холки, но узка.

Главным же отличием дикого кабана от домашней свиньи служит огромная голова, длинная морда и общая перегруженность высокого передка по сравнению с задом.

Рыло у этого зверя очень длинное и сильное и заканчивается сильным очень подвижным „пятачком“. В длину этот зверь достигает двух метров и метра в высоту. Весом крупные экземпляры доходят до трехсот килограммов. Хвост у кабана изогнут штопором, как у простой домашней свиньи. Уши стоячие и очень строгие.

Волосяной покров кабана состоит из упругой прочной щетины, особенно длинной по хребту и у холки, и грубого пуха. Длина щетины на хребте достигает иногда двенадцати сантиметров.

Типичный окрас большинства кабанов темнобурый, местами переходящий в серый или золотисто-рыжий оттенок. Ноги почти черные.

Более светлые места охватывают пахи и бока морды. Наблюдаются случаи частичного и полного альбинизма.

Челюсти этого зверя снабжены весьма серьезным оружием—двумя парами сильных и острых трехгранных клыков, загнутых кверху и несколько назад. Клыки нижней челюсти значительно длиннее клыков верхней. Верхний и нижний клык каждой стороны плотно соприкасаются один с другим и при движении челюстей как бы натачивают друг друга.

Развиваются клыки уже на втором году жизни кабана, достаточного развития достигают в три года, и тогда нижние клыки становятся длиннее верхних. Продолжая расти, клыки все более и более выдаются за пределы прикрывающих их губ и особенно грозное оружие представляют у самцов в пяти-симилетнем возрасте, когда торчат в стороны, как ножи.

Самец в этом возрасте называется у охотников секачем оттого, очевидно, что способен сечь, то-есть рубить клыком.

Нужно отметить, что клыки самок значительно менее развиты, чем клыки самцов и далеко не так опасны. У самцов они достигают в длину десяти сантиметров.

После шести-семи лет клыки начинают круто загибаться серпом и теряют уже способность так рубить, как торчащие в стороны наподобие ножа у секачей. Поэтому удар старого кабана не в такой степени опасен противнику, как удар хорошо вооруженного секача. Бывает, что клыки кабана загибаются кольцом и врезаются в носовые кости зверя, причиняя ему этим большие страдания. Бьет кабан-самец обыкновенно

одним коротким ударом снизу вверх, стремительно бросившись на противника, и после удара обычно проносится дальше, не возвращаясь к врагу. О свинье сказать этого нельзя. Та нередко возвращается и манера пользования зубами у нее другая. Она дает хватки, отрывая иногда куски мяса, а не „сечет“, как самец.

Издаваемые кабаном звуки почти не отличаются от тех, которые издает домашняя свинья, он также хрюкает и визжит, как она.




Рис. 2. Череп кабана.

Только дикий кабан не в такой мере визглив, как домашняя свинья. Раненый взрослый кабан не визжит, а переносит ранение молча. Даже самки и поросята не часто подают голос, будучи ранеными.

Но зато на нападение собак они реагируют голосом, „гудят“, как, по Диннику, называют это кавказские охотники. Динник передает это звуками: „ду-ду-ду“ или „о-о-о“.

Подобными звуками реагируют и домашние свиньи на приближение волка или на нападение собак, и второй из приведенных звуков верней, чем первый. Кажется, что еще ближе будет звук: „хо-хо-хо“. Гортанный оттенок определенно в нем чувствуется.

Во время драки, угрожая комунибудь, взрослые кабаны производят особенно могучие отрывистые звуки, „режут“, по выражению охотников. Визжат больше самки и только тогда, когда в них или в поросенка влепятся собаки.

Во время течки собирающиеся возле самки кабаны изменяют своей молчаливости, и тут можно слышать „гудение“ самок, „рев“ самцов и отчаянный визг.

Кабаны ведут обычно стадный образ жизни. Одни стада их состоят иногда из нескольких самок и поросят двух поколений, другие представляют гарем из сильного секача и нескольких самок. Стада этого типа держатся в период течки, а потом расходятся.

Старые самцы отходят от стада и ведут одинокую жизнь, за что они называются одинцами.




Рис. 3. Секач.

Отход их от стада объясняется частью тем, что к старости кабаны становятся чрезвычайно раздражительными и склонными к дракам, причем в бою с мощными секачами им приходится терпеть поражение. Покидают они стадо уже в том состоянии, когда их еще зовут секачами, а иногда и вскоре после наступления половой зрелости.

С конца апреля по июнь кабаны линяют, теряя шерсть и щетину, и забираются в это время в гущарь,

а то наваливают огромные кучи хвороста, листьев и всякого мусора и подбиваются под них, спасаясь этим от насекомых. Укусы насекомых, за утратой волосного покрова, для них в это время очень чувствительны.

Любят они в период линьки погружаться в грязь, покрывающую их толстым слоем, защищающим от укусов мошкеры.

Спариваются дикие кабаны один раз в году, а именно в декабре, причем течка длится свыше месяца.

К этому времени одиноцы возвращаются в стадо, отгоняют неспособных сопротивляться им молодых кабанов, а с более или менее равносильными вступают в ожесточенные схватки.

Побежденные и отогнанные самцы составляют обычно обособленные небольшие стада, которые бродят неподалеку от того гурта, откуда они изгнаны.

Потерпевший поражение самец отступает обыкновенно своевременно, и смертные исходы боев наблюдаются крайне редко. Последнее находит объяснение между прочим в том, что у кабанов на местах, наиболее подверженных ударам противника, расположен участок особо утолщенной кожи. По Н. Я. Диннику, этот участок кожи называют на Кавказе калканом. „Калкан,—пишет Н. Я. Динник,—начинается от задней части шеи, тянется через лопатки и оканчивается на боковых частях груди позади лопаток“. Наибольшей толщины достигает он на плечах и лопатках. По данным этого натуралиста, достигает у старых самцов четырех сантиметров. К периоду течки, значит и боев, калкан утолщается по сравнению с тем, каким он был летом. Он очень вязок и упруг, с трудом поддается ножу и даже не пробивается картечью. Пробивает его только пуля. Ограждены калканом от ударов только самцы, у самок его не бывает.

Некоторые наблюдатели отмечают своеобразность в ухаживании кабанов за самками. Они тычут их рылом в какие попало места, и чем грубее проявляются подобные приемы, тем это, повидимому, приятнее сам-

кам, хотя последние от этих любезностей нередко визжат.

Срок беременности дикой свиньи около четырех с половиной месяцев. Супоросая свинья prepares себе заблаговременно логовище для родов в густых зарослях и устилает его листьями, мхом и ветошью окружая его валиком, наподобие большого птичьего гнезда. В этом логовище здоровая самка мечет в апреле-мае до десятка поросят. Более слабые самки приносят штук шесть. Чаще встречается в гнезде штук восемь поросят, из которых вырастает половина. Как исключение встречается и дюжина.

Поросята рождаются с продольными полосами, а в июне-июле утрачивают эту полосатость. Иногда полосатость сохраняется в некоторой степени и до августа.




Рис. 4. Поросенок.

С полмесяца поросята остаются при матери в логовище и мать покидает их только изредка, почувствовав голод. Ко второй половине месяца после родов она постепенно покидает с ними логовище и начинает бродить по лесу, сначала не очень далеко отходя от гнезда. Здесь молодежь постепенно приучается к самостоятельному добыванию пищи и прежде всего пытается рыть землю. Поросята сосут матку некоторое время и после того, как возьмутся за пищу.

Матка очень ревниво относится к детям и при опасности самоотверженно их защищает.

Очень часто несколько маток с поросятами сходятся вместе и образуют стадо. Иногда несколько маток даже поросются в общем логовище. Брэм говорит, что осиротевших поросят принимают под свое попечение остальные свиньи, заменяя им утерянную мать.

К полутора годам самки достигают половой зрелости и покрываются самцами. Иногда самка покрывается самцом лишь по третьему году. Самцы становятся половозрелыми раньше, но в раннем возрасте их не допускают до случки старые кабаны. Полного развития достигают кабаны после четырех лет.

За границей, в особенности в Германии, существует много терминов для наименования кабанов в разных возрастах. В СССР это тоже местами наблюдается. Так, Черкасов в „Записках охотника восточной Сибири“ пишет, что там кабанов до года называют просто поросятами, двухлеток — лонскими поросятами, трехлеток — третьяками, четырехлеток — малыми секачами, а пяти-шестилетних кабанов — матерыми секачами. Термин „секач“ широко распространен не только в Сибири, как распространен и не упомянутый Черкасовым термин „одинец“.

Устраивают логовища кабаны не только для вывода, но и для холостых особей и даже для целых стад. Как все свиньи, в жаркое время они любят купаться и лежать в грязи. Потребность купаться они удовлетворяют и в холодное время, разламывая иногда ледок. Особенно проявляют эту потребность самцы в период течки.

Осенью и вообще в холодные дни разделявают они в земле углубление, устилают его ветошью и здесь укладываются друг возле друга целым стадом. Предпочитают они залегать в чаще.

Из внешних чувств меньше всего развито у кабанов зрение, но обоняние и слух у них очень развиты. Кабан способен наскочить вплотную на стоящего неподвижно охотника, а малейший изданный последним