



ЖИВОТНЫЕ

ВСЕ ОБИТАТЕЛИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

Дэвид Элдертон

ЖИВОТНЫЕ

ВСЕ ОБИТАТЕЛИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ



#эксмоиздательство


Москва

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 8

ОБЫКНОВЕННЫЙ, или БЕСХВОСТЫЙ, ТЕНРЕК	14
ВИЛОРОГАЯ АНТИЛОПА, или ВИЛОРОГ	15
ЧЕРНОПЯТНАЯ АНТИЛОПА, или ИМПАЛА	16
ГРИВИСТЫЙ БАРАН	17
СПРИНГБОК, или АНТИЛОПА-ПРЫГУН	18
АМЕРИКАНСКИЙ БИЗОН	19
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗУБР	20
ГАУР	21
АЗИАТСКИЙ, или ВОДЯНОЙ, БУЙВОЛ	22
БОРОДАТЫЙ, или БЕЗОАРОВЫЙ, КОЗЕЛ	23
ГОРНЫЙ, или АЛЬПИЙСКИЙ, КОЗЕЛ	24
СУМАТРАНСКИЙ СЕРАУ	25
ГОЛУБОЙ ГНУ	26
АНТИЛОПА ТОПИ, или КОРРИГУМ	27
ГАЗЕЛЬ ТОМСОНА	28
ГАЗЕЛЬ-ДОРКАС	29
ГИМАЛАЙСКИЙ ТАР	30
ЧЕРНАЯ АНТИЛОПА	31
ОБЫКНОВЕННЫЙ ДИК-ДИК	32
СНЕЖНАЯ КОЗА	33
АРАВИЙСКИЙ ОРИКС	34
ОРИБИ	35
ОВЦЕБЫК, или МУСКУСНЫЙ БЫК	36
ГОРНЫЙ БАРАН, или АРХАР (АРГАЛИ)	37
СНЕЖНЫЙ БАРАН, или ТОЛСТОРОГ	38
МАЛОАЗИАТСКИЙ МУФЛОН	39
ЯК	40
ГОРНЫЙ БОЛОТНЫЙ КОЗЕЛ, или ГОРНЫЙ РЕДУНКА	41
СЕРНА	42
САЙГАК	43
ЖЕЛТОСПИННЫЙ ДУКЕР	44
АФРИКАНСКИЙ, или ЧЕРНЫЙ, БУЙВОЛ	45



Леопард

ГИГАНТСКАЯ КАННА	46
ЧЕТЫРЕХРОГАЯ АНТИЛОПА	47
БОЛЬШОЙ КУДУ	48
ДВУГОРЫЙ ВЕРБЛЮД, или БАКТРИАН	49
ОДНОГОРЫЙ ВЕРБЛЮД, или ДРОМАДЕР	50
ЛАМА	51
ВИКУНЬЯ	52
КОСУЛЯ	53
ОЛЕНЬ АКСИС	54
ЛОСЬ	55
БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ	56
ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ	57
ЛАНЬ	58
ОЛЕНЬ ДАВИДА, или МИЛУ	59
ИНДИЙСКИЙ МУНДЖАК	60
БЕЛОХВОСТЫЙ, или ВИРГИНСКИЙ, ОЛЕНЬ	61
ОБЫКНОВЕННЫЙ ПУДУ	62
СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ, или КАРИБУ	63
ЖИРАФ	64
БЕГЕМОТ, или ГИППОПОТАМ	65
СИБИРСКАЯ КАБАРГА	66
БАБИРУССА	67
БОЛЬШАЯ, или ИСПОЛИНСКАЯ ЛЕСНАЯ, СВИНЬЯ	68
КИСТЕУХАЯ, или РЕЧНАЯ, СВИНЬЯ	69
КАБАН, или ДИКАЯ СВИНЬЯ	70
ОШЕЙНИКОВЫЙ ПЕКАРИ	71
МАЛАЯ ПАНДА	72
ОБЫКНОВЕННЫЙ ШАКАЛ	73
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА	74
КОЙОТ, или ЛУГОВОЙ ВОЛК	75
ВОЛК ОБЫКНОВЕННЫЙ	76
ДИНГО	77
ЧЕПРАЧНЫЙ ШАКАЛ	78
ГРИВИСТЫЙ ВОЛК	79
КРАСНЫЙ ВОЛК, или ДХОЛЕ	80
ГИЕНОВАЯ СОБАКА	81
ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА	82
БОЛЬШЕУХАЯ ЛИСИЦА	83
СЕРАЯ ЛИСИЦА	84
КУСТАРНИКОВАЯ СОБАКА	85
ПЕСЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ	86
РЫЖАЯ ЛИСИЦА	87
ФЕНЕК	88
СИБИРСКАЯ ХАСКИ	89
ГЕПАРД	90

СТЕПНАЯ РЫСЬ, или КАРАКАЛ	91
ДОМАШНЯЯ КОШКА	92
РЫСЬ ОБЫКНОВЕННАЯ	93
БАРХАННЫЙ КОТ	94
ЛЕСНАЯ, или ДИКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ, КОШКА	95
ОЦЕЛОТ	96
СЕРВАЛ	97
РЫЖАЯ РЫСЬ	98
ДЫМЧАТЫЙ ЛЕОПАРД	99
ЛЕВ	100
ЯГУАР	101
ЛЕОПАРД	102
АМУРСКИЙ, или УССУРИЙСКИЙ, ТИГР	103
БЕНГАЛЬСКИЙ ТИГР	104
ПУМА, или КУГУАР	105
ЯГУАРУНДИ	106
СНЕЖНЫЙ БАРС	107
СЕРЫЙ ИНДИЙСКИЙ МУНГО	108
СУРИКАТА	109
ПЯТНИСТАЯ ГИЕНА	110
ЗЕМЛЯНОЙ ВОЛК	111
ПОЛОСАТЫЙ СКУНС	112
МОРСКАЯ ВЫДРА, или КАЛАН	113
АМЕРИКАНСКАЯ НОРКА	114
РОСОМАХА	115
ОБЫКНОВЕННАЯ ВЫДРА	116
ЛЕСНАЯ КУНИЦА	117
СОБОЛЬ	118
ОБЫКНОВЕННЫЙ БАРСУК	119
КАПСКИЙ МЕДОЕД	120
ЧЕРНЫЙ, или ЛЕСНОЙ, ХОРЕК	121
ГОРНОСТАЙ	122
ГИГАНТСКАЯ ВЫДРА	123
АМЕРИКАНСКИЙ БАРСУК	124
МОРЖ	125
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ КОТИК	126
КАЛИФОРНИЙСКИЙ МОРСКОЙ ЛЕВ	127
ТЮЛЕНЬ-ХОХЛАЧ	128
МОРСКОЙ ЗАЯЦ, или ЛАХТАК	129
МОРСКОЙ ЛЕОПАРД	130
ЮЖНЫЙ МОРСКОЙ СЛОН	131
БЕЛОБРЮХИЙ ТЮЛЕНЬ, или ТЮЛЕНЬ-МОНАХ	132

ГРЕНЛАНДСКИЙ ТЮЛЕНЬ, или ТЮЛЕНЬ-ЛЫСУН	133
ОБЫКНОВЕННЫЙ ТЮЛЕНЬ, или ЛАРГА	134
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ КАКОМИЦЛИ	135
БЕЛОНОСАЯ НОСУХА, или КОАТИ	136
КИНКАЖУ	137
ЕНОТ-ПОЛОСКУН	138
БОЛЬШАЯ ПАНДА, или БАМБУКОВЫЙ МЕДВЕДЬ	139
МАЛАЙСКИЙ МЕДВЕДЬ, или БИРУАНГ	140
ОЧКОВЫЙ МЕДВЕДЬ	141
ЧЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ, или БАРИБАЛ	142
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ	143
ГРИЗЛИ	144
КАДЬЯКСКИЙ МЕДВЕДЬ	145
БЕЛЫЙ, или ПОЛЯРНЫЙ, МЕДВЕДЬ	146
ГИМАЛАЙСКИЙ, или БЕЛОГРУДЫЙ, МЕДВЕДЬ	147
БИНТУРОНГ	148
ОБЫКНОВЕННАЯ ГЕНЕТТА	149
СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ КИТ	150
ГОЛУБОЙ, или СИНИЙ, КИТ	151
КИТ-ГОРБАЧ	152
ПЕСТРЫЙ, или ШАРОГОЛОВЫЙ, ДЕЛЬФИН	153
ДЕЛЬФИН-БЕЛОБОЧКА	154
ОБЫКНОВЕННАЯ ГРИНДА, или ЧЕРНЫЙ ДЕЛЬФИН	155
КОСАТКА	156
СЕРЫЙ, или КАЛИФОРНИЙСКИЙ, КИТ	157
АМАЗОНСКИЙ РЕЧНОЙ ДЕЛЬФИН, или ИНИЯ	158
БЕЛУХА	159
НАРВАЛ	160
ОБЫКНОВЕННАЯ МОРСКАЯ СВИНЬЯ, или АЗОВСКИЙ ДЕЛЬФИН	161
КАШАЛОТ	162
ОБЫКНОВЕННЫЙ ВАМПИР	163
ИНДИЙСКАЯ ЛЕТУЧАЯ ЛИСИЦА	164
МАЛЫЙ ПОДКОВОНОС	165
ВОДЯНАЯ НОЧНИЦА	166
РЫЖАЯ ВЕЧЕРНИЦА	167
ДЕВЯТИПОЯСНЫЙ БРОНЕНОСЕЦ	168
ШАРОВОЙ ТРЕХПОЯСНЫЙ БРОНЕНОСЕЦ	169
СУМЧАТЫЙ, или ТАСМАНИЙСКИЙ, ДЬЯВОЛ	170
ФИЛИППИНСКИЙ ШЕРСТОКРЫЛ, или КАГУАН	171
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ ОПОССУМ	172
КАМЕННАЯ КУНИЦА, или БЕЛОДУШКА	173
ДРЕВЕСНЫЙ КЕНГУРУ МАТЧИ	174
ВАЛЛАБИ ПАРРИ	175
БОЛЬШОЙ РЫЖИЙ КЕНГУРУ	176
КОЛЬЦЕХВОСТЫЙ, или ЖЕЛТОНОГИЙ СКАЛЬНЫЙ, ВАЛЛАБИ	177
ПЯТНИСТЫЙ КУСКУС	178
ЛИСИЙ КУЗУ, или ЩЕТКОХВОСТ	179
КОАЛА	180
КИСТЕХВОСТЫЙ БЕТТОНГ	181
ДЛИННОНОГИЙ ПОТОРУ	182
ХОБОТНОГОЛОВЫЙ КУСКУС, или ПОССУМ-МЕДОЕД	183
ТАСМАНИЙСКИЙ, или МЕДВЕЖИЙ, ВОМБАТ	184
ЕВРОПЕЙСКИЙ, или ОБЫКНОВЕННЫЙ, ЕЖ	185
КАПСКИЙ ДАМАН	186
АМЕРИКАНСКИЙ ЗАЯЦ-БЕЛЯК	187
КАЛИФОРНИЙСКИЙ, или ЧЕРНОХВОСТЫЙ, ЗАЯЦ	188
ЗАЯЦ-РУСАК	189
ДИКИЙ КРОЛИК	190
ЧЕРНОГУБАЯ ПИЩУХА	191
ПЕСТРОСПИННЫЙ ПРЫГУНЧИК, или ПЯТНИСТАЯ ХОБОТКОВАЯ СОБАЧКА	192
ОБЫКНОВЕННЫЙ МЫШЕВИДНЫЙ, или МЫШИНЫЙ, ОПОССУМ	193
СЛОН АФРИКАНСКИЙ	194
УТКОНОС	195
АВСТРАЛИЙСКАЯ, или КОРОТКОКЛЮВАЯ, ЕХИДНА	196
БИЛБИ, или КРОЛИЧИЙ БАНДИКУТ	197
АФРИКАНСКИЙ ДИКИЙ ОСЕЛ	198

МУСТАНГ	199
ДОМАШНЯЯ ЛОШАДЬ	200
ТИБЕТСКИЙ КУЛАН, или КИАНГ	201
ОБЫКНОВЕННАЯ, или БУРЧЕЛЛОВА, ЗЕБРА	202
БЕЛЫЙ НОСОРОГ	203
ИНДИЙСКИЙ НОСОРОГ	204
ЧЕПРАЧНЫЙ ТАПИР	205
ПАНГОЛИН	206
КАРЛИКОВЫЙ, или ДВУПАЛЫЙ, МУРАВЬЕД	207
ДВУПАЛЫЙ ЛЕНИВЕЦ ГОФМАНА	208
ГИГАНТСКИЙ, или ТРЕХПАЛЫЙ, МУРАВЬЕД	209
ЧЕТЫРЕХПАЛЫЙ МУРАВЬЕД, или ТАМАНДУА	210
ДУРУКУЛИ МА	211
ЧЕРНАЯ КОАТА	212
БУРЫЙ РЕВУН	213
ШЕРСТИСТАЯ ОБЕЗЬЯНА ГУМБОЛЬДТА	214
КАРЛИКОВАЯ ИГРУНКА	215
ЗОЛОТИСТЫЙ ЛЬВИНЫЙ ТАМАРИН, или РОЗАЛИЯ	216
ИМПЕРАТОРСКИЙ ТАМАРИН	217
ЭДИПОВ ТАМАРИН, или ПИНЧЕ	218
БЕЛИЧИЙ САЙМИРИ	219
БЕЛОПЛЕЧИЙ КАПУЦИН	220
ЧЕРНОМОРДАЯ ОБЕЗЬЯНА, или МАРТЫШКА-ВЕРВЕТКА	221
КОЛОБУС, или ГВЕРЕЦА	222
СВИНОХВОСТЫЙ МАКАК, или ЛАПУНДЕР	223
МАКАК-РЕЗУС	224
БЕРБЕРСКАЯ ОБЕЗЬЯНА, или МАГОТ	225
МАНДРИЛ	226
НОСАЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ	227
ПЛАЩЕНОСНЫЙ ПАВИАН, или ГАМАДРИЛ	228
КРАСНОГОЛЕННЫЙ НЕМЕЙСКИЙ ТОНКОТЕЛ	229
ХУЛЬМАН	230
ГЕЛАДА	231
АЙ-АЙ, или МАДАГАСКАРСКАЯ РУКОНОЖКА	232
МАЛЫЙ ЮЖНЫЙ ГАЛАГО	233

ГОРИЛЛА	234
КАРЛИКОВЫЙ ШИМПАНЗЕ, или БОНОБО	235
ОБЫКНОВЕННЫЙ ШИМПАНЗЕ	236
ОРАНГУТАН ОСТРОВА БОРНЕО	237
БЕЛОУРУКИЙ ГИББОН, или ЛАР	238
ЧЕРНЫЙ ГИББОН, или СИАМАНГ	239
КОРОТКОХВОСТЫЙ ИНДРИ	240
ЛЕМУР КАТТА, или КОШАЧИЙ ЛЕМУР	241
ЛЫСЫЙ УАКАРИ	242
ПРЫГУН МОЛОХ, или ТИТИ-МАСКА	243
ДОЛГОПЯТ-ПРИВИДЕНИЕ (МАКИ-ДОМОВОЙ)	244
ИНДИЙСКИЙ СЛОН	245
ГОЛЫЙ ЗЕМЛЕКОП	246
АМЕРИКАНСКИЙ БОБР	247
МОРСКАЯ СВИНКА	248
МАРА	249
КАПИБАРА, или ВОДОСВИНКА	250
ГОРНАЯ ВИСКАЧА	251
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОДЯНАЯ ПОЛЕВКА	252
ОБЫКНОВЕННЫЙ ХОМЯК	253
НОРВЕЖСКИЙ ЛЕММИНГ	254
ПЕНСИЛЬВАНСКАЯ ПОЛЕВКА	255
ЕВРОПЕЙСКАЯ РЫЖАЯ ПОЛЕВКА	256
ОНДАТРА	257
ГУНДИ	258
ПУСТЫННЫЙ ТУШКАНЧИК	259
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ ДИКОБРАЗ	260
ГОФЕР БОТТА	261
СОНЯ-ПОЛЧОК	262
ОРЕШНИКОВАЯ СОНЯ, или МУШЛОВКА	263
ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ ДИКОБРАЗ	264
КРАСНОХВОСТАЯ ПЕСЧАНКА	265
МЫШЬ-МАЛЮТКА	266
ДОМОВАЯ МЫШЬ	267
СЕРАЯ КРЫСА, или ПАСЮК	268
НУТРИЯ	269
ДОЛГОНОГ	270
ЧЕРНОХВОСТАЯ ЛУГОВАЯ СОБАЧКА	271
ЮЖНАЯ ЛЕТЯГА	272
АЛЬПИЙСКИЙ СУРОК	273
ОБЫКНОВЕННАЯ БЕЛКА	274
СУСЛИК, или ЕВРОПЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯНАЯ БЕЛКА	275
СИБИРСКИЙ БУРУНДУК	276
ВОСТОЧНЫЙ БУРУНДУК	277
ДЮГОНЬ	278
ЛАМАНТИН	279
ОБЫКНОВЕННАЯ КУТОРА, или ВОДЯНАЯ ЗЕМЛЕРОЙКА	280
ОБЫКНОВЕННАЯ БУРОЗУБКА	281
КРОТ ОБЫКНОВЕННЫЙ	282
ТРУБКОЗУБ	283
ИМПЕРАТОРСКИЙ ПИНГВИН	284
УТКА КРЯКВА	285
СЕРЕБРИСТАЯ ЧАЙКА	286
ТУРУХТАН	287
ЗЯБЛИК ОБЫКНОВЕННЫЙ	288
РЕГГИАНОВА РАЙСКАЯ ПТИЦА	289
ПОПОЛЗЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ	290
ЗАРЯНКА	291
ОБЫКНОВЕННЫЙ, или ГОЛУБОЙ, ЗИМОРОДОК	292
БЕРКУТ	293
ЧЕРНЫЙ КОРШУН	294
АНДСКИЙ КОНДОР	295
СОКОЛ САПСАН	296
ОБЫКНОВЕННАЯ ПУСТЕЛЬГА	297
ПТИЦА-СЕКРЕТАРЬ	298
СОЛНЕЧНАЯ ЦАПЛЯ	299
СОЛОВЕЙ	300
БОЛЬШОЙ БАКЛАН	301
РОЗОВЫЙ, или ОБЫКНОВЕННЫЙ, ФЛАМИНГО	302
ОБЫКНОВЕННАЯ, или СЕРАЯ, НЕЯСТЬ	303
СЕВЕРНЫЙ КИВИ	304
МИССИСИПСКИЙ АЛЛИГАТОР	305
НИЛЬСКИЙ КРОКОДИЛ	306
ГАНГСКИЙ ГАВИАЛ	307
ЧЕРЕПАХА-ГОФЕР	308
ЗЕЛЕННАЯ ЧЕРЕПАХА	309
КАЙМАНОВА, или КУСАЮЩАЯСЯ, ЧЕРЕПАХА	310
КОЖИСТАЯ ЧЕРЕПАХА	311
КРАСНОУХАЯ ЧЕРЕПАХА	312
СЛОНОВАЯ ЧЕРЕПАХА	313

МОЛОХ	314
ЛОМКАЯ ВЕРЕТЕНИЦА	315
АМЕРИКАНСКИЙ ПРОТЕЙ	316
ГАДЮКА ОБЫКНОВЕННАЯ	317
УДАВ ОБЫКНОВЕННЫЙ	318
АНАКОНДА ОБЫКНОВЕННАЯ	319
ОБЫКНОВЕННЫЙ ХАМЕЛЕОН	320
ВАСИЛИСК ШЛЕМОНОСНЫЙ	321
УЖ ОБЫКНОВЕННЫЙ	322
ЧЕРНАЯ МАМБА	323
КОРАЛЛОВЫЙ АСПИД	324
КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА	325
НАСТОЯЩИЙ ГЕККОН	326
ЯДОЗУБ ЖИЛАТЬЕ	327
МОРСКАЯ ИГУАНА	328
ОБЫКНОВЕННАЯ, или ЗЕЛЕНАЯ, ИГУАНА	329
СРЕДНЯЯ ЯЩЕРИЦА	330
ОБЫКНОВЕННАЯ СТЕННАЯ ЯЩЕРИЦА	331
ТИГРОВЫЙ ПИТОН	332
КОРОТКОХВОСТЫЙ СЦИНК	333
КОМОДСКИЙ ВАРАН	334
ТЕХАССКИЙ ГРЕМУЧНИК	335
ПЛАЩЕНОСНАЯ ЯЩЕРИЦА	336
ВИЛЬЧАТАЯ СУМЧАТАЯ КВАКША	337
АМАЗОНСКИЙ АРЛЕКИН	338
ОБЫКНОВЕННАЯ, или СЕРАЯ, ЖАБА	339
КАМЫШОВАЯ ЖАБА	340
МАЛЕНЬКИЙ ДРЕВОЛАЗ, или ДРЕВОЛАЗ ПУМИЛИО	341
ЖАБА-ПОВИТУХА	342
ОБЫКНОВЕННАЯ КВАКША, или ДРЕВЕСНИЦА	343
ОБЫКНОВЕННАЯ ЧЕСНОЧНИЦА	344
ОСТРОМОРДАЯ ЛЯГУШКА	345
ЧЕРНАЯ САЛАМАНДРА	346
ОГНЕННАЯ САЛАМАНДРА	347
АЛЬПИЙСКИЙ, или ГОРНЫЙ, ТРИТОН	348
АМЕРИКАНСКАЯ ЛЯГУШКА-БЫК	349
КИТОВАЯ АКУЛА	350
ГИГАНТСКАЯ АКУЛА-МОЛОТ	351
ЯПОНСКИЙ МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ	352
ОБЫКНОВЕННЫЙ РЕЧНОЙ УТОРЬ	353

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ МУРЕНА	354
КАРП	355
ОБЫКНОВЕННАЯ ЩУКА	356
ОБЫКНОВЕННАЯ ТРЕХГЛАЯ КОЛЮШКА	357
ИНДИЙСКАЯ КРЫЛАТКА	358
ХРОМИС-КРАСАВЕЦ	359
ИЛИСТЫЙ ПРЫГУН	360
СИАМСКИЙ ПЕТУШОК	361
РЫБА-АНГЕЛ	362
АМФИПРИОН, или РЫБА-КЛОУН	363
РЫБА-ПОПУГАЙ	364
ЖЕЛТОПЕРЫЙ ТУНЕЦ	365
РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ	366
СЕМГА, или АТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛОСОСЬ	367
ДЛИННОИГЛАЯ РЫБА-ЕЖ, или ШИПАСТЫЙ ИГЛОБРОЮХ	368
СОМ ОБЫКНОВЕННЫЙ	369
МОРСКОЙ КОНЕК	370
ДЛИННОПЕРЫЙ КАЛЬМАР	371
ГИГАНТСКАЯ ТРИДАКНА	372
УСТРИЦА	373
КАРАКАТИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ	374
ПАУК-КРАБ, или ПАУК-БОКОХОД	375
ВОДЯНАЙ ПАУК, или СЕРЕБРЯНКА	376
ПАУК-КРЕСТОВИК	377
ГАСТЕРАКАНДА ДУГОВИДНАЯ	378
ПАУК-ПТИЦЕД	379
МЕКСИКАНСКИЙ КРАСНОКОЛЕННЫЙ ПАУК	380
ЧЕРНАЯ ВДОВА	381
ЛИСТОВИДКА	382
ЖУК-БОМБАРДИР	383
СКАКУН ПОЛЕВОЙ	384
МУСКУСНЫЙ УСАЧ	385
БОЖЬЯ КОРОВКА СЕМИТОЧЕЧНАЯ	386
ПЛАВУНЕЦ ОКАЙМЛЕННЫЙ	387
ЖУК-ОЛЕНЬ	388
МАЙСКИЙ ЖУК	389
ЖУК-НОСОРОГ	390
ЖУК-НАВОЗНИК	391
БРОНЗОВКА ЗОЛОТИСТАЯ	392
ЖУК-МОГИЛЬЩИК	393
КРЕВЕТКА-ЧИСТИЛЬЩИК	394
ЛОБСТЕР	395
МАНЯЩИЙ КРАБ	396
РАК-ОТШЕЛЬНИК	397
УХОВЕРТКА ОБЫКНОВЕННАЯ	398
КЛОП-ЧЕРЕПАШКА	399
ПЧЕЛА МЕДОНОСНАЯ	400
ЗЕМЛЯНОЙ ШМЕЛЬ	401
КОЧЕВОЙ МУРАВЕЙ-ЭЦИТОН	402
ЛЕСНОЙ МАЛЫЙ МУРАВЕЙ	403
ШЕРШЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ	404
ОБЫКНОВЕННАЯ ОСА	405
ТЕРМИТ	406
ГОЛУБЯНКА-ИКАР	407
ПЕРЕЛИВНИЦА ИВОВАЯ	408
ДАНАИДА МОНАРХ	409
МОРФО	410
АДМИРАЛ	411
ПТИЦЕКРЫЛ КОРОЛЕВЫ АЛЕКСАНДРЫ	412
ТИГРОВЫЙ ПАРУСНИК	413
АПОЛЛОН	414
БРАЖНИК МЕРТВАЯ ГОЛОВА	415
МАЛЫЙ НОЧНОЙ ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ, или САТУРНИЯ	416
БОГОМОЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ	417
МУРАВЫЙ ЛЕВ	418
ДОЗОРЩИК-ИМПЕРАТОР	419
СТРЕКОЗА ПЛОСКАЯ	420
СВЕРЧОК ПОЛЕВОЙ	421
КОБЫЛКА ГОЛУБОКРЫЛАЯ	422
КУЗНЕЧИК ЗЕЛЕНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	423
СЛОВАРЬ	424
СЛОВАРЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ (ОТРЯДЫ И СЕМЕЙСТВА)	426



Красная лиса

ПРЕДИСЛОВИЕ

Невозможно сказать абсолютно точно, какое количество видов животных существовало на нашей планете, хотя бы потому, что большинство видов просто вымерло, не оставив никаких следов своего существования. Единственное, что нам действительно ясно, что в настоящее время на нашей планете обитает лишь очень малая часть — согласно некоторым оценкам, всего 1% от того количества, что когда-либо на ней проживало.

Не считая растений и микробов, самыми многочисленными живыми существами являются беспозвоночные. К этому моменту 1,8 млн живущих на Земле видов были определены зоологами и получили латинские названия, и из этого числа две трети составляют беспозвоночные, в то время как крупные животные в меньшинстве.

Даже в наше время все еще открываются и описываются миллионы видов. Многие обречены на вымирание, прежде чем будут описаны. На нашей планете существуют такие районы, например влажные тропические леса или глубины океанов, где мы имеем лишь смутное представление о количестве существующих в этой среде форм жизни.


НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Масштаб новых открытий в подобных условиях может быть поразительным. Экспедиции в моря к югу от Тасмании смогли подтвердить открытие 274 видов морских животных к октябрю 2008 г. На острове Борнео в период с 1994 по 2004 год было обнаружено более 310 неизвестных видов животных и беспозвоночных. В их числе рыба, которая является одной из самых маленьких позвоночных на Земле, поскольку ее длина составляет меньше 1 см.

По предварительным подсчетам, нашими соседями на этой планете являются около 15 млн животных, а нам известно всего 10% видов от этого числа. И это относится не только к беспозвоночным. Каждый новый год приходит подтверждение существования нового вида позвоночного животного, и из них около 60 000 уже определено и получило названия. Рыбы являются самой многочисленной группой, составляя примерно половину этого числа.

Но в океанах находят и более крупные виды, хотя некоторые из них остаются таинственными и неуловимыми, такими же как лопатозубый ремнезуб, или ремнезуб Треверса (*Mesoplodon traversii*), названный по имени новозеландского натуралиста Генри Треверса. Первоначально вид был описан на основании челюсти, выброшенной морем в 1872 г. на берег острова Питт в Новой Зеландии, но вскоре она стала рассматриваться как принадлежащая ремнезубу Лейярда (*Mesoplodon layardii*). Другой находке чере-

Не все виды проводят весь год в одном и том же месте. Например, бабочки-монархи относятся к числу тех, которые регулярно мигрируют.





Предки современных целакантов были известны в виде древних отпечатков кистеперых рыб задолго до того, как их живые потомки были обнаружены в Индийском океане.

па того же вида на Белом острове в том же регионе в 50-х годах XX в. тогда не придали значения, решив, что он принадлежит гингкозубому ремнезубу (*Mesoplodon gingkodens*). Следующий череп, вынесенный морем на остров Робинзона Крузо, недалеко от побережья Чили, в 1986 г. посчитали принадлежащим новому виду, который был назван ремнезубом Бахамонди (*Mesoplodon bahamondi*).

Однако в 2002 г. повторный осмотр этих находок включал анализ ДНК, который выявил, что все они принадлежат к одному и тому же виду. В результате благодаря правилам, царящим в научной номенклатуре, отдающим предпочтение первому из присвоенных имен, было восстановлено название «лопатозубый ремнезуб». Однако и до сегодняшнего дня ни один человек не видел живого представителя этого вида, и он остается не только самым таинственным из китообразных, но и одним из наименее изученных млекопитающих планеты.

КОГДА ВИД СЧИТАЕТСЯ ИСЧЕЗНУВШИМ?

Но даже в самом худшем случае этот редкий ремнезуб не будет считаться вымершим. Конвенция утверждает, что для того, чтобы вид посчитали исчезнувшим, нужно, чтобы никто не видел его в течение 50 лет. Однако были случаи, когда виды возвращались из небытия после куда более длительного периода. Это может быть следствием как условий, в которых обитает этот вид, так и трудностей с идентификацией его представителей. Например, считалось, что бермудский тайфунник (*Pterodroma cahow*) исчез в 20-х гг. XVII в., несмотря на то, что находился под официальной защитой, — это был один из самых первых примеров плана по сохранению вида. И он же чудесным образом был найден вновь, гнездящимся на скалистых островках, 330 лет спустя, в 1951 г.

Случай рыбы целакант (*Latimeria chalumnae*) еще более примечателен, поскольку этот вид полностью соответствует ископаемым останкам, чьи предки признаны вымершими около 65 млн лет назад, в одно время с динозаврами. Тем не менее живой экземпляр был выловлен в глубоких водах у юго-восточного побережья Африки в 1938 г., а вскоре последовали и другие находки. Второй вид целаканта, ныне извест-



Существуют два заметно различающихся подвида серого попугая, или жако, что отражает их латинские названия. Этот подвид называется *Psittacus erithacus erithacus*.

ный как *Latimeria menadoensis*, был обнаружен у берегов индонезийского острова Сулавеси в 1999 г. Вероятно, существуют и другие виды, считающиеся вымершими, некоторые из них довольно крупных размеров, и они все еще ждут своего шанса быть открытыми.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ?

Способ, которым описывается новый вид, следует строгим установкам. Самые первые попытки классифицировать растения и животных были сделаны древними греками, но современная наука именования **таксономия** — так ее теперь называют — начала развиваться примерно 300 лет назад. Фактически система, которой мы пользуемся сегодня, по-прежнему во многом напоминает ту, что первоначально была разработана шведским врачом Карлом Линнеем (1707–1778).

В 1735 г. Линней опубликовал свою первую работу под названием «*Systema Natura*», основанную в основном на изучении растений. Постепенно она расширилась в многотомный труд, значение которого росло по мере того, как путешественники, отправлявшиеся из Европы в другие районы земного шара, возвращались домой, постоянно расширяя количество видов живых существ, нуждающихся в наименовании и классификации.

Один из основных вкладов Линнея на этом поприще является концепция биологической систематики. Он выяснил тот факт, что конкретная группа растений и животных может быть более тесно связанной с другими, создавая потенциал для разделения. Система Линнея приняла это за отправную точку, оперируя серией уровней, называемых рангами.

Чем дальше вы идете по этим рангам, тем родство становится ближе, до тех пор, пока, в конце концов, можно будет определить конкретную популяцию. Первое, базовое, разделение было на растения и животных, и как уровень оно называлось царством. В случае с серым попугаем эта система будет выглядеть следующим образом:

Царство: Животные (группа животных)

Тип: Хордовые (животные, имеющие позвоночник)

Класс: Птицы

Отряд: Psittaciformes / Попугаеобразные
(категория, объединяющая всех попугаев)

Семейство: Psittacidae (более мелкое подразделение в рамках отряда, к которому принадлежит данный попугай)

Род: *Psittacus* (групповое имя близкородственных видов)

Вид: *Psittacus erithacus* (название этого конкретного попугая)

Подвид: *Psittacus erithacus erithacus*; *Psittacus erithacus timneh* (отдельная, отличающаяся и узнаваемая популяция этого попугая).

Паук, черная вдова.





Иногда случается ошибочная идентификация животного из-за его общепринятого, а не научного названия, как в случае с этой китовой акулой, но его реальное биологическое родство можно прояснить с помощью классификационного дерева. А оно подтверждает, что данная акула является рыбой, а не млекопитающим.

Конкретным ключом к пониманию, где именно в пределах этого дерева вы находитесь, могут послужить окончания латинских названий. Если классификация заканчивается на *-iformes*, значит, речь идет об отряде, в то время как окончание *-idae* свидетельствует о том, что это название семейства. Есть подсказка и в том, как написано название. Начиная с названия рода, названия пишутся курсивом, так что если вы видите слово типа *Psittacus*, перед вами название рода, к которому принадлежит один вид или больше.

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ПО РОДУ И ВИДУ

В десятом издании «*Systema Natura*», вышедшем в свет в 1758 г., Линней представил так называемую биноминальную систему, позволяющую различать подвиды в самом низу таксономического дерева. На этой стадии он классифицировал около 4400 видов. Может существовать большое количество подобных подвидов, но каждый из них должен отличаться неоспоримым личным именем. Название вида может присутствовать как первая буква имени при написании названия подвида, как в случае с *Psittacus e. erithacus*. Подвид, в названии которого видовое название повторяется дважды, ничем не отличается от того, который был описан первоначально.

Бывает так, что научные названия выбираются случайно, но обычно они подчеркивают характерные черты. В случае с серым попугаем *erithacus* говорится о его характерных красных хвостовых перьях. Часто у этих названий есть очень интересная предыстория, как в случае с упомянутой выше обезьянкой *Calliicebus aureipalatii*. Однако чтобы быть принятым в качестве полноценного вида, экземпляр должен быть официально размещен в каком-нибудь музее. Он становится типовым представителем вида и используется как основной для описания, составленного для признательной научной публикации, ведущей к окончательному признанию вида.

Если появляется новая информация, возможно отнести животное, например, к другому роду, и тогда оно получит новое родовое название, сохранив название вида. Со времен Карла Линнея и до недавнего времени таксономия при группировке видов руководствовалась анатомическим сходством. Однако теперь в этой области все чаще применяется анализ ДНК, и это меняет саму науку. Скорее всего, в будущем таксономическое дерево заметно изменится, поскольку генетические исследования позволяют определить степень родства видов и даже дать возможность догадаться, когда данная конкретная линия отделилась от ближайших родственников.

КАТЕГОРИИ

Существует шесть различных основных подразделений, или классов, на которые подразделяется царство животных.



У некоторых видов земноводных, таких как обитающая в Европе обыкновенная квакша, или древесница, развились способность хорошо лазать, хотя в основном они предпочитают наземный образ жизни.

Однако скорпионы демонстрируют высокий уровень заботы о потомстве, что коррелирует с меньшим количеством отпрысков. Хотя они являются объектом охоты большого числа

видов и находятся в самом низу пищевой цепочки, многие беспозвоночные способны защитить себя с помощью яда.

Рыбы

Считается, что первые рыбы появились в океанах и только потом стали завоевывать пресную воду, заплывая в реки и ручьи. У первых рыб скелет состоял из хряща, а не из кости. Примером этих примитивных групп являются акулы и ромбовые скаты. Рыбы способны извлекать кислород непосредственно из воды с помощью жабр, расположенных сразу за глазами по обеим сторонам головы. Они часто размножаются с помощью икры, разбрасываемой наудачу и оплодотворяющей с помощью внешнего оплодотворения, но в других случаях рыбы могут демонстрировать редкую преданность икре и/или малькам.



Земноводные

Считается, что земноводные произошли от существ, похожих на рыб, эти позвоночные сделали первые шаги по сухе и обзавелись легкими, позволяющими им дышать атмосферным воздухом, а в воде продолжать дышать через кожу. Даже сейчас им необходима вода или сильная влажность, что означает, что они не встречаются в пустынях, а предпочитают лесные, тенистые районы. Их жизненный цикл может варьироваться, но большинство земноводных возвращается в воду, чтобы продолжить свой род. Из отложенной там икры проклевываются головастики, и в конце концов они выходят из воды, теряя жабры в тот момент, когда начинают функционировать легкие.

Страус является одной из немногих нелетающих птиц, и в момент опасности вместо крыльев он полагается на длинные и сильные ноги, позволяющие убежать от хищника.

Рыжая белка является одним из 1500 видов грызунов, в настоящее время живущих на нашей планете, в свою очередь, входящих в число 4000 видов млекопитающих.

Пресмыкающиеся

Покрытые чешуей, но зависимые от температуры окружающей среды для поддержания жизненной активности рептилии сконцентрировались в самых теплых районах нашей планеты. Часть из них откладывает яйца в мягкой, кожистой оболочке, в то время как у других оболочка твердая. Теперь уже точно известно, что во многих случаях температура инкубации напрямую влияет на пол тех животных, которые из этих яиц должны выплыть. Это называется температурно-зависимым определением пола. Воздействие температуры, естественно, варьируется в зависимости от конкретного вида. В некоторых случаях самцы рождаются при более высоких температурах, в то время как у других видов при тех же условиях получаются самки. Понимание этого фактора имеет большое значение для программ по сохранению видов, где повышение количества самок может иметь решающее значение.



Птицы

Способность к полету не является характерной чертой одних лишь птиц, поскольку летать умеют летучие мыши и насекомые. Их отличительной чертой стали перья. Оперение очень важно для полета и брачных ритуалов, а также как защита от холода, как демонстрируют разные типы оперения птиц. Птицы являются теплокровными, так что их температура тела меньше зависит от окружающей среды. Эта особенность позволила им расселиться по всему земному шару, хотя некоторые виды и утратили способность летать. В случае с африканским страусом (*Struthio camelus*) это случилось из-за размеров и веса птицы, ставшей в результате эволюции слишком тяжелой, чтобы подняться в воздух.

Млекопитающие

Они тоже способны согреть себя сами подобно птицам. Это теплокровные животные, и в отличие от птиц на их теле растет шерсть, а не перья. Млекопитающие, за несколькими редкими исключениями, рождают живых детенышей, а не откладывают яйца. С помощью органа, называемого плацентой, самка кормит своих детеныш в период беременности до тех пор, пока они не появятся на свет. Какое-то время после рождения детеныш их выкармливают молоком. Грызуны являются наиболее многочисленным отрядом класса млекопитающих, и многие виды этого отряда имеют очень высокий темп размножения. В противоположность грызунам многие крупные, долгоживущие виды рождают одного-двух детеныш.



Этот самый крупный вид из семейства примитивных млекопитающих, которых часто относят к насекомоядным. Обыкновенный тенрек ведет преимущественно ночной образ жизни. Он строит гнездо из злаков и травы, пряча его под камнями или бревнами. Если тенреку угрожает опасность, он поднимает дыбом жесткие волоски, которые особенно заметны вокруг шеи. Защищаясь, тенреки прыгают, кусаются и пронзительно верещат.



Агрессивная поза обыкновенного тенрека.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ?

Обитает на островах у юго-западного побережья Африки: Мадагаскаре, Реюньоне, Маврикии, Сейшельских и Коморских островах.



ОБЫКНОВЕННЫЙ, или БЕСХВОСТЫЙ, ТЕНРЕК

ТЕНРЕК выглядит как помесь землеройки (благодаря своей длинной заостренной мордочке) и ежа (из-за длинного игольчатого меха). Хотя этот вид и называется бесхвостым, у него есть хвост, только очень маленький, длиной всего 1–1,5 см.

ГЛАЗА
Глаза
сравнительно
невелики.

Вес	1,25–2,5 кг
Длина	26–39 см
Период спаривания и размножения	октябрь–ноябрь
Количество детенышей	до 32
Обычный рацион	насекомые и мелкие грызуны
Продолжительность жизни	от 3 до 6 лет

МЕХ

Шерсть грубая, более короткая на голове. Цвет — от серого до серовато-коричневого. У молодых животных на спине вдоль позвоночника располагается гребень из жестких белых игл. По мере взросления тенрека иглы постепенно сменяются длинными волосами.

УШИ

Маленькие, закругленные на концах уши очень подвижны.



НОС

Чувствительные волоски, или вибриссы, расположенные на подбородке и нижней губе, помогают ориентироваться в темноте.



МАТЬ И ДЕТЕНЫШ

Детеныши внешне сильно отличаются от взрослого животного, потому что его шкурку украшают черные и белые полоски, которые служат для маскировки.




ВИЛОРОГАЯ АНТИЛОПА, или ВИЛОРОГ

В эпоху плейстоцена, которая закончилась около 11 000 лет назад, существовало как минимум 12 видов этого семейства, но до настоящего времени дожил только ВИЛОРОГ. Для него характерно уникальное сочетание признаков, свойственных антилопам и козам.

ХВОСТ


Хвост короткий и сравнимительно незаметный, белый, как и шерсть «зеркальца» на крестце.

Вес	40–70 кг, самки легче самцов
Длина тела с головой	1–1,5 м
Высота в холке	81–104 см
Период спаривания и размножения	с июля по начало октября
Количество детенышней	1, редко 2, 3
Условия жизни	от пустынь и до высокогорий
Обычный рацион	травоядное животное
Продолжительность жизни	в среднем 6–8 лет, максимум 15 лет



ПОД, А НЕ ЧЕРЕЗ


Вилороги, преодолевая поставленные фермерами изгороди, на хорошей скорости пробираются под ними, а не прыгают через верх.



РОГА
Основа у рога костяная, постоянная, а внешняя, кожистая, покрытая волосками оболочка обновляется каждый год.

ГЛАЗА
Глаза крупные и расположены на голове довольно высоко, обеспечивая хороший обзор.

ОТМЕТИНЫ САМЦА
У самцов есть черные полосы, идущие вдоль шеи, и черная маска на морде.



Вилорог — самое быстрое из млекопитающих Нового Света, он способен развивать скорость выше 80 км/ч. Эти парнокопытные, имеющие два основных пальца на каждой ноге, хорошо прыгают. Напрягая определенные мускулы, вилорог может изменять угол волос своей шкуры: они защищают животное от холода, когда лежат вдоль кожи, а когда подняты дыбом, то не дают телу перегреваться. Это позволяет вилорогу выживать в районах с холодным, умеренным и засушливым климатом. В минуту опасности белая шерсть «зеркальца» на его крестце встает дыбом, и это служит сигналом для остальных членов стада.



Детеныши прячутся от хищников, прижимаясь к земле и замирая неподвижно.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ?

Обитает в провинциях Альберта и Саскачеван в Канаде, далее на запад до Северо-Восточной Калифорнии и на юг до Мексики.

