

УДК 639
ББК 47.2
С12

Все права защищены, ни одна часть данного издания не может быть использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Сабанеев, Леонид Павлович.
С12 Все об охоте / Сабанеев Л.П. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 1584, [1] ил. — (Классика в одном томе).

ISBN 978-5-17-118734-7

Леонид Павлович Сабанеев — известный русский ученый-биолог, знаток нашей природы, охотник, рыболов и кинолог, популяризатор охотничьего и рыболовного дела в России, многолетний редактор наиболее авторитетных журналов, посвященных охоте и природе. В эту книгу вошли его выдающиеся труды «Охотничий календарь» и «Собаки охотничьи», а также обширная монография «Волк».

Издание предназначено для широкого круга читателей. Леонид Павлович Сабанеев — известный русский ученый-биолог, знаток нашей природы, охотник, рыболов и кинолог, популяризатор охотничьего и рыболовного дела в России, многолетний редактор наиболее авторитетных журналов, посвященных охоте и природе.

В эту книгу вошли его выдающиеся труды «Охотничий календарь» и «Собаки охотничьи», а также обширная монография «Волк».

Издание предназначено для широкого круга читателей.

УДК 639
ББК 47.2

ISBN 978-5-17-118734-7

© ООО «Издательство АСТ»


От редакции


Первая часть этой книги, «Охотничий календарь», подготовлена по последнему прижизненному изданию Л. П. Сабанеева 1892 года. Также мы включили два из имевшихся в оригинальном издании приложения — «Породы охотничьих собак» и «Клички борзых, гончих и легавых». Приложения «Полный лечебник собак. Болезни собак, лечение и гигиена, с приложением домашней охотничьей аптечки» и «Законы и правила» написаны не Л. П. Сабанеевым. По этой причине и потому, что сведения из них устарели, они не были включены в данное издание.

Первый том задуманного трехтомника «Собаки охотничьи, компанатные и сторожевые» вышел только однажды еще при жизни автора и составил раздел этой книги «Легавые», который был подготовлен по изданию 1896 года. Том «Борзые» Л. П. Сабанеев не успел издать, но готовился, публиковал в 1895–1897 годах в журнале «Природа и охота» отдельные очерки о гончих и борзых собаках. Статьи о бассетах, биглях и таксах вышли после смерти автора в 1899 году. Все эти публикации и составили данный раздел.


Третью часть этой книги составляет монография «Волк», оставшаяся незавершенной.

Редакция постаралась сохранить оригинальный стиль автора, лишь немного изменив текст в соответствии с правилами современной грамматики. Часовое время дается по Гринвичу, календарные даты — по старому стилю, так же как и температурная шкала, для перевода которой в шкалу Цельсия нужно разделить величину на 4 и умножить на 5.





Охотничий календарь



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ ОХОТНИЧЬИХ ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ

Январь

І. Птицы

Клинтух. В Крыму и южном Закавказье оседлая птица и на зиму не отлетает.

Вяхирь. В южном Закавказье зимует.

Тетерев. Держится большими стадами в чащах чернолесья. Продолжает ночевать в снегу. — *Стрельба из ямок (вылетающих из-под снега). Дробь № 4—5 англ.*

Глухарь. Около лесных речек, в чащах, иногда стайками (самцы отдельными); в сильные морозы ночует в снегу. — *Охота с подъезда, в неглубокие снега.*

Рябчик. В чащах олешняка, реже ельника, по берегам речек.

Белая куропатка. В ивняковых зарослях, по болотам, стаями. — *(Промысловая охота.)*

Серая куропатка. Большими стадами в кустах около полей, куда вылетает кормиться. В глубокие снега прибивается к жилью. — *Охота с подъезда для покупки живых куропаток.*

Каменная куропатка. Держится (на Кавказе) б. ч. близ горных аулов, около гумен.

Горная индейка. В Кавказских горах держится у пределов лесной растительности.

Фазан. В камышовых зарослях или лесных чащах. В Волжской дельте выходит кормиться на солончаки, на Кавказе — в поля. — *(Промысловая охота с полотном (ширмами) и выслеживание по снегу.)*

Турач. Держится (в Елисаветпольской губ. и некоторых других местностях южного Закавказья) в камышах, бурьяне и мелком кустарнике. — *(Если выпадет снег, туземцы выслеживают тураней, забившихся в кусты, и стреляют их почти в упор.)*

Перепел. В южном Закавказье местами (в Талышских и Карагаских степях) зимует.

Дрофа. Зимует в Закавказье (под Ленкоранью, Сальянами, особенно же в Муганских степях), Крыму, южной Бессарабии, Херсонской губ., годами (частью) в Подольской, Астраханской и Ставропольской губ. Держится большими стаями, преимущественно на озимях. В южном Дагестане отлет на юг кончается в первых числах, а в последних начинается уже обратный пролет на север. — *Стрельба на перелетах; на южном берегу Крыма — в туман.*



Стрепет. В степях бассейна Куры зимует в огромном количестве и иногда в конце месяца показывается и в других местностях Закавказья.

Погоньш. В Крыму и южном Закавказье иногда встречается в небольшом числе весь месяц. Держится больше в лесу.

Водяная курица. Зимует в юго-восточном Кавказе, по Каспийскому побережью.

Журавль. Одиночные особи зимуют в Муганских степях.

Чибис. В южном Закавказье многие остаются зимовать (особенно в Муганских степях).

Ржанки. Встречаются в небольшом количестве в Закавказских степях.

Болотный кулик (неттигель). В юго-восточном Кавказе зимует.

Бекас. В Закавказье местами (особенно в долине Куры и под Ленкоранью) держится весь месяц около канав, теплых речек и на рисовых полях, но с нового года начинает убавляться.

Гаршнеп. В небольшом количестве встречается в Закавказье (в Талышах, под Ленкоранью и др.).

Вальдшнеп. В значительном количестве зимует в юго-западном и юго-восточном Кавказе (около Батума, Елисаветполя, Ленкорани и др.; иногда встречается в одиночку и под Тифлисом); годами (?) в небольшом числе на южном берегу Крыма. Держится в густом кустарнике около родников.

Кулики. На южном берегу Каспия весь январь держится много *гуртанчиков* — *чернозобиков* (*Tringa alpina*), *шилоклювок* (*Recurvirostra*), *перевозчиков* (*Actitis*; тоже и на озере Гокче), *травников-красноножек* (*Tot. calidris*), *песчанок* (*Calidris are-naria*) и в небольшом числе *прудовые кулики* (*Tot. stagnatilis*).

Лебеди. Зимуют на Каспии в большом количестве.

Гуси. У южных берегов Каспия зимуют *серые гуси*, *белолобая*, *малая* и *краснозобая казарки* (*Ans. cinereus, albifrons, minutus, ruficollis*). В конце месяца *белолобая казарка* начинает лететь на север. В Крыму (у берегов Сиваша) зимуют *серые* и *гуменники* (*A. segetum*) и в неб. числе *белолобые казарки*.

Утки. В Крыму зимуют *гоголи*, *хохлатые* и *сероспинные чернети* (*Paucion, Fuligula cristata u marila*), *пеганки* (*A. tadorna*), вероятно, и другие утки; в Закавказье также *шилохвосты* (в большом количестве, преимущественно самцы), *широконоски*, *чирки-коростельки* (*A. stecsa*), *подматерки*, *савки* (*Undina mersa*), *большие крохали* и *лутки*, *лайки* (*Harelda glacialis*; большей частью в северной части Каспия); *пеганки* (*Alas tadorna*), в небольшом числе *красные утки* и *белоглазые чернети* (*Fuligula Nyroca*). *Турпаны* (*Oidemia fusca*) и *сероспинные чернети* зимуют больше на оз. Гокча. Кряковные утки зимуют частью и во многих других местностях южной России. В конце месяца в Закавказье начинается иногда обратный пролет на север некоторых уток, преимущественно *крякв* и *чирков-коростельков*.

Январь

II. Звери

Медведь. Лежит в берлоге. В более южных местностях (на Кавказе, иногда в Брянских лесах) мечет молодых в конце месяца. — *Главная охота на берлоге, б. ч. облавой; реже с собаками и гоном.*

Волк. В начале месяца начинается течка старых волчиц, в середине и конце — молодых. Прибылые волки ходят с переярками. Все ведут кочевую жизнь и на одном месте долго не задерживаются. Держатся (днем) в частом мелколесье; если же снег окреп, то в поле. — *Охота нагоном по псковскому способу (в средних губ.). — Заганивание на лошадях, по глубокому рыхлому снегу (в степных местностях). — Охота с поросенком и охота на падали. — Зимняя охота с борзыми на снях.*

Лисица. Держится у опушек мелколесья, откуда выходит кормиться в поля; если снег окреп, то держится исключительно в поле. — *Охота в объезд на снях; с псковичами; изредка подстерегают на падали. — Заганивание (в степи).*

Рис. 1. Медведь




Рис. 2. Тигр



Рис. 3. Рысь



Рис. 4. Куница





Тигр. В юго-восточном Кавказе, в Закаспийском и Туркестанском крае, в южной и юго-восточной Сибири держится б. ч. в камышах около рек и озер, приближаясь на зиму к жилью или зимовкам кочевников, и в середине зимы ведет более оседлую жизнь. Молодые (б. ч. почти двухгодовалые?) в январе ходят отдельно. У старых начинается течка (через год?). — *Иногда подстерегают ночью (с лабаза или из ямы) на задранной скотине.*

Рысь. Ведет бродячую жизнь. Придерживается (в северной России) чащ больших лесов; на Урале каменистых вершин. — *Охота с собаками по следу. — Охота с псовичами. — (Ловля капканами).*

Барсук. Лежит в норе.

Росомаха. Ведет бродячую жизнь (в больших лесах). В конце месяца (в более южных местностях, именно Литве) начинается течка.

Куница. Держится в больших хвойных и смешанных лесах. В сильные морозы иногда спит (в дуплах и беличьих гнездах). — *Охота с собакой (лайкой) по следу.*


Хорек и горностай. Держатся большею частью поблизости жилья, в особенности горностай. — *(Промысловая охота с собаками. — Ловля капканчиками и ловушками).*

Выдра. Живет около полыней и родников (на небольших реках). — *Заганивание собаками в удобных для того местах. — Подкарауливание у полыней. — (Ловля капканами, на следу, б. ч. на рыбью приманку).*

Норка. По берегам речек, у родников и незамерзающих мест. — *Подкарауливание на талых перекатах речек и около ключей. — (Ловля капканами и ловушками).*

Дикая коза. Ходит стайками, недалеко от болот и речек; в Урале на горах и в логгах. У старых самцов в конце месяца показываются рога. —

Рис. 5. Плашка — капкан на горностая



Охота облавой (редко) или нагоном, с подхода, в юго-западной России иногда с гончими. — Случайная стрельба у лесных дорог.

Олень благородный. Сбрасывает рога (на Кавказе и в южной Сибири). В конце месяца иногда (в юго-западной Сибири) показываются новые. На Кавказе спускается с гор в леса низменностей. — *Охота (на Кавказе) с гончими (редко).*

Рис. 6. Тэк



Рис. 7. Кабан



Северный олень. Начинают расти новые рога. Ведет бродячую жизнь, придерживаясь моховых болот, на Урале ельников. — *Охота скрадом; стрельба у лесных дорог.*

Лось. Молодые самцы сбрасывают рога. При глубоких снегах ведет почти оседлую жизнь. Придерживается больше осинников около болот и речек, гарников; на Урале также боров и отметей больших гор. — *Охота облавой (с кричанами); с зверовыми собаками (лайками), иногда с гончими, верхом; также скрадом.*

Туры (*Sapra caucasica* — с расходящимися концами рогов и *Aegoceros pallasii* — с рогами, напоминающими бараньи, со сходящимися концами). Держатся (всю зиму) большими стадами (иногда до 100) в высоких горах Главного Кавказского хребта, у границы лесов. В начале месяца (и в конце декабря) спариваются.

Козлы. Живут (*Sapra aegagrus*) на южных склонах Главного Кавказского хребта, в горах южного Кавказа и Закаспийского края. Сибирские козлы (тэк, *Sapra sibirica*) — в горах Алтая, Саяна и Туркестанского края. Течка в декабре и январе.

Кабан. Живут в камышах и лесах стадами. В конце месяца свиньи (в низовьях Волги) начинают пороситься. — *Охота верхом в камышах.*

Зайцы. Русаки держатся б. ч. около жилья, беляки — в осинниках, изредка в садах. На юге начинается течка (русаков). — *Охота по следу и на приваде (на гумнах). — Охота с нагоном.*



Февраль

І. Птицы

Вяхирь. В конце, очень редко в середине месяца показывается в юго-западных губерниях.

Клинтух. В середине, иногда в начале прилетает в Бессарабию; на юге и в юго-западных губ. — в середине или во второй половине; в Малороссии — в конце. Вообще прилетает немного ранее вяхиря.

Тетерев. В средних и восточных губ. начинает вылетать на опушки и перестает ночевать в снегу (если наст). В юго-западном крае, а изредка в средних черноземных губ. во второй половине начинает бормотать.

Глухарь. Выбирается из чащей в редколесье; в конце или (в более южных местностях) середине месяца старые самцы начинают щелкать.

Рябчик. Держится в чащах. Во второй половине в западной и юго-западной России начинает разбиваться на пары и *идти на пищик*.

Белая куропатка. Держится стаями в тальниках и раkitниках. В конце месяца переселяется в моховые болота и начинает разбиваться на пиры.

Серая куропатка. На Кавказе, в Крыму и Бессарабии в середине месяца или ранее начинает разбиваться на пары; в южных и западных губ. — в конце. Держится б. ч. на обтаявшей пахоте. В более северных местностях летает еще стадами, около жилья (в глубокие снега) или в кустарниках по оврагам и в мелочах. — *Охота та же, что и в январе.*

Каменная куропатка. В конце начинает разбиваться на пары.

Фазан. Держится в тех же местах, как и в январе.

Дрофа. В Закавказье пролет обыкновенно начинается в первых числах; в Бессарабии, юго-западных и южных, юго-восточных губ. — во второй половине. Сначала прилетают самцы.

Стрепет. В Закавказье пролет на север с середины, чаще в конце месяца.

Журавль. С первых чисел показывается (иногда) в Крыму и Закавказье; около середины — в Бессарабии; в конце — в южных губерниях, и начинается валовой пролет на Кавказе.

Чибис. Около середины в Закавказье начинается пролет зимовавших на севере; во второй половине прилетает в Бессарабию, в конце месяца — в южные, юго-западные и (иногда) в западные губ.

Ржанки. В конце месяца появляются в юго-восточном Закавказье.

Болотный кулик. В Закавказье пролетные показываются в конце месяца.

Кулики. Во второй половине показываются в Закавказье *черныши* (Tot. ochropus), *песочники* (Aegialites) и некоторые другие кулики.

Турухтан. В юго-восточном Кавказе (под Ленкоранью) показывается с половины месяца.

Кроншнеп. В Закавказье показывается (пролетный) иногда в конце месяца.

Бекас. В Закавказье и Бессарабии пролет начинается в середине или во второй половине.

Вальдшнеп. В первой половине начинается пролет в южном Закавказье (под Тифлисом позднее), а в конце — тяга местных (в юго-западном Кавказе).

Лебеди. С первых чисел пролет (и отлет) в Закавказье; немного позднее (или в середине) появляются в Бессарабии; во второй половине — в южных и юго-западных губ.

Гуси. В Закавказье пролет с первых чисел; в Бессарабии — в середине или немного ранее; в юго-западных, южных и юго-восточных губ. (Астраханской и Ставропольской) — во второй половине.

Утки. С первых чисел в Закавказье и Крыму начинается прилет (и отлет) *крякв*, немного позднее *чирков* — (*A. stecса*); на морцах южной части Каспия показывается много *связей*. *Широконоски*, *красноголовые чернети* (*Ful. fergina*) держатся в юго-восточном Кавказе до конца февраля, и в это же время начинается здесь пролет *белоглазых чернешей* (*Ful. пугоса*) и отлет *гоголей*, *красных нырков* (*Ful. rufina*) и *крохалей* (*M. merganser, albellus*). В первой половине или в середине показываются в Бессарабии *кряквы чирки* и некоторые черневые утки (?); в середине здесь начинается большой пролет *связей*, а в южных, юго-западных и юго-восточных губ. прилетают *кряквы (гоголи* в юго-вост. губ. показываются ранее). Во второй половине или в конце валовой прилет *крякв* и начало пролета *чирков* на всем юге; в южных губерниях показываются *хохлатые чернети* (гоголи?); в юго-восточном Кавказе — *чирки-трескунки* (*Anas querquedula*), а в западных и северо-западных губ. — первые *кряквы*.

Жаворонок. Во второй половине ранний прилет в южных губерниях.

Скворец. Около середины показывается в юго-западном крае. (В юго-восточном Закавказье зимует.)

Дрозды. Первые замечаются на юго-западе в конце месяца.

Февраль

II. Звери

Медведь. В средних губерниях мечет большинство самок (2-х, реже 3-х). В Литве и на Волыни выходит из берлоги (чаще в конце месяца). — *Охота та же, что и в январе.*

Охотничий календарь



Рис. 8. Дикая кошка



Рис. 9. Степная кошка



Волк. В более южных местностях течка кончается («на Сретенье волчьи стада расходятся»). В средних губ. гоньба молодых волчиц. Уцелевшие прибылые волки присоединяются к матке. В более северных губ. в первых числах гоньба только начинается — *Охота та же, что и в январе.*

Лиса. В наст выходит из чащей в поля. На юге течка начинается с первых чисел, в средних — большею частью в конце. — *Охота та же, что и в январе, кроме того, скрадом и на тропе, во время течки.*

Рысь. Течка (в глухом лесу). Молодые ходят отдельно. — *Охота та же.*

Дикая кошка. В западной и юго-западной России (также на Кавказе?) начинается течка, продолжающаяся и в марте. Держится в больших, преимущественно хвойных лесах. *Камышовые коты* (*Felis chaus*) на Кавказе, у берегов Каспия, и *степные кошки* (*Felis manul*) в степях Средней Азии, вероятно, гонятся в январе, одновременно с тигром и барсом.

Барсук. В юго-западных губ. в конце иногда мечет (2—4) и выходит из норы.

Росомаха. На севере течка.

Выдра. Течка. — *Охота по следу.*

Куница, хорек и горноста́й. В более южных местностях начинается течка. — *Охота та же, что и в январе.*

Дикая коза. У самцов вырастают рога. В конце месяца (или ранее) уходит (от наста) в чащи или (на Урале) на вершины гор, где придерживается солнопеков. — *Охота та же. — (Местами промышленники заганивают по насту на лыжах.)*

Олень благородный. Начинают показываться молодые рога (в южной Сибири). — *Охота та же.*

Северный олень. В наст уходит в ельники. — *Охота та же.*

Лось. Молодые сбрасывают рога; у старых в конце показываются новые. — *Охота та же.*

Кабан. Живет стадами. В лесах держится больше на южной стороне. В Астраханской губ. (и на Кавказе?) большинство свиней поросится.

Зайцы. Ранние пометы в более южных местностях (у русаков). — *Стрельба нагоном около жилища.*

Март

I. Птицы

Вяхирь. На юге и юго-востоке прилет в начале; в средних черноземных губ. и в северо-западном крае — в первой половине или в середине; в средних черноземных — в середине; в средних и восточных губ. ранний прилет во второй половине, чаще в последних числах. В Закавказье несутся (немногие оставшиеся на лето) в начале, в юго-зап. крае — в середине месяца.

Клинтух. В начале марта валовой пролет на юге и юго-западе и валовой отлет в Закавказье; в средних черноземных, в северо-западных и юго-восточных губ. первые показываются редко ранее середины; в восточных — б. ч. в 20-х числах; в восточных (Пермская, Уфимская губ.), а также севернее Москвы (где довольно редки) — в конце. Местовые в Закавказье несутся с первых чисел; в юго-западных (и южных?) губ. — с середины.

Тетерев. В юго-западных губ. и Малороссии ток начинается с первых чисел; в северо-западном крае — в первой половине; в центральных и восточных в начале месяца стаи перемещаются в редколесье; тетерки отделяются от косачей и ведут одинокую жизнь. Ток начинается здесь б. ч. с середины месяца или во второй половине; в более северных (подмосковных губ.), а также в северо-восточных — чаще в конце. — *Стрельба на токах из шалаша, с подхода (к одиночным самцам) и на манку. (Дробь № 3–5.)*

Кавказский тетерев. В конце месяца начинает токовать (на голых скалах) в полосе березы и рододендрона.

Глухарь. В юго-западном крае токует с первых чисел; в средней полосе — иногда с 10-х чисел, и в конце месяца ток в самом разгаре. В более северных, а также в северо-восточных губ. ток редко начинался ранее середины. — *Стрельба с подхода к токующим самцам (утренней, редко вечерней зарей) дробью № 0–2 или пулей (из винтовки).*

Рябчик. Из ольховых зарослей перемещается в ельники. В западных губ. разбивается на пары в начале месяца, в средних — около 15-го числа и *хорошо идет на пищик. (Дробь № 5–8.)*

Белая куропатка. Начинает менять белое зимнее перо на красное летнее. В средних губ. самцы начинают токовать (барабанить) около середины, в более северных — во второй половине, вообще немного позднее тетеревов. — *Стрельба самцов на манку (дробь № 4–5).*

Серая куропатка. В Малороссии, в юго-восточных губ. и в северо-западном крае разбивается на пары в первых числах; в средних и восточных держится стаями до середины или конца месяца и летает на проталины в полях. На Кавказе, на юге и в западных губ. с середины или во второй половине несутся.



Рис. 10. Тетерев




Рис. 11. Глухарь



Рис. 12. Белая куропатка



Рис. 13. Фазан (самка)



Каменная куропатка. Самцы начинают токовать с первых чисел. Старые самки, особенно живущие ниже в горах, во второй половине несутся.

Горная индейка. На Кавказе начинает спариваться.

Фазан. В Закавказье самцы начинают токовать около середины; в Астраханской и Ставропольской губ. — в конце месяца (у самца иногда по 2, даже по 3 самки). Держится весной в лесу, около жнив (на Кавказе) или в чакане и по сухим ильменям (Астраханская губ.). — *В юго-восточном Кавказе (под Ленкоранью) туземцы приманивают самцов на курицу.*

Турач. В конце (?) месяца самцы начинают токовать (стрекотать), выбирая для этого бугорок или какое-либо возвышенное место среди редких кустиков.