

Оглавление

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Участники издания | 5 |
| Предисловие | 6 |
| Список сокращений и условных обозначений | 7 |
| ГЛАВА 1. Строение кожи | 8 |
| ГЛАВА 2. Морфологические элементы кожной сыпи | 12 |
| ГЛАВА 3. Пиодермии | 20 |
| ГЛАВА 4. Паразитарные дерматозы | 31 |
| ГЛАВА 5. Микозы | 39 |
| ГЛАВА 6. Кожный лейшманиоз | 51 |
| ГЛАВА 7. Лепра | 54 |
| ГЛАВА 8. Тропические дерматозы | 59 |
| ГЛАВА 9. Вирусные дерматозы | 70 |
| ГЛАВА 10. Дерматиты | 82 |
| ГЛАВА 11. Экзема | 93 |
| ГЛАВА 12. Зудящие дерматозы | 100 |
| ГЛАВА 13. Крапивница | 107 |
| ГЛАВА 14. Мастоцитоз | 112 |
| ГЛАВА 15. Витилиго | 116 |
| ГЛАВА 16. Папуло-сквамозные дерматозы и дискератозы | 119 |
| ГЛАВА 17. Парапсориаз | 137 |
| ГЛАВА 18. Саркоидоз (болезнь Бенье–Бека–Шаумана) | 143 |
| ГЛАВА 19. Эритемы | 148 |
| ГЛАВА 20. Болезни соединительной ткани | 158 |
| ГЛАВА 21. Пузирные дерматозы | 173 |
| ГЛАВА 22. Акне, розацеа и акнеподобные заболевания | 194 |
| ГЛАВА 23. Себорейный дерматит | 206 |
| ГЛАВА 24. Обменные дерматозы | 209 |
| ГЛАВА 25. Ангииты кожи (васкулиты кожи) | 225 |
| ГЛАВА 26. Неклассифицированные сосудистые заболевания кожи | 233 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ГЛАВА 27. Панникулиты | 244 |
| ГЛАВА 28. Нейтрофильные дерматозы | 251 |
| ГЛАВА 29. Наследственные дерматозы | 258 |
| ГЛАВА 30. Паранеопластические дерматозы | 288 |
| ГЛАВА 31. Лимфопролиферативные заболевания | 296 |
| ГЛАВА 32. Саркома Капоши | 315 |
| ГЛАВА 33. Заболевания волос и ногтей | 319 |
| ГЛАВА 34. Психогенные дерматозы | 336 |
| ГЛАВА 35. Опухоли кожи | 342 |
| Список литературы | 367 |
| Предметный указатель | 368 |

Строение кожи

Кожа человека является многофункциональным органом, взаимосвязанным с другими органами и системами организма, выполняющим функцию биологического барьера между организмом человека и окружающей средой. Она со-

стоит из эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки (гиподерма). В коже располагаются волосы, потовые и сальные железы, кровеносные и лимфатические сосуды, нервные окончания (рис. 1.1).




Рис. 1.1. Строение кожи

Эпидермис состоит из многослойного, ороговевающего эпителия, где преобладают кератиноциты, которые находятся в постоянном обновлении и формируют базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой слои. Следует

отметить, что блестящий слой имеется только на ладонях и подошвах.

Самый нижний слой: базальный (зародышевый) — *statum basale*. В базальном слое различают два типа клеток: базальные и меланоциты. Он от-

делен от дермы базальной мембраной и состоит из одного ряда высоких цилиндрических клеток, расположенных перпендикулярно базальной мембране. Цитоплазма клеток базофильна. Ядра — овальные или удлиненные, гиперхромные. В цитоплазме меланоцитов содержится меланин.

Выше располагается шиповатый слой (*stratum spinosum*), состоящий из нескольких (от 5 до 10) рядов более крупных, полигональных клеток. Между клетками видны многочисленные протоплasmatische отростки, в местах соединения которых находятся десмосомы.

Над шиповатым слоем расположен зернистый слой (*stratum germinatum*). Этот слой состоит из 3–4 рядов уплощенных, вытянутых вдоль поверхности кожи клеток. Они содержат большое количество зерен кератогиалина, интенсивно окрашивающихся гематоксилином-эозином.

Выше зернистого слоя находится блестящий (стекловидный) слой (*stratum lucidum*), который состоит из вытянутых клеток. Эти клетки содержат вещества, преломляющие свет (гликоген, липиды и элеидин), вследствие чего границы и структура слоя приобретают вид блестящей полосы и становятся незаметными.

Над блестящим слоем расположен роговой (*stratum corneum*). Этот слой состоит из ороговевших безъядерных клеток, носящих название корнеоциты, содержащих большое количество кератина и пузырьков воздуха, которые образовались в результате деления кератиноцитов и их миграции к поверхности кожи, придающие каждому слою выраженные индивидуальные особенности.

В дерме анатомически различают два слоя: глубокий — сетчатый и поверхностный — сосочковый. Сосочковый слой (*stratum papillare*) имеет многочисленные выросты (сосочки), вдающиеся в эпидермис. Ткань этого слоя состоит из тонких коллагеновых, эластических, ретикулярных волокон и различных соединительнотканых клеток (фибробласты, тучные клетки, макрофаги и др.). Между волокнами соединительной ткани расположено аморфное бесструктурное межуточное вещество, содержащее кислые мукополисахариды и различные ферменты (гиалуронидазу, гистаминалазу и др.). Сосочковый слой пронизан большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов, нервных волокон и нервных окончаний. В этом слое встречаются также пучки гладких мышечных клеток. Ниже сосочкового слоя находится сетчатый слой (*stratum reticulare*), состоящий из рыхлой волокнистой соединительной ткани, расположенной параллельно поверхности кожи. Значительная часть сетчатого слоя

представлена пучками коллагеновых и эластических волокон. В сетчатом слое видны кровеносные сосуды. Дерма переходит в подкожную клетчатку, которая состоит из волокнистой соединительной ткани, между волокнами которой находятся многочисленные дольки жировой ткани.

К придаткам кожи относят волосы, сальные и потовые железы, ногти. Волосе различают стержень и корень. Корень волоса оканчивается волосянкой луковицей, расположенной в волосяном влагалище, внутренний слой которого — эпителиальный, а наружный — соединительнотканый. В просвет волосянного влагалища, в верхней его части, носящей название волосянной воронки, открываются выводные протоки сальных желез (рис. 1.2).

Сальные железы имеют альвеолярное строение и открываются выводными протоками как в устье волосянного мешочка, так и на поверхность кожи.

Потовые железы подразделяют на эккринные и апокринные. Их относят к простым трубчатым железам. Эккринные потовые железы встречаются на всех участках кожного покрова, особенно много этих желез на ладонях и подошвах. Исключение составляют красная кайма губ, головка полового члена и внутренний листок крайней плоти. Апокринные потовые железы локализуются в подмышечных впадинах, в области гениталий, промежности, сосков молочных желез. Апокринные железы, как правило, открываются выводными протоками в волосянную воронку.

На границе подкожно-жировой клетчатки и собственно кожи расположено глубокое артериальное сплетение, от которого перпендикулярно вверх отходят сосуды, образующие подсосковые сплетения. Из сплетений выходят мелкие артерии, снабжающие кровью различные отделы и образования в дерме.

Лимфатическая система кожи состоит из двух сетей лимфатических капилляров и отводящих лимфатических сосудов. Поверхностная сеть лимфатических капилляров расположена в подсосковом слое, глубокая — в нижнем слое дермы (рис. 1.3).

Кожа богата нервыми волокнами и их окончаниями. Основное сплетение локализуется в подкожно-жировой клетчатке, откуда разветвления достигают собственно кожи. В сосочковом слое нервные волокна формируют густую сеть, от которой отходят нервные волокна к волосянным мешочкам, железам, сосудам, эпидермису. В коже расположены тельца Фатера—Пачини, Мейсснера, концевые колбы Краузе и клетки Меркеля.




Рис. 1.2. Схема строения и расположения в коже волоса




Рис. 1.3. Схема строения и расположения в коже кровеносных и лимфатических сосудов

Ногти состоят из ногтевой пластиинки и ногтевого ложа. Ногтевую пластиинку образуют плотные роговые массы, которые на наружной поверхности ногтя гладкие, а на внутренней — неровные из-за наличия роговых выступов, обеспечивающих плотное прилегание ногтевой пластиинки к ногтевому ложу. Выделяют дистальную, проксимальную и латеральную части ногтевой пластиинки. Проксимальная часть, или корень, находится в задней части ногтя и покрыта ногтевой кожицей (кутикулой). Участок

ногтя, на котором лежит корень, называется матрицей — это место роста ногтя. Ногтевая пластиинка обновляется полностью в течение 90–160 дней (на кистях быстрее, на стопах — дольше). В области корня ногтя имеется зона в виде дуги белесоватого цвета, особенно заметная на больших пальцах. Дистальная часть ногтя свободно выступает отрастающим краем и лежит на ногтевом ложе. Латеральные части с обеих сторон ногтевой пластиинки прилегают к околоногтевым валикам.

Морфологические элементы кожной сыпи

Различают **первичные и вторичные** морфологические элементы.

Первичные морфологические элементы — это высыпания, появляющиеся на неизмененной коже. Первичные элементы подразделяют на полостные и бесполостные. Полостные элементы имеют полость, заполненную серозным, кровянистым или гноевым содержимым. К их числу относят пузырек, пузырь и гноиничок.

В бесполостных элементах полость отсутствует. У некоторых из них преобладают в той или иной мере выраженные инфильтративные процессы. К ним относят пятно, узелок, волдырь, бугорок, узел.

2.1. Первичные морфологические элементы

Пятно (macula) характеризуется изменением цвета кожи на более или менее ограниченном участке, по плотности не отличается от здоровых участков и не возвышается над окружающими тканями. Различают сосудистые (воспалительные и невоспалительные), пигментные и искусственные пятна.

Сосудистые воспалительные пятна обусловлены расширением кровеносных сосудов дермы. Они исчезают при надавливании на кожу предметным стеклом или пальцем и вновь появляются на коже по прекращении давления.

Воспалительные пятна могут иметь различную окраску — от бледно-розоватой до синюшно-красной и в зависимости от размеров делятся на розетолы (до 1–2 см) и эритемы (более 2 см в диаметре)

(рис. 2.1). При слиянии очагов эритемы образуется эритродермия, при которой поражается весь кожный покров.



Рис. 2.1. Воспалительное пятно (розацеа)

В процессе разрешения пятна оставляют после себя гиперпигментацию или исчезают бесследно. Воспалительные пятна наблюдаются при вторичном сифилисе и различных дерматозах.

Сосудистые невоспалительные пятна характеризуются отсутствием воспалительных явлений в коже. При надавливании на кожу предметным